

F. XVIII. 14

29,820/2

Handwritten notes in the bottom right corner, possibly including the word "Hauptstadt" and other illegible text.

20. D. 10208

OBSERVATIONES
DE AËRE
ET
MORBIS EPIDEMICIS, &c.



OBSERVATIONES
DE AËRE
ET MORBIS EPIDEMICIS,

Ab Anno MDCCXXVIII. ad Finem Anni
MDCCXXXVII. Plymuthi factæ.

HIS ACCEDIT

OPUSCULUM

De Morbo Colico Damnoniensi.

AUCTORE

JOANNE HUXHAM, M.D.R.S.S.

Τοῖσι δ' αὖθις ποιεῖν ἔπος Αἰτίας (ὁ Ἀῦρ.) ἵσ. τέτε βίε
καὶ πῶν Νοσέων τοῖσι νοσέουσι. Hippocr. de Flatibus.

nisi persuadere Nobis volunt, Sanis quidem considerandum
esse, quod Cælum, quod Tempus Anni sit; Ægris verò non esse.
Celsus Præfat. ad Librum I.

EDITIO PRIMA VENETA
Juxta ultimam LONDINENSEM.



VENETIIS, MDCCCLXIV.
Apud LAURENTIUM BASILIUM.

Superiorum Permissu, ac Privilegiis.



43+

WELLCOME HISTORICAL MEDICAL LIBRARY
UNIVERSITY OF MICHIGAN
ANN ARBOR, MICHIGAN

AMPLISSIMO VIRO,

HANS SLOANE, Baronetto,
Praefidi;

Illustribusque Regiae Societatis Londinensis
Sodalibus,

JOANNES HUXHAM.

S. D.

BENIGNE olim accepistis, or-
natissimi Viri! parva quædam
Opuscula nostra, inter quae fuerunt
Observationes meteorologicae ab Anno
MDCCXXIV. ad MDCCXXVII. Jam
adeò consequuntur, quas per Decen-
nium proximè elapsum feci, summa
quidem Cura & non parco Labore in
Compendium redactae: hisque adje-
cti sunt perpetui de Morbis Epidemi-
cis Commentarii.

NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

A Vendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del P. Fr. Filippo Rosa Lanzi Inquisitor General del Santo Officio di Venezia nel Libro intitolato, *Observationes de Aere, & Morbis Epidemicis ab anno 1728. ad finem anni 1737. & ab anno 1738. usque ad exitum 1748. His accedit Opusculum de Morbo Colico Damnoniensi. Auctore Joanne Huxham. Tomi duo*, non v'esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Principi, e buoni costumi; concedemo Licenza a Lorenzo Baseggio Stampator di Venezia che possi essere stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle Pubbliche Librarie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 9. Novemb. 1763.

{ Sebastian Zustinian Rif.

{ Alvise Vallareffo Rif.

{ Francesco Morosini 2°. Kav. Proc. Rif.

Registrato in Libro a Carte 186. al Num. 1033.

Davidde Marchesini Segr.

19. Novemb. 1763. Reg.

Francesco Gadaldini Segr.

PROLEGOMENA.

OMNIUM Animantium Vitæ nihil æquè necessarium est ac ipse Aer communis, quo sine ne vel per paucula Momenta protrahenda est. Cum verò maximas is variasque subeat Mutationes, harum Notatio & Historia non potest non esse Medicis summoperè utilis: quod optimus ille quidem, Artisquæ nostræ vetustissimus Magister, Hippocrates, nobis præcepit, atque præclaro commendavit Exemplo; quippe qui, in genuinis Epidemiorum Libris, Aeris Constitutionem Morbos vulgares antecedentem accuratè præscripsit. Idque Jure sane merito: Causæ namque Morborum fere omnium Epidemicorum sunt Constitutiones Atmosphæræ depravatæ; etiam ipsorum, qui proprie contagiosi vocantur, Incrementum & Duratio ex eadem Causa maximè pendent. Nonne enim uno Anno, in hac Urbe, aut hoc Oppido, unum tantum, alterumve, Variolis nempe, aut Morbillis, correptum videmus, alio autem, ab uno incipientem, Labem in innumeros disseminatam? Ita ut Aer ipse arcere, aut fovere, videatur ipsum contagium: Ignis veluti Scintilla, Fomiti injecta idoneo, immensum quantum Flammæ accendit undique! Humidæ contra occurrens Materiei extinguatur protinùs.

Quid sit quidem τὸ Θεῖον istud Hippocratis veterumque Medicorum, pro Causa Morborum pestilentium acceptum, haud probè scio. Si velint verò, nonnullis ut placet, peculiare aliquid ab irato Numine rebelli inflictum Populo, in Vindictam violatæ Legis, id utique Precibus humillimis, facta certè, non ficta, Poenitentia avergendum est: quandoquidem vix ullus Medicinæ Locus, aut Spes sit ulla.

Sed hoc mittamus, utpote paulò abstrusius, & videamus breviter certos & manifestos Aeris Effectus in Corpora nostra; unde quàm necessaria sit Medico *Atmosphæræ* Consideratio & Observatio faciliè patebit.

Primò igitur. Respiratio, in qua quasi Vita ipsa consistit, Ope Aeris perficitur omninò: Vesiculas nempe Pulmonis dilatando vias facit patulas toti circulanti Sanguini, qui hic maximam subit Mutationem. Factus enim lentus nimis & crassus ob tardum admodùm per Venas majores motum, Chylo etiam crudo refectus, è dextro Cordis Ventriculo minùs aptus Circulationi & Corporis Nutritioni expellitur. At per innumerabiles minimasque Pulmonis *Arteriolas*, reticulari Plexu Vesiculas pulmonares texentes, distributus omnigenam ibi patitur Compressionem; partim ab inspirato Aere, à renitente Sanguine partim, & ab ipsa partim Vasculorum Contractione; iisque omni Momento variè agentibus; ita ut in Pulmonibus misceatur omni modo & conquassetur Sanguis, atque *Moleculæ* ejus crassiores inde comminuantur maximè. Hic etiam præcipuè Globuli Sanguinis rubri componi videntur è sex (uti per Microscopium patet) minoribus, sive *Serosis*, more quo Globulum Ar-

genti

genti vivi majorem è minoribus formamus ; quod ipsum quoque vim quandam quasi & Compressionem postulat. Ibi porrò recentis Chyli Particulæ conteruntur , ita ut globosæ tandem fiant , ac animale induant Naturam : quæ omnia ulterius perficiuntur Actione Expirationis , Pulmone nempè se corrugante , atque Costis collabentibus pressio.

Adeò ut hoc viscus præcipuum Sanguificationis Organum æstimari debeat : non mirum ideo si , qui Infirmitate Pulmonum laborant , Cachectici sunt & Hydropici , nec si , qui corruptum inspirant Aerem , morbidum.

Comminutio hæc & Attritus , ac ipsius Chyli Sanguificatio (sit venia verbo) in Pulmonibus sunt omnino necessaria ad Usus Naturæ , cùm ad Nutritionem , tum ad motum Musculorum ; quia neutrum horum perfici videmus ab ullo Sanguine , nisi postquam Pulmones tranaverit : hoc enim notandum est ab Arteriis Coronariis ad ultimos usque Ramos Aortæ : ad hunc finem Animalcula quædam Spiracula habent pulmonalia à Capite ad Caudam usque.

Secundò. Aer non solum ab Effluviis noxiis purus esse debet , sed & justæ insuper Gravitatis & Elasticitatis , ut Pulmones distendat satis ; nec tamen enormis , ne eos opprimat . Utcunque enim gravem valde , vel levem , Atmosphæram commodè satis ferant robustiores ; montesve incolant , imasve valles integri : non ita tamen infirmi , quibus harum Rerum paulò curiosior debetur Æstimatio . In Medicina utique facienda vides & quibus Boreas , Mercurium in Barometro attollens , officit maximè ; vides & quos , cum Mercurio , deprimit humidus Auster . Sed de

his infra; hic solùm obiter notans altiores Habitationes illis eligendas esse, his humiliores, cætera si paria sint: pro Ratione enim situs, Aeris incumbentis Columna magis, minusve, producitur; adeoque Pressura ejus magis, minusve, intenditur: hinc aliqui prope Mare meliùs se habent, alii Locis in montanis.

Tertiò. Aer etiam Respirationi idoneus non nimis calidus esse debet, nec ultra modum frigidus: est enim Aeris inspirati temperare Sanguinis Calorem, qui aliter fervendo putresceret citò, ut patet ab Experimento præcellentissimi Boerhaavii in Hypocausto capto (vide Chem. caplt. de Igne Experim. xx. Corollar. 16.) Si Aer enim sit magis, aut æquè calidus ac Sanguis alicujus Animalis, intra pauxillum Tempus moriatur necesse est.

Nec solum Sanguinem refrigerat Aer, sed, ne nimium ebulliendo vasa perrumpat, impedit, cum nempe condensando. Atque hoc utique permagni est momenti, si cum doctissimo * Helvetio supponimus dextri Cordis Ventriculi Capacitatem majorem esse Cavitate sinistri, eamque pariter Arteriarum *pulmonicarum* multo excedere istam Venarum respondentium: nam consequitur inde, quod Sanguis debeat ab Aere inspirato esse valdè densatus, ut æqualis Cruoris Quantitas æquali eodemque Tempore recipi possit à Venis *pulmonalibus* & Ventriculo Cordis sinistro; pulsus scilicet Corde dextro per capaciores pulmonis Arterias. — Hoc quidem plurimi negant contrarium omninò statuentes. Est tamen necesse

* Vide *Eclaircissemens concernant la maniere dont l' Air agit sur le Sang dans les Poulmons*. Paris, 410. 1728.

esse prorsus ut Aorta ex Ventriculo Cordis sinistro tantum recipiat Sanguinis, quantum è Ventriculo dextro per Arteriam pulmoneam pellitur, idque æquali eodemque Tempore: fatale aliter Diluvium Pulmones obrueret brevi; quoniam utriusque Ventriculi Systole est Synchronica. Aortam ideò & Arteriam pulmonarem invenimus semper Diametro quàm proximè æquales, modò sint in Statu Naturali. Ob hanc igitur Causam Ventriculorum quoque Capacitates debent esse æquales, ut eodem etiam & æquali Temporis Spatio æquas possint recipere Sanguinis Quantitates. Eadem perinde Ratio necessaria videtur inter Arterias & Venas pulmonares (quod enim protrudunt Arteriæ, transmittunt Venæ). Nulla saltem datur necessitas, cur hæ Venæ factæ sint Arteriis capaciore: nam Aer ipse communis, quatenus Sanguine frigidior multo, eique per omnem intimumque Pulmonem Inspiratione applicatus non potest non Sanguinem condensare: tantum utique, ut reprimere sufficiat nimiam ejus Effervescentiam; cui quidem propter magnam Cruoris Agitationem, ac proindè Calorem, aliàs foret obnoxius valdè. Hinc Asthmatici Auram quàm frigidam haurire coguntur, urgente Paroxysmo: (ubi nempe Sanguis nimis in Pulmonibus turgescit) ne protinùs accederet Suffocatio. Sic qui Febre ardente laborant, qui Cursu, aut Luctatione valida, perturbant Humores, longè frequentius solito respirant: ut frigido novoque Aere, creberrimè attracto, ebullientem Sanguinem refrigerent satis, eumque debitos intra Cancellos coerceant.

Vis adeò inspirati Aeris tantum condensare Sanguinem in Pulmone debet, quantum vehem

mens ibidem particularum Attritus, ac massularum Comminutio, istum expandit: nimiam aliter in molem assurgeret rarefactus Sanguis; quod idem est ferè, ac si redundaret ipsa Quantitas. At cum Ventriculus Cordis sinister parsolùm est dextro, qui capere potest auctam hanc molem? Si non, quæ inde Ruinæ?

Quod Ratio suadet, fida docet Cadaverum Inspectio, ubi Vasa Cordis & Pulmonis sicut descripsi inveniuntur, si sanis in Animalibus, recentissimè demortuis, quærantur. Iniquè verò admodum, diu post Mortem comparantur Venæ & Arteriæ ejus congruæ Diametri; huic enim ob Structuram longè magis *elasticam* inest contrahendi vis maxima, illi autem longè minor: hinc Arteriæ Sanguinis, saltem *Serosi*, vacuæ ferè inveniuntur & constrictæ; imò si Siphone, injecta nempè Cera, replentur utræque, Arteriæ multo magis quàm Venæ resistunt, nec ideo æqualem admittunt Distensionem. Idem de Ventriculis Cordis dicendum est, quandoquidem sinister crassior multo est, adeoque longè fortior dextro.

Ex iis jam, quæ suprà dicta sunt, liquet satis quàm utile est Ægris, præcipuè febricitantibus, Auram frigidiusculam, fervente potissimum Æstate, subministrare. Vidi ego multoties Anxietates & Languores *febriles* momento ferè depulso, Fenestris tantum apertis, quibus imprudens nutricula Spiritibus (uti dicitur) *volatilibus* perperam omnino mederi satagit; imò tunc adeò non juvant *Cardiaca* calidiora, ut etiam maximè noceant; longè melius enim Inspiratione Auræ frigidæ, & missione nonnunquam Sanguinis, abiguntur; quia ortum habent sæpissimè a Congestione

stione & nimia Sanguinis Rarefactione in Pulmonibus. Oportet verò ut Aer, Pectori saluber, non sit nimum frigidus. Josephus d'Acosta refert Aerem ita frigidum esse Altissimum quendam super Montem Peruvianum, ut uno solùm Flamine Sanguinem sæpe in Pulmone congelet.

Imò Hyberna Frigora Europæ, in Plagis potissimum borealibus, *Pulmonias* exitiales inferunt sæpissimè; quin etiam aliquando, non tantùm Pulmones, sed & Artus etiam ipsi, ex Frigoris vehementia, Gangræna corripiuntur. Peregrinantibus igitur per frigidam valdè *Atmosphæram* opportunum est maximè Liquores tepidos eorumque Vapores sorbere frequenter; ad debitam nimirum Laxitatem Vasorum *pulmonalium* & Sanguinis Fluorem conservandum: Haud utique Auram gelidiorum impune respirant jejuni, diras inde profectò novi Peripneumonias.

Hæc hæctenus de Aeris Potentia in Pulmone; jam quæ sit in totum Corpus paucis videamus.

Primò itaque; consideremus Aerem, quatenus grave quoddam fluidum in nos perpetuò incumbens, haud minore quidem Pondere Hominem mediocris Staturæ premens quàm Librarum 32000. immane quantum Pondus! quod ex nobis quicquid est Liquoris exprimeret, ni Pressura foret æqualis undique, ni ex æquo resisterent inclusi Humores. Hoc autem sapientissimus nostrum omniumque Conditor, Deus, nobis fecit salutare maximè; nam & totam Corporis Compagem confirmat, & humores ejus coercet; imò vel hac ipsa Pressura (ut ego sanè sentio) haud parùm promovet ipsius Sanguinis circuitum: Siquidem totum Corpus ab incumbente

Atmosphæra comprimitur assidue, totus ideo ejusdem cruor per Venas versus Cor urgeatur necesse est, quum non possit, per Arterias, Cor petere retrorsum propter obstantes Valvulas. Tam parum utique motus originalis à Corde accepti, in Venis majoribus, Sanguini restat, ut vix Cor adusque ab imis Pedibus, ni ad Æquilibrium tantum perficiendum, ascenderet; (per Venas nimirum cum Arteriis continuatas, quasi per Siphonem inversum, cujus crura æqualis sint Altitudinis) ita tardus sanè ibi est Sanguinis Progressus, ut in Venis Artuum Valvulæ frequentes occurrant, ad Onus nempe incumbentis Sanguinis excipiendum, ne fortè relaberetur. Haud ergò ex se solo polleret (ut mihi videtur) vim propriam constringentem Cordis superare, ne dicam irruere in ejus Ventriculum, eumque dilatare.

Sanguinis ideo momentum adjuvat assidua *Atmosphære* Pressura, more velut *Antagonistæ* agens contra vim Cordis insitam & validè constringentem, quod plùs, minùsve, omni *Sphincteri* Musculo proprium est. Cùm primum enim, ope Inspirationis, explicatus Pulmo Locum dat expellendo è Corde Sanguini; factò nempe in Ductibus Pulmonum Sanguineis momentaneo quasi Vacuo, continuo in Cor dextrum impellit Sanguinis quantum facile capit Pondus *Atmosphære*, totum Corporis habitum comprimens semper. Eodem porrò ipso momento irruens, undique premens, & *elasticus* Aer haud exiguum addit impetum rapidissimis, per Pulmonem currentibus, Sanguinis Rivulis, ejusque Momentum tantum adaugere, ut vel vim Cordis sinistri subigere possit: longè enim * longèque velocius currit

Sanguis

* Vide Hales's *Hæmstatics*, Experim. X.

Sanguis per pulmones quam per *Aortæ* Rā-
mules.

At de his satis; cum non sit hujus Opusculi accuratam circum acti Sanguinis Historiam perscribere: hoc solum, hic obiter, denotare volebam, Compressionem *Atmosphæræ* esse unam ex multis, eamque haud contemnendam Causam circuitus Sanguinis, quantumque immoderata Gravitas Aeris aut Levitas, accelerare Sanguinem, aut retardare potest.

Quum verò ab Historia *Barometri* clarissimè pateat, quod *Atmosphæræ* pondus uno Tempore majus est quam alio, Ratione fere $\frac{1}{10}$ totius Columnæ *baroscopice*; non potest non esse quin tanta Differentia nos, sub ea versantes, afficiat maximè: quandoquidem haud minoris est ista quam Pondo Librarum 3200: cujus dimidium sanè, vel perpauca intra horas, sentimus sæpissimè. Suprà verò monstratum est pondus *Atmosphæræ* multum conferre ad *Circulationem* Sanguinis promovendam: major ergò ejusdem Gravitas Motum Cruoris auget, minor autem minuit. Hinc fit, quod dum Cælum siccum (sit atque serenum; id est quando debita Gravitate & *Elasticitate* præditus sit Aer, alacres nos vegetosque percipimus: aucta namque Sanguinis Velocitate, cæteris paribus, Secretiones nostræ naturales & *Evacuationes* augentur, præcipuè *Perspiratio* (ut dicitur) *Sanctoriana*, quam, modò sit ordinata probè, consequitur Corporis & Animi Vigor. Major porrò in Corpora nostra Pressura Vasa sanguinea coarctat per totum Habitum Corporis externum, quod Effectu idem est, ac si Sanguinis ipsius Quantitas fuerit adaucta: nam non solum motos Humores incitat, sed & etiam
quo

quo magis premitur Habitus exterior, eo plus Sanguinis ad interiores & maximè vitales Corporis Partes adigitur, unde fortior evadit earum Actio. Ideò non solùm in Pulmone meliùs lentescentem subigit Sanguinem crudumque Chylum purus & elasticus Aer, sed per totum quoque Systema Vasorum. Verum enimverò si permagna Gravitas Aeris & Elasticitas longo perdurat Tempore, Morbos producit ab aucto nimium Sanguinis Motu; cujusmodi sunt Pleuritides, Peripneumoniæ, Anginæ, Febres ardentes, atque id Genus alia: idque potissimum accedentibus aliis Aeris Qualitatibus, Frigoris scilicet, aut Caloris; ut videbimus infra.

Secundò; contrà omninò contrarias Corporis Affectiones infert Aer debitæ Gravitatis & Elasticitatis expers: nam sequitur inde tardior Sanguinis Circulatio, diminutæ Secretiones, impedita Perspiratio, Lentorque tandem nimius humorum. Hinc ille Corporis & Animi Languor, quo ferè afficimur omnes, dum talis adest Atmosphæræ Constitutio; quæ porrò, persistens usque, ista omnia auget indies: imò vel ipsa mala, Causæ originali succedentia, se mutuò promovent assiduè: demumque his omnibus accedunt Affectus hysterici & hypochondriaci, Febres intermittentes, remittentes, putridæ, lentæ, nervosæ, petechiales; Morbi denique omnes à nimio Lentore Sanguinis & segni ejus Circuitu pendentes.

Quoniam verò omnes Atmosphæræ effectus, qui a Gravitate ejus, aut Levitate, oriuntur, vim plurimam ab ipsius secundariis Qualitatibus, frigore putà, aut Calore, Humiditate, aut Siccitate accipiunt; pauca quoque de his dicenda sunt.

I. De Aere frigido & sicco.

Omnia, quæ saltem attingit, Corporis vasa frigus coarctat: idem iste Annulus, quem Æstate vix digito induis, Hyeme frigida excutitur facillimè: supputa jam à contractione parvulæ istius partis quantum patitur totum. Vasa autem constricta longè fortius vibrant in contenta fluida, quam si sint bene laxa; à Frigore nempe Fibrarum *Elasticitas* augetur, adeoque major contractio vasorum & Humores magis atterit, & eorum simul accelerat motum: nam ut sunt vasorum capacitates inter se, per quæ eadem cruoris *Quantitas*, eodem Temporis spatio, fluere debet; sic sunt quoque, inversa Ratione, Liquidi istius *Velocitates*; diminuta aded capacitare *Velocitas* augetur.

Quod verò Sanguinem attenuat, ejusque *Velocitatem* adauget, *Secretiones* fluidiores & *Excretiones* debitas promoveat necesse est, unde *Functiones* omnes *Animales* evadunt validiores. Quoniam verò hæc eadem facit gravis & *elasticus* Aer, cui frequentissimè quoque adjuncta est & frigiditas *Atmosphære*, & siccitas, unita vi Effectus edunt majores; adeò ut, dum conspirant unà, sæpe demum subsequatur vis Vitæ, quam vel par est, fortior; quæ tandem proinde suis & ipsa viribus ruit. Tam validus enim solida inter & fluida oritur Attritus, tam rapidus Sanguinis cursus; corrugata insuper à frigore cute, tanta dissipatio humidissimi, crassissimi autem Retentio, donec fit cruor acris valdè & maximè viscosus: dumque in vasa urgetur inepta morbos omnigenos *inflammatorii* Generis parit. Idque præsertim, cum immodica *Atmosphære* siccitas nec moderantem Fibris, nimium rigidis, Fotum præbet,

bet, nec Sanguini diluentis Humiditatis satis; quæ, dum suppetit, per cutis Poros attrahitur assiduè.

Quod tamen quibusdam documento est maximo, plurimis inservit maximè, dumque hos Febres acutæ, *pleuritica*, *peripneumonica*, alios graves Asthmatis, *Rheumatismi*, aut Arthritidis, Paroxyismi corripunt; illos, firmosque serè omnes, alacres magis sanosque reddit Aer ponderosus, frigidus, ac siccus: nec incitat aliquid magis grave Belgarum vulgus quàm rigidum, diuque durans, Gelu; tunc Temporis enim vel cum lepidissimis Gallis Festivitate concertant. Hoc olim notavit Celsus Senex, Aphorism. 17. Sect. 3. quem sic vertit Cornel. Celsus: “ Aquilo sanum
“ Corpus spissat, & mobilius atque expeditius
“ reddit. “

2. De Aere frigido & humido; qui nobis quidem officit multùm, quatenùs Frigus ejus Corporis Poros constringit, eosdemque Humiditas occludit; horum alterutrum *Perspirationem* impedit plurimùm: etiam ipsa Corpora *Electrica* in Aere humido longè parcius, quàm in sicco, Effluvia emittunt. Quam noxia sunt madida frigidaque Indusia, & Lodices, nemo non norit.

Imbrica porrò & pluvia tempestas Gravitationem *Atmospharæ* minuit, Humor ejus nimius vim Fibrarum enervat; utraque impetum Sanguinis impediunt, ac debitas pròinde Secretiones & Excretiones. Hinc gignitur serosa Colluvies, Destillationes inde sequuntur & Tumores Faucium, Tusses & Anginæ, aliaque multa. Denique, si talis Tempestas manet diu, Febres *catarrhales*, intermittentes, putridæ, lentæ, nervosæ, ingruunt;

unt; ni per Cutim (quod optimum) aut Urinam, aut per Alvum, exterminentur tempestivè retenti Humores: priusquam scilicet putrescere incipiunt.

Nec more solùm descripto nocet algida udaeque Aeris Temperies, sed & ipsa gelida Humiditas in ipsum Corpus attrahitur. Vel ipse Medicinæ Parens, Hippocrates, hanc Corporis imbibentem Facultatem, bis mille abhinc Annis asseruit; dum scilicet ὅλον τὸ Σῶμα non solum ἐκπνοον, sed & εἰσπνοον, esse pronunciavit: quæ verba ipse Galenus de Aeris ingressu per Cutis Poros interpretatur. Id verò abundè Experimenta probant; neque enim alia patet via Argenti vivi, aut Terebinthinæ particulis in Sanguinem, nisi per ipsos Cutis Poros; modò sint illitæ solùm, aut vel sub Forma Vaporis allectæ. Hoc idem satis superque confirmant Tentamina acutissimi Jacobi Keilei nostri; quinimò Humoris gelidi Absorptionem, summa cum Probabilitate, posuit pro Causa frequentissima istius Corporis invaletudinis, quæ vulgò *susceptum Frigus* nominatur: ipsis nimirum Particulis frigorificis (si placet Nitroæris) unà cum Humore absorptis, quæ Sanguinem Lymphamque vitiant.

An verò datur reverà Principium aliquod frigorificum, Sal nempe Nitro-Aereus, ut à Μαγόνν vocatur, sive ullo alio Vocabulo id nominabis, eximios inter Philosophos dubitatur; Causam nempe omnis Frigoris ponentes in Privatione solùm Motus & Caloris. Hæc tamen Sententia haud mihi Herclè prorsùs arridet: nam posce modò, num in Calore aliquid magis positivum est quam in Frigore? nonne utriusque æquè subitanea & æque certa Sensatio est? quod
foran

forſan non adeò eſt explicatu facile à ſola motus Ceſſatione: nec ex mera Privatione, aut Relatione, poſitivi fluunt Effectus, at è Frigore plurimi: Corporum quorundam Expansio, quorundam Condensatio, permanens mutatio & ſexcenta alia. Aqua, dum congelatur, expanditur, Argumentum ſanè materie alicujus ab extrà receptæ; aliter enim à ſola Caloris & Motus Abſentia condenſaretur: Sicut Metalla, quæ fuſa quidem dilatantur, rigeſcentia verò, minus occupant Spatium.

Porro Aqua, ex Gelu reſoluta, longè frigidior eſt, quàm quæ priùs congelata non fuerat, reſtatque diu ad plurimos Uſus inepta, ad quos ante Congelationem idonea fuiſſet; hoc vel mulierculæ notant. Imò, qui Gelu reſolutum perpoſtant, ſunt pluribus Morbis obnoxii; ideo Poeta — *Quis tumidum Guttur miratur in Alpibus?* Parùm utique video, cur Aquæ Congelatio ob meram motus Privationem efficeretur, ſi, cum ſummis Philoſophis, particulas ſuas conſtituentes *Sphæricas* eſſe ſtatuimus; quod maximè videtur probabile, quia nullus excitatur Calor utcunque vehementer agitetur Aqua; minima enim intervenit Friçtio (Cauſa nempe Caloris) motas inter Sphærulas. Nam ſequitur hinc planè, ſeu in Motu, ſeu in Quietè, quod in punctis ſolùm ſe mutuò contingere poſſunt; unde ne major quidem ob Quietem Cohæſio: quæ tamen infinitè major eſt in Gelu, quàm in Aqua. Porro autem Aqua in Vacuo difficillimè, ſi unquam, congelatur; ubi tamen ſatis certè Quietis: at ipſiſſima iſta Aqua, ad Contactum gelidi Aeris effuſa, dicto citiùs, etiam inter effundendum, in Glaciem abit; notante diligentiffimo Viro, *Fahrenheit*.

neit : Aët. Philosoph. Anglic. N. 382 : requiritur ideo ab Aere aliquid ad Congelationem efficiendam.

Magis adeò probanda videtur eorum Opinio, qui Congelationis Causam arbitrantur Spiculas esse quasdam frigorificas, ab extrà admissas : quæ utcumque Globulos aqueos à se invicem dimoveant paululùm, Quantitatem tamen contactus hos inter & illas adaugent, & proinde mutuam eorum Cohærentiam. Ni ex hac forsan *Hypothesi*, vix alia datur Methodus, insignem istam Aquæ Expansionem, dum congelatur, explicandi: quæ verò Aquæ gelatæ Expansio evenit semper, siue Aeris fuerit expers, siue non.

Quoniam verò congelatio omnis artificiosa, Sale quodam mediante, perficitur, haud absurdum est credere Spiculas has frigorificas salinæ esse Naturæ.

Quod verò datur salinum aliquod Principium, per universam *Atmosphæram* disseminatum, vero simile est admodùm à Vitrioli Generatione in ipso Colcothare, utcumque Sale sit Destillatione, aut ullo alio modo, privatum. * Nitrum porrò de novo producitur, ex ipsa Terra damnata, ex ipsis insulsissimis Cineribus, modò hæc inter & apricum Aerem libera detur Communicatio. Unde oritur Nitrum, ut dicitur calcarium, nisi ab hoc Sale aereo? Nonne Ferrum, etiam super altissimas Turres, Ferruginem contrahit? quod ab eodem omninò evenit Principio. Plurima item Mineralia, & Glebæ metallicæ, pristinam recipiunt Naturam; licet vi Ignis omni fuissent orbata Sale, ex ipso nimirùm Fonte. Sal hoc
univer-

* Vid. Frid. Hoffman. Historiam, &c. Nitri.

universum agnoscit illustrissimus Nevvton; utique ex Analyfi Chemica clarissimi Hombergii solus videtur & idem Parens & Origo omnigeni Salis; prout scilicet sit hac, vel illa, Matrice receptum, huic, vel illi Materiæ, coadunatum.

Atqui non prorsus alienum est credere hoc Sal nitrosæ esse Prosapiæ, dum observamus & Nitri Aciculas, & Spiculas glaciales, imò Salinas ipsius Roris particulas, Forma esse simillimas. Quinetiam si reputamus, quæ referuntur à dignissimis Fide * Viris, de Armenia, Tartaria, China, &c. Terris nimirum Nitro quàm maximè abundantibus; quod ibi scilicet, quamvis Æstate Sol interdiu omnia quasi adurit, Noctu tamen sævit rigidum Gelu: magna adeò Copia decidente Sale nitroso, quem Solis Ardor elevaverat. In nostra etiam Regione, post Diem calidiorem, verno præsertim Tempore, observamus sæpe mane sequente stagna, camposque omnes, Glacie, ac Pruina, obductos: quod quidem vel ipsa Æstate contingeret, nisi vis Solis, tunc Temporis vehemens, particulas nitrosas, hic non æque ac in Oriente abundantes, diffringeret & proinde dissiparet. Hæc sanè arguere videntur, quod Abundantia Nitri aerei plus faciat ad Congelationem efficiendam, quàm sola Paucitas Ignis: media enim Hyeme, cùm *Thermometrum* longè majus denotet Frigus, nusquam sæpe apparet vel minima Glacies. Gradus utique Frigoris, quo Glacies producitur, minimè quidem stabilis & certus est; Glaciem namque sæpe notavi Mense Martio, aut Aprili, cùm Spiritus Thermometri

Hau-

* Tournesfort, *Voyage des Levant, Lettr. 18. Le Comtee Itinerar. Chinois.*

Hauksbeiani fuerit ad 55. tantum: è contrà nullam omninò Mense Decembri, cum descenderit usque ad 65. Sed de his satis.

3. Itaque de Calore Acris, eique accedente Humiditate. Calor omnia, vel ipsum Ferrum, expandit; multò magis ideò Humores Corporis humani ejusque Vasa; Sanguinis autem Rarefactio, & Vasorum Relaxatio, de Momento circulantium Humorum detrahit: Secretiones hinc deficiunt & Vires; hac ergo de Causa non æque sumus agiles Æstate, ac Hyeme, aut Tempore verno. Qui torridas habitant Regiones, vix sunt, nisi Noctu, ad Munera Vitæ obeunda habiles, tota fere Die dormiunt, præcipue ardente Sole.

At si æstuosa simul sit Atmosphæra & humida nimis, de sanitate periclitatur admodum. Est calidi, est etiam & humidi, laxare Fibras; quid conjuncta? eas ferè omninò resolvunt. Imò quandoquidem uda Aeris Temperies plerumque etiam Levitate peccat, quod ut vidimus suprà, vim circulantem minuit multum, & quoniam humidus Aer *Perspirationem* insuper inhibet valdè, meritò prorsus, ab ultima Antiquitate, talis *Atmosphæra* Constitutio reputata fuit pestilens.

Obstructi adeò Humores fiunt indies magis magisque acres, ob defectum Motus idonei Lympha lentescit, Cruor fere in Grumos faceffit, ejusque Sales, se mutuò attrahendo, in noxias abeunt *Moleculas*, brevique putrescunt Humores. Morbi proinde quamplurimi oriuntur, & acuti, & *chronici*, cum durat diu gravis adeò & infelix Cœli Constitutio; in qua, brevis sit utcunque mora, vel validissimus Homo vim Corporis &

Animi languidiorem fieri citò perſentit. Aer enim Vaporibus, præſertim ſulphureis (ut Experimenta nobilis Boylei & acutiſſimi Haleſii monſtrant) onuſtus plurimum *Elaſticitatis* ſuæ protinùs amittit; adeò ut vix explicandi Pulmones vim retineat: unde paulò ante, & cum Fulgura vibrantur, haud pauci Spiritum difficulter admodùm trahunt; *Atmoſphæra* tunc nempe Vaporibus ſulphureis æſtuante. Hac porrò de Cauſa imbecilliores quamplurimi, ne vel per Diem unum, alterumve, ſufferre queunt ingratum Urbis Aerem, Fumis pollutum innumeris; qui tamen commodè ſatis, imò alacrem Rure degunt Vitam. Ad rectam utique Valetudinem tanti conducit purum & apicum respirare Aerem, ut abſque eo, in Morbis quamplurimis, vix ulla alia Medicina proficiat: quod tam ſæpe notavi, ut non poſſim quin, cum elegantiffimo Poeta, clamem,

*O fortunatos nimium, ſua ſi Bona norint,
Agricolas!* ———

Quorum nempe & Otia & Negotia ſaluberrimis in Agris peraguntur. Aura quippe ruſtica longè magis pura eſt, & *elaſtica*, quàm quæ, infinitis urbanis Sordibus contaminata, gravis admodùm & inſalubris evadit; æſtivo præſertim Tempore, cùm Solis Ardor omnigenos excitat Vapores. Eſt inſuper tunc frigida magis, ac Halitu ſaluberrimo Herbarum Spirituque Terræ vegetiſſima, ad recreandas Vires, & Pulmones expandendos, fit idonea maximè; nec verò pinguibus foedata Vaporibus, vel minimè, *Perspirationi* officit; quin eam promovet plurimùm.

Tanta

Tanta hinc nos perfundit Alacritate purus & pergratus Kuris Aer, dum & Respirationi, & *Per-
spirationi*, tantoperè simul infervit.

4. De Aere calido, & sicco; qui, licet Constitutione modò descripta longè salubrior, tamen haud est innoxius; præcipuè si diutiùs maneat. Aer namque ficcus magna plerumque Gravitate pollet & *Elasticitate*, quod Motum Sanguinis multùm incitat: quatenùs verò calidus est, Humores perspirantes exhaurit maximè, unde *Serosa* Pars Sanguinis dissipatur, & liquidissima Corporis avolant: restat adeò Cruor spissus nimium; nihil namque jam humidi ex *Atmosphæra* torrida per Cutis Poros imbibitur. Hinc magnus sequitur & validus Sanguinis Attritus, ac proinde Calor; qui, & ab extrà item auctus indies, salina & sulphureas Humorum Partes exacuit assiduè, donec tandem fiunt acerrimæ: idque eo magis, quo minùs jam in Pulmone refrigeratur Sanguis. Si suavissimum Butyrum, vel quodvis Oleum animale, intenso Solis Ardori exponis diu, brevi abit in Liquamen *alkalinum* putridum & valdè *corrosivum*. Sic diuturnus Æstatis Fervor usque adeò torret Humores animales, ut longè acriores sub Autumnum sint, quàmverno Tempore. Hæc utique est Adustitio ista Sanguinis, à veteribus toties memorata: Siquidem magna hinc copia Bilis acerrimæ generatur; inde Cholera, *Dysenteria*, Colica biliola, putridæ & (ut dicuntur) Febres malignæ, ineunte Autumno, ita sunt frequentes. Torridæ sanè Zonæ vehemens Ardor usque adeò exhaurit Incolarum Humores, usque adeò crispat Fibras, ut quasi perusti videantur. Imò ex Relatione Medicorum, qui fervidis in his Regionibus Artem

exercuerunt, Sanguis eorū longè magis crassus est & niger, quàm in Hominibus Europæis: hinc Febres ardentissimæ & pestilenciales iis in Locis *endemiæ* sunt, putrescentibus scilicet levissima de Causa Humoribus.

Magnus utique Medicinæ Dictator, Hippocrates, non solum Morbos diversos, sed & Temperamenta, imò & Mores Hominum, ab Aeris Varietate maximè pendere statuit, in pulcherrimo de Aere, Aquis, &c. Libro: cum quo sanè consentit omninò fidus ejus Interpres, Galenus, in Commentar. & alibi de Temperatur. Præcipuè in Capite ὅτι τὰ τῆς Ψυχῆς ἦν, &c. Hoc innuit etiam eleganter Lucretius, Lib. vi.

*Nam quid Britannum Cælum differre putamus;
Et quod in Ægypto'st, qua Mundi claudicat Axis?
Quidve quod in Ponto'st differre à Gadibus, atque
Usque ad nigra Virum, percoëtaque Sæcla Calore?
Quæ cum quattuor inter se diversa videmus,
Quattuor à Ventis, & Cæli Partibus esse,
Tum Color & Facies Hominum distare videntur
Largiter, & morbi generatim Sæcla tenere.*

Horum autem paulò infrà hanc reddit Rationem;

—— varius concinnat id Aer:

Sin autem varia Aeris diversorum Climatorum Temperies varios omninò producit morbos, cur non & varia etiam, vel ejusdem Regionis, Tempestas diversos perinde gignat Corporis Affectus? Atque ita se profectò Res habet; verno nimirum Tempore, si longi præcipuè, ac sicci, Venti boreales continuarint, Febres inflammatoriæ, Pleuritiides,

fitides, Peripneumoniæ, Anginæ certo certius invadunt. Autumno contra Febres lentæ, putridæ, quartanæ, Cholerae, Dysenteriae, &c. ferè sæviunt semper. Sic itidem, alii prorsus oriuntur morbi sub humido tepidoque Cælo, alii autem omninò & diversi sub frigido siccoque. Observationes equidem hujusmodi perpetuæ fuerunt ab Ævo Hippocratis huc usque; totam adeo superiorem Doctrinam confirmare videntur. “ Non quòd non omni Tempestatum Genere Homines, per omnia Genera morborum & ægrotent, & moriantur; sed quòd frequentius tamen quædam eveniunt. “ Sic latinus Hippocrates, Lib. ii. Præfat. — Ista Dubio procul Constitutio Aeris est salutifera maximè, quæ, ex stabilita Lege Naturæ, propriæ Anni Tempestati respondet: ideò nec Hyems tepida juvat, nec Æstas pluvia.

Quoniam verò diversa Atmosphæræ Constitutio, diverso planè modo Corpora humana afficit, ratio certe & modus hujus Diversitatis semper a Medicis est conspiciendus; &, quod de Locorum differentia dixit Celsus, æquè verum est de Varietate Tempestatum: “ differre nempe, pro Natura Locorum, Genera Medicinæ, & aliud Opus esse Romæ, aliud in Ægypto, aliud in Gallia. “ Hoc quidem abundè testantur Medici diversarum Gentium, diversis utentes Methodis; quæ tamen omnes ad Sanitatem Ægros felicissimè perducunt. Nonne, ergo & Ratio quoque habenda est variarum Atmosphæræ Constitutionum, vel in eadem Regione? Optimus ille quidem, ac diligentissimus Observator, Sydenhamius, notavit; “ qua Methodo, currente Anno, Ægrotos liberaveris, eadem ipsa, Anno

“ jam vertente forsitan e medio tolles. ” Uno proclamant Ore Medici, quòd morbi vernaes multo feliciùs Sanguinis Missionem admittant quàm Autumnales: & hinc illæ forsàn Sydenhamii Lacrymæ, qui fuit semper in Venæ Sectione multus admodùm. Morbi sanè, vel Generis ejusdem (ut constanter observavi) largiorem longe poscunt Sanguinis Detractionem, eamque multo faciliùs ferunt Ægroti, dum siccum adest Cœlum, & elata perstat *Barometri* Statio, quàm dum æstuosa Aeris Humiditas vim ferè Vasorum resolvit. Hoc utique perpetuum est, vel in ipsis morbis pectoris. *Asclepiades* olim, ut refert *Coelius Aurelianus*, observavit “ apud Athenas atque Urbem Romam, “ *Phlebotomia* vexatos (utor *Aureliani* Verbis) “ vel pejùs acceptos esse *Pleuriticos*, in *Pario* “ verò atque *Hellesponto* resumptos ac relevatos.” Roma nimirùm atque Athenæ humidiore longè & tepidiore gaudent Aere quam *Hellesponti* Regio, sicco, ac sæpe perfrigido, Vento Asiatico perflata.

Robusti certe & firmi Homines faciliè ferunt Sanguinis missionem; flaccidi verò, etsi æquè succidi, non ita: quia, propter Debilitatem Fibrarum, *Æquilibrium Solida* inter & Fluida haud restituitur confestim; unde sequitur brevis quasi Sanguinis stagnatio. Pondus autem *Atmosphææ* magnum universum Corporis Habitum premit validè & corroborat, ac proinde Sanguinis motum incitat. Frigus, siccitate præsertim adjuncta, vim Fibrarum adauget plurimùm; accedentibus adeò simul utrisque, vis Vitæ fortior evadit, & vel ipse Corporis Habitus pro Tempore velut mutatus videtur: unde, tali durante

rante Aeris *Catastasi*, vel infirmiores ex facili tolerant Venæ Sectionem.

Non solum in Morbis curandis plurimum valet Atmosphæræ consideratio, sed ad Sanitatem etiam tuendam maximi est momenti. Contraria contrariis curantur, ut in Adagio est: sic si Ver frigidum & siccum est, Pleuritide, Peripneumonia, Angina, periclitamur; qui verò Diæta humectante utuntur & Potione tepida laxante, vitio Tempestatis occurrunt, morbosque evadunt ut plurimum. Si Frigori autem accedit humidum multum, *Cardiaca* quædam admiscenda sunt, Corpusque Vestibus muniendum est probè, ne *Perspiratio* inhibeat nimis. Æstuosa contra udaeque Aeris Temperies siccam omninò & astringentem poscit Diætam, Vinum & austerum Aqua frigida dilutum, denique quæ & Vim Fibrarum comprimant, firment, & à Sanguine Lentorem ac Putredinem arceant. Balneum porrò tunc frigidum idoneum est maximè. Quæ contra Humore nimio & Tepore pollent, aliena sunt prorsus; jurulenta ideò tunc vitanda sunt, & tepida muliercularum Sorbitio.

Certè nullo non Tempore Anni Morbi invadunt, Autumno autem quamplurimi; nam tunc fere “ meridianis Temporibus Calor, nocturnis
“ atque matutinis, simulque etiam vespertinis
“ Frigus, est: Corpus ergo, subinde meridia-
“ nis Caloribus relaxatum, subito Frigore exci-
“ pitur. “ Hæc rectè Celsus, Lib. ii. cap. 1. Sanctorius observavit insuper, quòd ab Æqui-
noctio autumnali ad Solstitium hyemale, qua-
libet Die, minus Libra circiter perspiramus. *Medicin. Static. Sect. 2. Aphor. 41.* tantoperè
nimirum prohibent *Perspirationem* humida Au-
tumni Frigora: eoque magis tunc huic ob-

noxium est malo Corpus, quo magis relaxata sint Vascula æstivo Calore, unde non satis validè propellebant contenta Fluida, quæ majorem indies Lentorem proinde contrahebant.

Si jam & his addamus, quantum Æstatis Ardor percoxerit Humores, iisque majorem induxerit Acrimoniam; haud mirum utique videbitur, si Autumnus plurimos opprimat incautos: tunc enim Humores sunt acriores solito, & eorum *Perspiratio* impedita plurimum. — His verò perpensis, Methodus *prophylactica* manifesto apparet, quæ scilicet & Fibras corroborare, ac debitam Sanguinis Fluxionem conservare potest: quibus nempe *Perspiratio* pergat ordinata probè & satis constans. Interponi verò, si quid ego judico, debent *Eccoprotica* quædam subinde, ad biliosam Colluviem evacuandam: hoc sæpe Alma molitur Natura, ea nempe gravata, *Diarrhæa*; Cholera, seu *Dysenteria*, excitatis: quibus autem tempestiva Rhei barbari Dosis, repetita prudenter, occurrerit omninò, naturamque levaverit æquè.

Sexcenta utique hujusmodi dicenda essent, ni prælonga forent & obvia satis Lectoribus idoneis: Quorum nemo jam fortè dubitat, quin diligens *Atmosphææ* Contemplatio sit Medicis perutilis admodum.

Quod ad Methodum attinet & Medicinam, quas variis in morbis infrà laudavi, non sunt equidem vana Musei Commenta; sed, quæ, per multos jam Annos comprobata, successerunt optimè; imò (si id sit alicujus Momenti) in splendidis sæpe Personis: tanta scilicet Remediis, mihi probè expertis, fuit Fiducia.

Formulas quidem Medicamentorum exhibui nullas, quod sane vix aliquid sapit præter Osten-
tatio.

tationem Artis & pomposam Scientiæ Venditationem. Ille solum, cui Natura Morbi perspicitur, intelligit bene, quæ poscit Remedia. Plures audiivi totas blaterantes *Pharmacopœias*, qui tamen ne intellexerint quidem quid vel ipse Pulsus significabat. Concinnam utique ac simplicem præscribendi Formulam laudo maximè, minimè verò Farraginem medicamentosam, ultra Garamantas, & Indos sæpe petitam, solo plerumque Novitatis Amore conscriptam. Longè verò, longèque magis, ridicula Praxis eorum est, qui temeraria Manu universalia porrigunt Arcana; omnibus scilicet Morbis accomodata: quasi nimirum esset in Natura Rerum, ut ipsissimum illud, quale demum cunque fuerit, stricto nimium, pariterque laxo, Corporis Habitui mederetur æque, ut rapidam æque contunderet Febrem, lentumque Hydropem. Sed *page Nugas! Si Populus vult decipi, decipiatur.*

Hæc Tu Romane caveto! — Sed Romæ Quis non?
Persf.

Sequentes Observationes factæ fuerunt omninò ad modum, quem præclarissimus noster JURINIUS in Actis Philosophicis, N. 379. descripsit; quemque jam omnes fere sequuntur, præ cæteris laudatissima Societas Edenburgensis. *Barometrum* nempe ex Tubo satis amplo & Cisterna latissima constructum est: Argentum Vivum verò, quo implentur, purissimum Destillatione præparaveram. *Thermometrum* idoneo situm est Loco, quod fabricavit *Hauksbeius*. *Barometrum* ad Mensem Julium, Anno MDCCXXXIII. supra Maris infimi Superficiem steterat 46. Pedes circiter;

citer; ab isto Anno autem & Mense, huc usque, fuit ad 30. Pedes tantum. Humiditatem Aeris per varia *Ilygrosopia* notavi; præcipuum verò est ad Formam D. D. Molyneux Act. Philosoph. N. 172. Infundibulo utor Diametro 25. Digitos lata, eoque circulari, ad Pluviam excipendam: ita verò positum est, ut æquè pateat undique omni Vento.

Sequens Schema Ventorum ex Plinio excerpti, ut notius foret de qua Plaga Cœli Ventus spirabat, cum hoc, vel illo, nomine utor. Ubi verò & Vis Venti & Directio notatur simul, Literis usus sum Pyxidi nauticæ inscriptis vulgò, *i. e.* E. VV. N. S. & compositis N E. N VV. S E. S VV. & sic deinceps.

Non sum nescius utique quòd Varro duodecim facit Tractus Ventorum; Vitruvius etiam Viginti quatuor, illosque miris quibusdam Voci- bus, ut erat earum amantissimus, distinguit. Tabula verò * Plinii, seu, ut vocat, Tympanum circinatum, ad generalem Ventorum Distinctionem facit satis; porrò eorum Nomina Pliniana diu fuerant Civitate Romana donata.

Favorimus equidem, apud † Aulum Gellium, discrepat a Plinio in Verbis Euris, Caurus five Argestes, Africus five Libs: Eurum enim ad Exortum æquinoctialem refert, Plinius verò & Seneca ad Exortum hybernum, habentque autoritatem Aristotelis, Lib. 2. *Μετεωρολογικ.* Capit. 6. qui expressè dicit "Ευρος ἀπ' Ἀνατολῆς χειμερινῆς πνεῖ; sic in Libro Aristoteli perperam adscripto,

* Confer. Caput 47. Lib. 2. cum Capite 34. Lib. 18.

† Lib. 2. Capit. 22.

πτο, περὶ Κοσμῶ Capit. 4. Ἐυρος δὲ ὁ ἀπὸ τῆς περὶ
τὰς Χειμερινῶς, &c. Dubitat porro ꝑ Seneca an
Argestes idem sit quod Corus; imò Favorinus
ait quòd Argestes, seu Corus, adversus Aquilo-
nem flat, & quòd Libs, sive Africus, contra
Vulturum: sed forte corruptus est hic Gellii
Locus. Nemo enim antè Corum pro Vento in-
ter Meridiem & Occidentem usurpavit unquam;
& qui potest * * Africus ex Africa ad Italiam
spirare, nisi ex Plagis Australibus? Idem de Libe
dicendum est, quòd ex Libya ad Græciam, un-
de Ventus iste Λίψ dictus est. Audi iterum
Aristotelem, Loco suprà citato de Enumeratione
Ventorum, Ἀργέστης ἀπὸ Δυσμῆς Δερυνῆς πνεῖ —
Λίψ ἀπὸ Δυσμῆς Χειμερινῆς. Quid si Corus à γρ,
Frigus? semper enim inter Ventos frigidos annu-
meratur: Sic Virgilius Lib. 3. Georgic. v. 356.

— *Semper spirantes Frigora Cauri.*

Argestes itidem apud Ovidium Libro 5. Fa-
storum.

Frigidus Argestes summas mulcebit Aristas.

Plymuthum Oppidum situm est ad ipsum Sinum
Portus amplissimi, qui longè latèque patet Ven-
tis australibus. Ex Oriente munitur & Occi-
dente altissimis Clivis, ad imum verò clauditur
Rupi-

ꝑ Vide Seneca Quæst. natural. Lib. 5. Cap. 16.

** Vide Horat. Od. 3. Lib. 1.

— nec timuit præcipitem Africum
Decertantem Aquilonibus.

Rupibus marmoreis : porrò utroque ejus à Latere Æstuarium longe porrigitur . Surgunt à Tergo montes continui ad ipsas usque Alpes Damnonienses , decimum circa Lapidem distantes . — Oppidi Situm idèò descripsi , ut magis forsan (inter cætera) pateret Ratio tantæ Pluviæ , quæ hic ruit quotannis . — Ab alto nimirum Oceano , Vaporibus Nubibusque latissimus , duo inter Promontoria excelsa , Aditus panditur ; quæ arduis proinde Clivis utrinque coacta , ad intimum adiguntur Sinum , ubi scopulis montibusque impingentia condensantur , tandemque sub Forma Pluviæ decidunt . — Neque hic jam memoro , quod huic haud parum adjicit Articulo , hanc Oram nempe Britannia , in modum quasi Isthmi , duo inter Maria longè perfectam .

Eo quidem lubentiùs Historiam *meteorologicam* sequentem edidi , quo magis utiliorem eam fore judicavi : quandoquidem nihil hujusce modi , quantum memini , in hac occidua Parte Britannia inceptum fuit antehàc unquam . Atqui ex ipsa Argumenti Natura Latinis ego potiùs Literis , quàm vernaculis , sequentia descripsi : quibus siquidem Gens nostra cum Exteris Observationes suas communicare potest , illi pariter cum nobis vicissim . In hac sanè Palæstra jam plurimi , ubique fere Gentium , versantur : utinam tandem aliquando ex plurimis , diu continuatis , & toto penè Terrarum Orbe captis Experimentis extaret demùm generalis aliqua & perfecta *Atmosphære* Historia ! Opus certè utilissimum , diu multumque desideratum ! Hunc ergo Obolum in Ærarium publicum conjicio , in quo
qui.

quidem exarando Diligentiae plurimum insumpsi;
 licet Elegantiae parum; quippe Medicum ago,
 non Rhetorem.

*Non nobis licet esse tam disertis,
 Qui musas colimus severiores.*

Martial.

NOTÆ sequentes, quæ in Opere passim occurrunt, sic explicandæ sunt.

AB i. e. Lumen Boreale ; *viz.* Mense Martio, 1728. sic habens: *AB* 22. 10. P.M. VV N VV 1.; ita porro legendum: Lumen erat Boreale Die 22. Martii, Hora Noctis decima, Vento VV N VV leniter spirante.

1 Ad Diei alicujus pluvii Numerum superscripta significat isto Die haud exiguam decidisse Pluviam;

11 multam;

111 graviolem corruisse Pluviam;

1111 gravissimam.

Ubi Dierum Numeri Linea conjunguntur, *viz.* 12 — 16. significatur aliquam Pluviam omni Die, à 12. ad 16. decidisse.

X ad Caput Figuræ, Venti vim denotantis, indicat Ventum istius Ordinis fortem; ad Imum verò, lenem; adeò ut 4^x vehementem denotet Procellam.

Per omnia Stylo utor *Juliano*, sive vetere.

Observationes factæ fuerunt bis Die plerumque, scilicet Hora fere octava matutina & sexta pomeridiana.

Literæ Romanæ, (A.) (B.) (C.) &c. ad Notationes referunt.

OBSERVATIONES

D E

Aere & Morbis Epidemicis.

ANNO MDCCXXVII. reterridæ Æstati (majore quàm antehàc unquam Erucarum Numero infestæ) successit Hyems pluvia satis, nec intempesta valdè, ni quòd interfuit fœcus admodùm Mensis Novemb. crasso tamen valdè nubiloque Cælo fœdatus. *Mercurius* interim in *Barometro* ad Stationem præaltam evectus est. Venti orientales plerumque, aut aquilonares, afflabant, haud verò insequabatur tempestivum Gelu. Delabente *Barometro*, Decembris Initio, quàmplurima decidit Pluvia, paulò post autem resurgente Gelu rigidum invasit, a Die decimo octavo scilicet ad vigesimum secundum: Pluvia inde ad Finem usque.

Morbilli, qui toto Mense Julio Sextilique evanuerant, medio Septembri recurrebant, Pluresque adoriebantur indies; malique admodùm fuere Moris Octobri & Novembri. Pari cum his Passu progressa Tussis *convulsiva* quàmplurimos invasit Pueros, donec uterque morbus Caput subduxit Mense Decembri. Porro durante Octobri

2 OBSERVATIONES. [1727
bri & Novembri * Febris lenta *nervosa* haud
paucos corripuit; Tussisque vehemens in omnes
fere (A) Equos grassata est, quæ ad Finem us-
que Decembris perduravit, è qua tandem Pars
major evasit.

Ad hunc adeò modum definebat Annus
MDCCXXVII. cujus exeuntis Historiam egò at-
tigi leviter; ut, siqua forsan per Conjecturas
liceret, sequentium Morborum Causas rimare-
mur: neque enim, *Epidemicorum* Naturam in-
vestigando, solùm intersit cognoscere quales Dies
sint, sed & (B) quales etiam præcesserint antè;
ut cum Celso loquar, Libro secundo, Capit. 1.

Totam Pluviæ Quantitatem, quæ decidit hoc
Anno, sic habeto.

	Dig. Dec.		Dig. Dec.
Januario,	2.965	Februario,	4.452
Martio,	1.868	Aprili,	1.511
Maio,	5.902	Junio,	2.483
Julio,	1.080	Augusto,	0.299
Septembri,	3.867	Octobri,	2.490
Novembri,	0.826	Decembri,	4.172
			Dig. Dec.
		Summa Quantitas,	31.915.

Breves quædam Notationes.

(A) In Obsidione Trojana, primò Canes;
mox Muli, pòst Homines, Peste correpti fue-
runt. Haud semel observavi morbum inter Pecora
erupisse

* Vidè infra *Dissertat. de hac Febre*, pag. 147.

erupisse primò, dein eum ipsum paulò post Tempore in Homines epidemicè sæviisse; quod & Anno MDCCXXVIII. & MDCCXXXIII. fuit manifestissimum: in quibus nempe Tussis gravissima omnes penè Equos corripuit uno, alterove, Mense citiùs quàm Homines.

Quum nimirum hoc Animantium Genus maximè sub Dio versetur, morbosæ Aeris *Diathefi* sit valdè obnoxium. necesse est, non tantum Aerem inquinatum respirando, eumque per Cutis Poros imbibendo forsitan; sed, dum Aquas hauriunt, & carpunt Gramen, condensatam quasi sub Specie Roris *Atmosphæram*, morbidis Particulis contaminatam, exugunt: nam ut Lucretius Libro vi.

*Aut in Aquas cadit, aut Fruges persidit in ipsas;
Pestilitas.*

Inde est fortassè, quòd morbi hujusmodi *epidemic* longè frequentius inter Rusticos & Paganos oriuntur, quàm Incolas inter Urbium & Oppidorum; in his quippe Locis Ignis perpetui, Frequentia Hominum, atque id Genus alia, gravem noxiumque Aerem mutant maximè, aut omninò depellunt: donec ita tandem sit onustus morbosà materia, ut, rupto quasi Aggere, Torrentis ad instar, irruat ubique. Hoc hisce sit Argumento, quòd, qui intra Domicilia luculentà versabantur assiduè, rariùs *Epidemico* Anni MDCCXXVIII & MDCCXXXIII, correpti fuerunt.

(A) Constat utique à primo Autumno *Atmosphæram* fuisse crassam admodum, & Vaporibus plurimis onustam, quos Ardor vehemens prægressæ

gressæ Tempestatis elevaverat: qui, licet hic ita condensati fuerint, ut, sæpe sub Forma Pluviæ, durante Septembri & Octobri, deciderent, atque ita nostrum non inquinarent Aerem; in aliis tamen Locis & September & October fuere crassissimo Aere fœdati, & Menses proinde insaluberrimi. Per Novembrem certè, Aer, etiam hic, fuit crassus admodum & gravissimus, omni-gena nempe Fuligine è retorrída Tellure exhalata obscuratus: atque ab hac causa tanti fuit Ponderis, non à pura sua *Elasticitate* & *Gravitate* propria, quæ Vapores evehunt altiùs, eosque dispergunt æquabiliter.

Qui præsentem *Atmosphæræ* Faciem, dum Morborum *Epidemicorum* Causas disquirunt, intuentur solùm, nec respiciunt elapsam, parum utique vident, aut eorum Causas, aut Naturam. Exemplo sit Aeris Constitutio sicca & frigida, quæ, non tantùm uno, vel & altero, Die durans, nimiam Fibrarum Rigiditatem generat, & morbidam Humorù Densitatem, nisi & per Dies aliquot continuos duraverit. Rarissimè vides graves & pestilentes Febres fieri valdè *epidemicas*, si non post eximiam aliquam *Atmosphæræ* Qualitatem, diu perstantem.

Per Constitutiones Aeris mutabiles, Fibras fortè nimiùm corrugat hodiè ficcus frigidusque Boreas, cras eas fortè relaxat nimis humidus Auster: ita quoddam quasi *Æquilibrium*, in quo Sanitas consistit, servatur; atque id maximè profectò, si quis probè cavet subitas has mutationes. Haud rarò herclè notavi, post *Procellas* gravesque *Pluvias*, Febres *epidemicas* multùm fuisse imminutas, & vi & numero; *Effluviis* nempe contagiosis & *morbificis Atmosphæræ*

phæra Conspirationibus, hoc modo, dispersis:
Ideò fortè divus Augustus, cum in Gallia moraretur, Templum & vovit & fecit Circio, Vento vehementissimo; eique Turbini, etsi Ædificia sæpe diruenti, Gratias publicas agebat Gens Gallica olim, referente * Seneca: utpote cui Salubritatem Cœli sui deberet.

* *Quæstion. Natural. Lib. 5. Cap. 17.*

DE CONSTITUTIONE

Aeris & Morbis Epidemicis,

Anno MDCCXXVIII.

JANUARIO.

PLUVIOSA admodum (A) humidaque Tempestas induxit Annum; in ipso quippe Mense Januario cecidit Pluvia ad Dig. 6. 108. immensa Quantitas! Fuit porro Nivis aliquantum, Gelu parum valde, Procellæ utique satis. *Mercurius* in *Barometro* depressus fuit maximè, ab ipso Initio Diem *xxi.* adusque, sæpe infra 29. 0. Ventus ut plurimum australis erat, vel occiduus, isque sæpe nimbosus: sub finem Mensis autem Subsolanus, fiante nonnunquam Borea, Cœlo Apricitatem & Columnæ mercuriali Altitudinem dedit, Nive subinde, aut Gelu sequente. A *xxvi.* ad *xxviii.* haud parum Pluviæ cecidit, etsi *Baroscopium* fuit ad 30. 0. & altius, Vulturno spirante: Argumentum sane Aerem onustum esse Vaporibus adhucdum.

Pluvia

Pluvia Die $\frac{11}{1}$. — $\frac{111}{6}$. — $\frac{11}{8}$. — $\frac{1}{10}$. $\frac{111}{13}$. $\frac{11}{14}$. 16. $\frac{11}{17}$.
 $\frac{111}{18}$. $\frac{1111}{19}$. — 22. 26. $\frac{11}{28}$.

Vehemens Grando corruit 15. p. m. S S VV 3.
 Nix gravis 23. a m. E N E 3.

Tota Quantitas adeò Aquæ pluviae collectæ æquabat 6. 108.

(B) Maximi Maris Æstus inundantes 18. 19.
 S S E 3^x. Barom. 28. 5.

ii Altitudo maxima fuit Die 31. viz. 30. 2. E b N. 2.
 — minima — 18. — 28. 5. S S E 3^x.

Barometri media Altitudo 29. $3\frac{17}{31}$.

Dies frigidissima fuit 25. Therm. Haukf. 69. N N VV 1.
 — tepidissima — 3. — 50. S VV 1.

Temperies Aeris media $56\frac{5}{31}$.

Ab incipiente Mense Tusses & Catarrhi fuerunt valdè frequentes, sæpe cum Tumore Faucium molesto, levi comitante Febricula plerumque Rheumatismi & Anginæ passim. Magnus adest undique Spirituum Languor, & creber Paroxysmus hystericus.

FEBRUARIO.

Altam tenuit Stationem Mercurius ab Initio Februarii ad Diem xviii. spiraverunt ut plurimum intereà Venti aquilonares, qui Cœlum reddidere siccum & apricum, Terramque astrictam Gelu, ineunte præsertim Mense. Post Diem xviii. Nix, Pluvia, Ventusque ut plurimum australis. Temperies Aeris multo magis tepida & humida fiebat, gravi Pluvia sub finem ruente.

Pluvia, Die 13. 18. ¹¹20. ¹¹21. ¹¹22. ¹¹23. ¹25.
Dig. Dec.

Nix multa 19 = 1.924.

Levis fuit AB 26. Hora 9. p. m. E b N 1.

8 Altitudo maxima 2. 30. 3. E N E 3. } media Altitud. hoc
— minima 20. 29. 0 V V S V V 2. } Mense 29. 8. ⁹/₂₉

Dies frigidissima, 1. 67. N E 2. } media Altitudo Ther-
— tepidissima, 25. 47. 8 1. } mom. 57 ¹⁶/₂₉

(C) Tussis, quæ à primo Januario fuerunt valdè frequentes, jam factæ frequentissimæ, plurimis, Junioribus præcipuè, infestæ sunt; quibus accesserunt Destillationes maximæ, ac Dolores Faucium atque Dentium, cum Glandularum Parotidum & Maxillarum Tumoribus: Hæc ferè omnia in Mense superiore, at jam cum his ingruit febrilis Affectio & Respiratio difficilis, imò pluribus, medio in hoc Mense accidebant Pleuritides & Peripneumoniæ; quorum Sanguis extractus fuit viscidus & parùm serosus: cum tamen, durante Januario, vel ab ipsis Rheumaticis, rarò fuisset valde glutinosus. Tunc porò satis fuit exhibuisse Spirit. Volat. oleos. Elix. Asthmat. le Mort. aut tale quid ex lenioribus Diluentibus, ad Sudores eliciendos & Tussim sopiendam; rerò Venam secantes, nec Epispastica frequenter admoventes. Jam Sanguinem mittere sæpe necesse erat, & repetitis Anodynis Vehementiam Tussis lenire; Anacatharsin & facilem Respirationem larga pectorali & molli Potione detergente moliri: ad quem quoque Finem Opus sæpe fuit Medicamentorum ex Oleosis, Gum. Ammoniac. Oxymel. Scillitic. &c. cum eo tamen,

men, ut, dum hæc facta sunt, Virium Languor Cardiacæ leniora postularet; *Epispasticis* interea crebrò applicatis. Febris namque fuit lenta plerumque, Urina neque rubra valdè erat; nec Lingua valdè arida, nec urgebat importuna Sitis. Hoc Mense porrò *Variolæ* erant *sporadicæ* & mites, rarò lethales.

M A R T I O.

Ventus Martio regnans fuit occidentalis, subinde ad Austrum, ad Septentrionem subinde, vergens, consequente, ut solet, pluvia, seu aprica Tempestate. *Mercurius* in *Barometra* inconstans, rarò sublimis. *Nebulæ* sæpe, *Procellæ* aliquando, *Nivis* aliquid sub finem Mensis. Temperies Aeris crassa & humida, attamen non valdè frigida.

Pluvia. 1. 3. 6. 8. ^{II}9. ^I11. 13. 14. 16.—18. ^{III}19.
^{III}20. 22. 24.—26.—29 = 3 3 17.
 Dig. Dec.

Procellæ 14. 15. S 4. cum maximis Maris *Æstibus*. *Nix* alto mane 27.

AB 22. 10. p. m. *VV* *NN* *VV* 1. *Levis* *AB* 23. 8. p. m. *NN* *VV* 1. *Maximus* Halo circa Lunam 11. 12.

♂ *Altitud.* maxim. 3. 30. 2. *Malacia*. } *media* 29. 6 ¹¹/₃₀
 ——— minim. 14. 29. 1. S. 4. }

Dies frigid. 27. 60. *NN* *VV* 3. } *media* Term. Altit. 49. ²/₃₀
 ——— tepid. 17. 45. *VV* 2. }

Tusses frequentissimæ toto hoc Mense, levi plerumque cum Febrieula. Febres *rheumaticæ* & *catarrhales* quamplurimæ; *Ægrotantes* omnes ad Sudores erant valdè prompti.

(D) Tertianæ exquisitæ , ac semitertianæ ,
 Febres , jam sunt frequentiores longè quàm asso-
 lent in hac Regione : in Paroxysmis urgens
 maximè Vomitus biliosus, æruginosus, cum im-
 mensa Pituitæ tenacis Copia ; *Cephalalgia* gravis ;
 ac sæpe Delirium . Perpauci nunc *Variolis* labo-
 rant ; aliqui *Rubeolis* corripuntur & Juniores
 & Adulti.

APRIL 18

Principio Mensis multa Pluvia; cadente *Mercurio*; assurgente verò, medio Aprili, Apricitas, Aer interim crassus & nebulosus. A Die xix. ad Finem usque humilem plerumque Stationem tenuit *Baroscopium*, plurima ruente Pluvia; ita ut paucissimi intercurrerent Dies aprici. Aer fuit valde crassus, humidus & subfrigidus toto fere Mense: Sæpe Ventus occidentalis, persæpe furens Auster. Viæ publicæ omnes Aqua & Limo plenæ sunt.

Pluvia 1.—3.—5. 8. 9. 13. 19. 20. 21. 22. 23.

11 1 Dig. Dec.

25. 26. 28. — 30. = 4. 153.

Grando 11. 12. VV N VV 12

8 Altitud. maxim. 16. 30. 0. Malacia.
 ————— minim. 29. 28. 9. Sb E 3. } media 29. 5²/₃₀

minim. 29. 28.9. Sb E 3.

Dies frigid. 11. 55. N VV 1.
— tepid. 18. 36. S S VV 1. } media Therm. Altir. 45 $\frac{13}{30}$

— tepid. 18. 36. S S VV 1.

Morbi superioris Mensis, jam vi & numero aucti grassantur maximè: imò Febres intermittentes à levi sæpe Errore in putridarum Classem transiliunt, haud contemnendo Agrotantium Pericu-

Periculo ; facillimè porrò recidivæ corripiunt
quos ex toto reliquerant antè.

M A I O.

Aeris Constitutio humida & Ventus australis
ad medium propè Mensem duraverunt. Initio
Barometer fuit depressus ; à xvi. Caurus, aut
Septentrio, leniter spirans *Mercurium* tenuit ad
29. 8. circiter fere ad Finem usque : Aer interim
siccus erat & subtepidus.

Pluvia $\frac{11}{1}$ $\frac{11}{2}$ $\frac{11}{5}$ 9. 10. $\frac{1}{12}$ 15. $\frac{1}{18}$ 20. 21.
Dig. Dec.

= 1. 633.

8 Altitud. maxim. 21. 30. 0. Malacia. } media 29. $6\frac{12}{31}$
——— minim. 3. 28. 9. S S E 3. }
Dies frigid. 1. 46. Sb VV 3. } media Therm. Altit. $35\frac{27}{31}$
— tepid. 23. 30. VV N VV 1. }

Febris *Catarrhalis* ac Tusses jam evanuerè
penitus ; at (E) Febres intermittentes sæviunt
adhuc. Vix ullæ nunc *Variolæ*.

J U N I O.

Prior Junii Pars Ventos habuit australes &
occiduos, Pluviamque haud exiguan, ; *Atmos-*
sphæra etiam plerumque crassa erat & humida :
Baroscopium mediam fere tenuit Stationem. Poste-
rior Mensis Pars erat magis serena, sicca & ca-
lida ; Venti ab Oriente, aut Plagis arctois.

Pluvia $\frac{1}{1}$ 2. 4. 7. $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{11}{12}$ 17. $\frac{1}{20}$
Dig. Dec.

25. 26. = 1. 636.

Fulgur

Fulgur & Tonitru, 17. 26.

8 Altitud. maxim. 28. 29. 8. N. 1. } media 29. $5\frac{17}{30}$
 ——— minim. 8. 29. 2. S V V b S 2. }
 Dies frigida 10. 37. V V N V V 1. } media Therm. Altitud. 30. $\frac{14}{30}$
 — calida 29. 23. E S E 1. }

Febres intermittentes adhuc passim ; aliqua putridæ, lentæ, nervosæ.

J U L I O.

Per Initia Mensis Aer fuit apricus, ficcus & fervidus ; Ventus aut nullus, aut Subsolanus ; Ros plurimus ; labente autem *Mercurio* ix. & x. multa Pluvia, resurgente paulò pòst, Serenitas : dein relabente magis xv. & xvi. gravis Pluvia : varia pòst Tempestas ad Finem usque Julii, Vento plerumque ad Occidentem vergente : Aer interea erat longè humidior, & ad Finem valde crassus.

Pluvia $\frac{11}{9.}$ $\frac{11}{10.}$ $\frac{11}{15.}$ $\frac{11}{16.}$ 17. 18. $\frac{111}{20.}$ $\frac{1}{25.}$ $\frac{11}{26.}$ 28.
 Dig. Dec.

30. = 3. 179.

Die 2. Hora 11. p. m. malacia ; permagnum observavi Lumen boreale, cujus Radii lucidi, ac non colorati, vibrantes, terminari videbantur in coruscante quasi Umbella paulò ultra Zenith octo, decemve, fere Gradus, Meridiem versùs. Centrum hujus lucidæ Coronæ eodem fere Intervallo distabat ab Arcu meridiano, certissimè ad Orientem : quod idem utique haud rarò nuperis Annis notavi. Durante Splendore hoc boreali plurimus Ros decidit ; si ventus fuit aliquis, à Septentrione venit.

Die

Die 22. H. 9. p. m. N. 1. leve, at insolitum Lumen boreale eluxit, cujus Radii pyramidales, inverso planè Ordine, vibrabant: horum enim Vertices ad Centrum, quasi paulò infra Horizontem, sub ipso Axe boreo tendebant. Die 4. & 17. VV N VV 1. parvæ AB, at nihil insoliti. Tonitru 8.

8 Altitud. maxim. 3. 29. 9 Malacia } media 29. 6
 ——— minim 16. 29. 0. S. VV. 1. }
 Dies frigid. 23. 39. E. 1. } media Therm. Altitud. 28¹⁶/₃₆
 — fervidus 8. 18. E S E 2. }

Febres tertianæ & duplices tertianæ adhuc, paucæ quoque putridæ. Languores graves à profusis Sudoribus, quibus omnes infestantur maximè: Laxis nempe & patulis Cutis Poris Humores, à Fervore Tempestatis rarefactos, & colliquatos, immoderatè transmittentibus.

AUGUSTO.

Ineunte Augusto Cœlum fuit plerumque sordidum, Aer siccus & fervidus, Barometer altum tenuit Locum, Venti Septentrionales: exeunte autem Aer fiebat humidior longè, & cum Mercurio decidit Pluvia; interim Zephyrus, Libs, aut Corus, perflabant assiduè.

Pluvia 1. 11. ¹¹13. 17. ¹¹20.—22. 24.—27. ³28.

Dig. Dec.

29. = 1.894.

AB. 18. 20. p. m. N N VV 1. Fulgura & Procella 20. Nocte. S VV.

Maximus Maris Æstus 27. S S VV 3—28. S VV 3.

8 Altitud.

8 Altitud. maxim. 9. 30. 1. Nb VV 1. } media 29. 6²⁰₃₂
 ——— minim. 28. 29. 0. S VV 3x.
 Dies frigid. 29. 38. N VV 1. } media Therm. Altit. 30⁴₃₂
 — fervid. 5. 20. VV NVV 1. }

Febres intermittentes sub Finem Mensis frequentiores: *Diarrhææ* & Morbi colici plurimi.

S E P T E M B R I.

Corus fere spirabat quotidie ab Initio Septembris ad Diem xi. *Barometrum* attollens, Nubesque dispergens pulcherrimè. A xvii. ad ipsum Finem Ventus ex Oriente, flectens subinde ad Austrum, subinde ad Septentrionem, furens, sæpe perflabat, & *Mercurium* magis quàm quis crederet, deprimebat, haud multà nempe tunc decidente Pluvia: interim humidus erat & frigidus Aer.

Pluvia, 4. 6.—8. 10. 16. 17. 18. 23.—25.
 Dig. Dec.

26.—1. 526.

Maximi Maris Æstus à 22. ad 25. perfurente Vulturno.

8 Altitud. maxim. 10. 30. 0. N VV 1. } media 29: 5²⁵₃₀
 ——— minim. 24. 28. 5. SE b E 3x.
 Dies frigid. 20. 46. E b N 3. } media Therm. Altitud. 38¹⁸₃₆
 — tepid. 1. 27. Malacia. }

Febres intermittentes passim & nonnullæ putridæ, *Diarrhææ* quamplurimæ; morbus autem colicus rarior solito hac Tempestate: haud pauci *Ophthalmia* & Tumore Colli Fauciumque correpti sunt.

OCTOBRI;

O C T O B R I.

Libs fere perpetuus flavit à ii. ad xiii. Octobris Mercurio multum cadente; Pluvia interim continua decidit: post Boreas, aut Euronotus, xxvii. adusque, scandente Baroscopio, & consequente Apricitate; inde humidus Auster gravem perpetuamque Pluviam demisit,

Pluvia $\frac{ii}{2}$. $\frac{ii}{3}$. — $\frac{ii}{6}$. $\frac{ii}{7}$. $\frac{ii}{8}$. — $\frac{iii}{10}$. 12. $\frac{iii}{13}$. 20. $\frac{ai}{21}$. 24.
 $\frac{ii}{28}$. $\frac{iii}{29}$. $\frac{ii}{30}$. — 5. 386.
 Dig. Dec.

AB. 1. 8. p. m. N N E 1. levis AB. 14. 9. p. m. N E. 2. — 15. N N E. 1. — 22. E N E 1.

Altitud. maxim. 16. 30. 2. N N E 1. } media 29. $5\frac{4}{31}$
 — minim. 8. 28. 8. S V V 2. }
 Dies frigid. 16. 55. N N E 1. } media Therm. Altit. $46\frac{16}{31}$
 — tepid. 3. 40. S S V V 2. }

Febres Erysipelatodes & Petechiales passim.

N O V E M B R I.

Pluvia adfuit perpetua, non tamen valde gravis, ad ix. Diem Novembris, dum Ventus ex Austro plerumque fremuit maximè. Aer interea fuit humidus valde: tunc Aquilo discussit paululum Nubes, flectens inde variè Ventus ad Occidentem, per Austrum recurrebat tandem donec Orientem attigit, mutans interim assidue Cœli Faciem & Barometri Stationem: post verò deflectens ad Septentrionem, rigidam invexit Brumam, Cœlumque serenum.

Pluvia

Pluvia $\overset{II}{1.}$ $\overset{I}{2.}$ $\overset{II}{3.}$ — $\overset{II}{8.}$ $\overset{II}{9.}$ $\overset{II}{14.}$ $\overset{II}{16.}$ $\overset{III}{18.}$ — 20. 22.
 $\overset{III}{24.}$ $\overset{I}{25.}$ = 3. 335.
 Dig. Dec.

Procella 1. mane primo VV S VV — 15. Nocte.
 S b E — 18. H. 2. p. m. S S E. 4.

Levis AB. 22. Permagnus & vividus Halo
 circa Lunam 6. 10. p. m. S. 3. Maximus Maris
 Æstus 18. S S E. 4.

∪ Altitud. maxim. 30. 30. 2. Malacia. } media 29. $5\frac{25}{30}$
 ——— minim. 25. 28. 9. E S E 3. }
 Dies frigid. 30. 72. rigidissimum Gelu! } media Thermi:
 — tepid. 7. 42. S S VV 3. } Altitud. $54\frac{24}{30}$

Morbus pestilens inter Boves. Coryzæ & Tuf-
 ses sunt valde frequentes.

D E C E M B R I.

Ab initio Decembris subsedit sensim *Mercurius* in *Baroscopio*, multa ruente Pluvia. Ventus fuit interim varius quotidie, Aer autem maximè humidus; donec Aquilo mutavit Rerum Faciem, Geluque rigidissimum protulit & Nivem; eaque borealis Ventus, aut Orientalis, continuabat ad ipsum Anni Exitum.

Piuvia $\overset{I}{3.}$ $\overset{III}{4.}$ $\overset{I}{5.}$ — $\overset{II}{7.}$ $\overset{III}{8.}$ — $\overset{I}{10.}$ — $\overset{I}{12.}$ Nix 17. 18.
 $\overset{II}{21.}$ $\overset{II}{23.}$ $\overset{II}{24.}$ $\overset{II}{25.}$ = 2. 273. ; Nive excepta, eam

namque totam non potui ullo modo colligere, quùm citò impleverit Vas recipiens, ibique congelata remanserit, avolante reliqua: fuit autem ejus Quantitas proculdubio haud exigua, cum alta fuisset undique sexdecim saltem Digitos.

∪ Altitud.

1728)

¶ Morbis Epidemicis.

17

♂ Altitud. maxim. 15. 30. 3. N. 1.
 ———— minim. 8. 28. 8. S b VV 3. } media 29. 7 $\frac{4}{31}$
 Dies frigidissimus 23. 75. N. E. 2. } media Therm. Altitud.
 — tepid. 7. 52. SS VV 3. } 64.

Febres *rheumaticæ* passim, & Paroxysmi (F)
 Asthmatici frequentes: quamplurimæ Tussis,
 eæque sæpe graves, sub Finem Mensis præ-
 sertim.

Dig. Dec.

Tota, quæ decidit, Pluvia hoc Anno fuit 36. 564

Notationes aliquæ:

(A) Aer fuit ita humidus fortè quòd parùm
 admodùm Gelu fuisset. Gelu certè Atmosphæ-
 ram reddit siccam, condensando Vapores, eosque
 Terræ coagmentando; Terra interim ipsa ita
 Gelu constricta est, ut Exhalationes impediat.
 Hoc in Degelationibus est maximè conspicuum,
 ubi omne Solum, quasi Aqua perfusum, hume-
 scit, imò ferè spumescit; data scilicet Via Vapo-
 ribus à Calore subterraneo elevatis, at Gelu antè
 ad Terræ superficiem astrictis. Hinc est quòd
 Gelu diu durans Terram fœcundet, retentis
 nempe salinis & sulphureis Halitibus, ut Agri-
 colæ norunt: atque hinc fortè post longum Gelu,
 cum Degelatio accedat, morbi *Epidemici* oriun-
 tur, ut observatur sæpissimè.

(B) Nonne hi Maris Æstus exundantes, partim
 fortassè, pendebant à maxima Aeris Levitate,
 has

has in Regiones incumbentis, qui Maria nostra longè minùs premebat quàm circumfusum Oceanum; Aquis nempe hic confluentibus ad Æquilibrium restituendum? Quoniam Aquam inter & Argentum vivum interest differentia, quod ad Pondera, 14. ad 1. quàm proximè; sequitur manifestè *Barometro* in hac Regione integrum Digitum subsidente, Aquas debere hic quatuordecim Digitos altiùs assurgere, quàm ubi, ex Proportionem dicta, major est *Atmosphæra* Pressura. — Annon porrò hac ipsa de Causa fortè violentissimè urgente, displosis scilicet subitò Vaporibus, Aereque pro Tempore maximè rarefacto, Columnæ istæ Aquarum (quas *Spouts* vocant) & immensi isti Fluctus (quos *Boars*) evehuntur nonnumquam? Fulgetra namque semper fere hæc comitantur *Phænomena*, quæ momentaneum quasi Vacuum faciunt. Haud semel certè memini Montem quasi Aquarum (quem a *Boar* hic vocant) perbreve intra Horæ Quadrantem, imò multo minore Temporis Spatio, inundasse ad Altitudinem perpendicularem Pedum saltem duodecim, atque mox recessisse penitùs: quod vix fortè ulla alia Ratione explicari potest.

(C) Humida valde frigidaque Aeris intemperies semper Gravedines, Tusses, & morbos à *serosa* Colluvie pendentes, gignit; idque non solum *Perspirationem* inhibendo, sed & insuper Humiditatem noxiam, Sale aereo sive Nitro gravidam, Sanguini per ipsos Cutis Poros insinuando: nec dubito, quin ob has Causas Tusses Britannos nostros longè magis infestent quàm Gallicum, aut Hesperium, Populum, qui sicciore gaudent & tepidiore *Atmosphæra*. An Aer ipse quidem Corpora nostra subire potest

test sub Aeris Forma, dubito; per * Cortices autem Plantarum, imò Arborum, penetrare certum est. Extra omne dubium verò aerea Humiditas Cutis Poros permeat; nec mirum, quippe durissima Ligna & Saxa penetrat. — Plura sane Experimenta hanc aerei Humoris Attractionem confirmant; & quid quæso huic sit magis Impedimento quàm Terebenthinæ, aut Argenti vivi Exhalationibus, quæ vel intimum intrant Corpus? † Juvenis quidam sanus, Jejunio & Labore confectus, Spatio unius Noctis octodecim Uncias imbibit per Poros. Hoc, etsi non tanta Quantitate, notant sæpissimè, qui Cursibus præsumunt equestribus, ubi jejuniis ad certum Pondus redigendi sunt Equisones.

Tria hinc in regenda Valetudine Confectaria ducantur: 1. Ut jejunus Nemo, nec fatigatus admodum, contagioso se committat Aeri, aut Febre maligna, aut pestilente, correptos invadat; pluribus, imò Medicis, hoc fuisse Exitio memini: tunc enim ex facili *Effluvia* morbida accipiunt.

2. Cavendum est maximè, ne quis diu in Aere inquinato versetur. Methodici olim, Teste || Cælio Aureliano, vel Cubiculi Aerem medicabant: plurimum utique interest, an subfrigidam respirat Auram ardente laborans Febre, an æstuosam, liberam, an densam nimis; ideo, jubente ¶ Celso, in amplo Conclavi tenendus est; si id quidem non est, eluceat modicè Focus, quo per Caminum impura & morbida Mephitis eliciatur, quæ diu aliter stagnans magis magisque in Ho-

E

ras

* Hales's *Vegetable Statics*, cap. 5.

† Vid. *Jacob. Keil. Medicin. Static. Britan.*

|| Lib. ii. cap. 36.

¶ Lib. iii. cap. 7.

ras pestifera redditur; atqui hoc modo perflabile servetur Cubiculum tutissimè.

3. Hinc porrò vides quanto discumbis Periculo cum impuro Lecti Socio; quot tabidos, hac de Causa, factos novi, sanissimos olim? quantum hinc cavenda Lecti Consortio? quantum hinc marcet formosa Puella sicco admota Seni; dum ille vigescit? Nec melior potuit inveniri modus refocillandi decrepitum Judæorum Regem, David, quàm consulendo ut illum in Sinu foveret perpulchra Shunamita Virgo.

(D) Ex humida valde & minùs *elastica* Aeris Constitutione Sanguinis Lentor nimius producitur facilè; unde *Circulatio* per Vasa minima haud expedita, per majora autem debito rapidior, eaque aucta plurimum à suscepto Frigore, *Perspirabile* subito reprimente. Unde Paroxysmus sequitur febriculofus; qui tamen brevi faceffit, amotis nimirum Repagulis, & consequente Sudore, nisi aut Sanguis sit lentus valde aut viscidus: tunc enim vel putrida ac lenta Febris, vel ardens ac vehemens, subsequitur; prout nempe Fibrarum *Tonus*, magis minùsve *elasticus*, & Status Humorum disposuerit. Quamobrem mone-rem Tyrones medicos, ne nimiùm forent in exhibendo Corticem Peruvianum, *Alexipharmaca* & *Salia volatilia*, præproperè, in ipso præsertim Initio Febrium intermittentium, nec nisi post debitas (prout fuerit opus) *Evacuationes*: Error namque talis haud rarò Pleuritides & Peripneumonias arcessit, aut Febrem cum Delirio, vel Comate, continuam. Febris utique intermittens rarò aliquem jugulat; si tamen, ex ea, facta est continua, in malis *Æger* est (monente Celso Lib. iii. capit. 15. ad finem.)

In primis ideò Accessionibus vix aliquid Ægro necesse est, nisi ut sorbeat affatim Potum aliquem diluentem, tepidum; quod & Horrorem discutit, & Vomitus, si urgeat, promovet, finemque tandem febrili Paroxysmo facit, Sudores eliciendo: ad quod idoneum est maximè ut Æger se in Lectulo contineat, durante Paroxysmo. Tunc demum Febre bene finita, ex Medicamento vomat, Alvum purget denuò, aut saltem ducat, si cita antè non fuerit; tunc enim, Rhabbaro exhibito prius, eam comprimere licet.

Multum utique facit ad omnigenas Febres extinguendas, post debitam (si sit necesse) Sanguinis missionem, primarum Viarum à putrida *Cacochymia* Purgatio. Neque hoc solum modo prodest Vomitus, sed & ipsa ejus Actio Obstructiones, vel in ipsis Corporis Penetralibus, reserare apta est; ad utrumque igitur Scopum eum provocare utile est; id ipsum quippe Febres quasdam intermittentes sæpe sæpius curavit.

Post secundam, tertiamve, Accessionem quod Genus Febris sit scire licet, atque exin Medicinam aptare idoneam, in qua Jure merito primum obtinet Locum Cortex Peruvianus: at nescio quo Fato, utcunque seduli fuerimus in isto eligendo, ad has Febres abigendas, Opinione longè minùs, profuit; nisi primò Cinnabari, Camphora, Myrrha; post *Stomachicis aromaticis Chalybeatis* adjutus. Tunc equidem *Mercurii alkalizati* Usus mihi haud innotuit, quem paulò post tamen mecum communicavit optimus ille, celeberrimusque Medicus, D. D. Cheyne: hanc verò Mercurii Præparationem ad plurimos Morbos maximè efficacem esse millies inde inveni. Maximam profectò vim habent *Mercurialia* con-

tra Sanguinis Lentorem & Obstructiones Vasorum; imò sine Stimulo salino præparata non solum in Febribus intermittentibus esse utilissima, sed & in *Pleuriticis*, *Peripneumonicis* & *Rheumaticis*, post debitam Sanguinis Missionem, plurimum prodesse novi: dum enim lentos attenuant Humores, parùm interim rarefaciunt Sanguinem, aut exagitant, etsi Pondere suo momentum ejus multùm adaugent. Acutissimus JURINIUS demonstravit olim, * Gravitationem Globuli Sanguinis rubri esse ad Gravitationem Serii, ut 1126. ad 1030.: atqui tantæ potissimum Gravitationis effecti videntur Globuli, ut Serii Tenuitatem conservarent, & sanguineos Tubulos præstarent meabiles; at cum magna adsit Tenacitas Humorum, & Obstructio Vasculorum pertinax, iis utique utendum est, quæ multò majore pol-
lent momento.

Sub Finem verò harum Intermittentium *Stomachica Chalybeata* & *Austero Aromatica* juvabant maximè, quæ sine Tumor Pedum *oedematofus* semper, & recidivæ Febres accedebant sæpissimè; imò cùm morbus ex toto discussus fuisset, ad Recidivam præcavendam commodum erat omninò, Die scilicet octavo, vel decimo post, Corticem Peruvianum & *Martiata Stomachica* resumere, ad paucos saltem Dies. Nonne ideò eadem hæcce, subinde assumpta, per bona sint ad *Prophylaxin*, dum Aer nimis humidus & parùm *elasticus* Sanguini Lentorem inducit, & Vim Fibrarum enervat; idque præcipuè debili-
rioribus, ac *Systasi* Nervorum infirma affectis? Hæc utique Methodus mihi optimè cessit in *Hystericis*

* *Transact. Philosoph. Anglic. N. 316.*

stericis & Hypochondriacis sæpissimè — Hoc forsitan haud absurdum erit Monitum iis, qui haud prospera Valetudine gaudent, aut illis, qui eorum Sanitati prospiciunt. Delicatulis, ac Mollitiis fluentibus, haud injucundum, nec fortè Inefficax Antidotus, erit Malum Aurantium Hispalense tostum, ex Vino rubro generoso, post debitam Infusionem.

Nihil sanè ad Febres intermittentes eradicandas facit magis quàm frequens Vomitio, præcipuè ubi Nausea & Vomitus urgent, quod in his ferè accidit semper: dum namque Stomachus, seu mucoacido obrutus, seu biliosa Colluvie, languet, quasi Vas iners, Fermento imbutum putrido, Ingesta omnia corrumpit: hinc perpetuus morbi Fomes, donec perpurgatur Ventriculus. — Ad movendum autem Vomitum, vel Decoctum Radicis Ipecacuanhæ, vel Infusio ex Vino, exhibetur tutissimè; si vis aliquid fortiùs, Vini benedicti Cochleare unum, alterumve, adjici potest. Perperàm verò (quod suadent nonnulli) oleosa, aut immensa subtepidæ Potione sollicitatur, quarum prior oblinat potiùs quam deterget Ventriculum, eum altera onerat nimium: imò sæpe adeò non juvant immanes isti Haustus, ut, Stomachum nimio plus distendendo, Vime ejus constringentem, omnemque Actionem perdant omninò. Longè igitur longèque rectiùs promovetur Vomitio modica Potione tenuis Infusus Florum Chamæmeli, sub Finem verò Vini rubri cum Aquæ Dimidio, Duplo, aut Triplo, prout Res exigit, in quo lene aliquod Aromaticum sit incoctum: Sustainat hoc quippe totiùs Corporis Vires, & naturalem Ventriculi Potentiam erigit plùrimum, ita ut quicquid Plicis suis inhæret exprimat, se nempe corrugando validiùs; adeoque

tandem Ventriculi Tunicas corroborat, ut multo minùs postea sit obnoxius Illuviei nocenti. Hinc fit quòd Vomitus ex Vino rubro austero & aromaticis parato tantum Arthriticis prodest, ubi morbus Stomachum occupaverit.

* Provocabant olim Romani Luxuriæ Causa Vomitus, quidni nos Sanitatis? Quandoquidem vix aliquid subest Periculi, modò descripta excitetur Methodo, & post debitam, si commodum est, missionem Sanguinis: nam si plus est injectum quàm quod concoqui possit periclitari ne corrumpatur non oportet; si jam corruptum est, nihil commodius est quàm id, qua via primum expelli potest, ejicere. Haud alio utique modo expurganda est Colluvies Stomachi biliosa, aut pituitosa, multorum sanè Morborum Origo & Fomes: quicquid enim prima Digestione corrumpitur, haudquaquàm emendatur in secunda Concoctione, adeoque qualis efficitur Chylus, talis fit Sanguis.

Nec solùm Corporis Vigorem conservat purus firmusque Stomachus, sed & Animi etiam Acumen; ideo † Carneades, Academicus, scripturus adversus Stoici Zenonis Libros, superiora Corporis candido Elleboro purgavit: perpauci sane Philosophi ex Apicii Schola prodire; vix aliquid certe Cerebro officit magis, quàm ingluvie distentus Venter.

Audi || Horatium, haud omninò Pythagoricum—

— Quin Corpus onustum

*Hesternis Vitiis Animum quoque pręgravat una,
Atque affigit Humo divinæ Particulam Auræ.*

Qui

* Celsus, Lib. i. cap. 3. † A. Gellii, Lib. xvii. cap. 15.
|| Serm. Lib. ii. Satyr. 2.

Qui secum reputat Nervi *intercostalis*, & *Paris vagi*, sive octavi, longas Ambages, Implexus, Ramusculos, horumque Concentum atque Consensum: quorum alteruter Veneno, aut acri aliquo tactus, Vomitus ciet illicò; qui porrò spectat, Actione Vomitus, omnem intendi Nervum, omnemque concuti Fibram; idoneus solùm est Judex, quibus in morbis, quaque sub Conditione, excitanda sit Vomitio: in pluribus haud dubio utilis. est admodùm, quum & omnes Corporis Humores attenuet, omnesque promoveat Secretiones.

(E) Haud ita multum in medendi Methodo mutavi, ni quòd opportunum esse invenerim Medicamentis, suprà laudatis, addere Elixir Vitrioli, & Aquas Spadanas, aut Pyrmontenses, haurire quotidie. Nec poenitendo utique Eventu, tunc Temporis, Balneum frigidum commendavi; præcipuè convalescentibus ab intermittente rebelli: ad Fibrarum nempè Tonum restituendum, & Humores lentos comminuendos. Hinc didici tandem quantum potest tale Remedium, ubi vix alia proficit Methodus, idque nonnumquam in pertinace Quartana: novum hoc forsàn & inauditum, mihi verò probè expertum.

(F) Dum Subsolanus afflat, seu Boreas, Aer & elasticus valdè & gravis evadit, plerumque porrò frigidior; solito magis ideò distendit, premitque Pulmones: quinetiam *Atmosfera* ponderosior externum Corporis Habitum comprimit, & si fit frigidior, Nervos Fibrasque cutaneas constringit: minus hinc Sanguinis *εις τὰ ἔξω*, *εις τὰ ἔντερα* verò ejusdem Congestio, & proinde motus rapidior. Non mirum ideò si infirma Pulmonum *Crasi* laborantes talem Aeris

Constitutionem malè ferunt, Vesiculis nempè pulmoneis Aere distentis nimiùm, Vasculis sanguiferis Cruore. His de Causis quamplurimi, Vento ad Orientem vergente, certo certius ferè Asthmatis Paroxysmo corripiuntur. His præcipuè Asthmaticis convenit Sanguinis Missio, imò, *Dyspnœa* urgente maximè, necessaria est omnino; tunc lenia *antiphlogistica* Purgantia, Gas Sulphuris, Acetum & Oxymel Scilliticum, ex Posca, Mulso, aut Potu tenui subacido, Paroxysmum solvunt: porrò Pedes demittere in Balneum ex Aqua tepida hisce Auxilio est, Humores alliciendo ad Partes inferiores.— Novi Virginem elegantem uno, alterove, Die ante Menstrua, gravi Spiritus Difficultate corripi solitam, cui hoc certum semper subitumque attulit Levamen.

Pituitosis contrà; humidisque Asthmaticis; Vomitoria, *Epispatica*, *Volatilia*, Purgantia fortiora, & Detergentia acriora opitulantur.

DE AERE

ET

Morbis Epidemicis,

Anno MDCCXXIX.

JANUARIO.

INEUNTE & exeunte Januario Aer fuit frigidus valdè, Venti aquilonares, permagna Elevatio Barometri, Nebulæ sæpè densissimæ, & nonnunquam foetidæ, Gelu frequens & rigidum valdè. Medio autem Mense, subsidente Mercurio, Pluvia, Ventusque varius, qui ab Occasu vergebat plerumque ad Septentrionem. Ad Finem orientales Venti Aerem desiccabant plurimum, quamvis fuerat antè multo humidior.

Pluvia 4. 12. 13. — 16. 19. 21. Nix 7. Noctis
Dig. Dec.

cte = 0. 900.

AB. permagna Die 6. H. 11. Noctis. ENE. 1.
Lucidam quasi Nubem observavi, Die 14. H. 9.
p. m. inter Orionem, Taurum & Os Ceti, con-
ruscantem undique Radiis vibrantibus, lucidissimis,

mis, etsi ne vel minima alibi extiterunt Signa Luminis borealis, ista Nocte.

γ Altitud. maxim. 9. 30. 4. Malacia. }
 ——— minim. 14. 29. 1. VVN VV 2. } media 29. 9 $\frac{32}{31}$
 Dies frigidissima 1. 74. ENE 1. }
 — tepid. 19. 52. VVN. VI. } media Therm. Altitud. 61 $\frac{1}{31}$

Tumor Faucium *anginosus*, & Tusses, valdè frequentes; Perniones, etiam inter Adultos, frequentissimi: Pleuritides & Febres *rheumaticæ* passim. ——— Prælonga Sanguinis missio *Pleuriticis* juvabat maximè, Potusque multus emolliens; eadem omninò Methodus *Rheumaticis* auxiliabatur: atroces verò Artuum Dolores plurimùm levabant Fomenta tepida laxantia, admota subinde.

FEBRUARIO.

Initio Februarii *Baroscopium* indicavit 30. 2. flante Septentrione; post Diem vii. Ventus ab Occidente venit, flectens modò ad Austrum, mox quoque ad Arctum, Pluvia cadente: à xiv. ad Finem usque Flatus perpetui, ac sæpè vehementes, ex Oriente frigidam siccamque *Atmosphæram* fecere, surgente plurimùm *Mercurio*.

$\frac{11}{11}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$
 Pluvia 4. 7. 9. 10. — 12. Nix 5. 14. 24.
 Dig. Dec.

= 1. 814.

Ventus turbineus 23. 24. Fulgura 9. H. 8. p. m. S. VV b S 3.

(A) Spiritus Thermometri Hauksbeiani sæpè ad 66. hoc Mense subsidebat, cum tamen vix ulla uspiam visa fuerit Glacies, à xvii. ad xxi. præcipuè.

γ Altitud.

♂ Altitud. maxima 25. 30. 3. E 3. } media 29. $7\frac{2}{28}$
 ——— minima 10. 29. 1. VV 3. }
 Dies frigid. 6. 71. N. 1. } media Therm. Altitud. $62\frac{18}{28}$
 — tepid. 9. 56. S VV b S 3. }

Graves *Rheumatismi* & *Arthritidis Paroxyismi*,
 qui multo magis quàm solito excruciant. Tusses
 siccae, laboriosae, frequentes sunt. Sanguis, &
 quocunque ferè detractus, est crassus valde, & per-
 paululum Seri habet; ubi Febris aliquid accessit,
 admodum est viscidus: Pleuritides tamen, ac Pe-
 ripneumoniae, non aequè frequentes sunt ac quis
 expectaverit. Multi adhuc Asthmate laborant,
 & plurimi, imò Adulti, Pernionibus vexantur.

M A R T I O.

Frequens perflavit Aquilo ad xiv. usque Martii;
 xv. fremuit Vulturnus, plurima ruente Pluvia;
 xvi. & xvii. Boreas furebat maximè; sub Finem
 lenior spirabat ab Occidente Ventus, cadente
Mercurio: Vehementissimus autem aderat Turbo
 è Septentrione xxiv. circa Meridiem. Aer fuit
 ficcus & frigidus.

Pluvia $\frac{1}{1}$. 12. 14. $\frac{111}{15}$. 16. 22. $\frac{1}{23}$. 24. $\frac{1}{26}$.
 Dig. Dec.

27. 28. 30. 31. Nix. II. = 2. 092.

Rigidum Gelu 10. — 13. Ventus plerumque
 N E. Procellae 16. 17. 24.

♂ Altitud. maxim. 17. 30. 2. N N E 3x. } media 29. $7\frac{2}{31}$
 ——— minim. 15. 29. 0. S E 3x. }
 Dies frigid. 11. 66. N 1. } media Therm. Altit. 54.
 — tepid. 31. 49. VV. S VV 1. }

Gravis

Gravis adhuc sævit *Rheumatismus* & *Arthritis*; nec cruciatus magis obstinatos memini nec *Arthritidem* magis *anomalam*. Tusses *orthopnoicæ* molestissimæ, plurimos corripunt, lenta sæpe cum Febre; sputa sunt maximè viscida & excreatu difficillima. His, *Venæ Sectione* peracta, Potio larga, diluens, calida, Detergentia dein ex *Oximelite Scillino*, Gum. *Ammoniaco*, Flor. *Benzoes*, &c. opitulantur, *epispasticis* non rarò admotis. Nihil magis fuit Tussi Levamento, nihil tutius, Elixir *Asthmat. le Mortii* & *Pilul. Mathæi*. At hic notandum, quod perpetuum esse debet, ubi *Attenuantia* & *Volatilia* liberè exhibentur, & *Vesicatoria* iterum atque iterum applicantur, multis Diluentibus utendum est: *Lympha* dissipatur aliter, *Cruor* verò incrassatur nimis & acrior evadit, unde necessariò *Inflammati*o & *Febris* augentur.

A P R I L I.

Siccus fuit & tenuis Aer durante Aprili; ac sæpe frigidus, imò Die xiii. ipsa *Glacies*: Ventus ab Oriente plerumque, medio quidem Mense ad Septentrionem flectens, sub Finem verò ad Austrum. Statio *Baroscopii* alta manebat ab xi. ad xxix. Magna Roratio, ac Pruina nonnumquam à xiii. ad xix. Cælumque serenum.

	<u>111</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	Dig. Dec.
Pluvia	1. 2. 7. — 10. 25. 27. — 30. = 1. 692.			
AB.	11. 10. p. m. N N E. 2. — levis 21.			
N VV	1. Procella 9. Nocte S E. — 25. E S E.			
Altitud. maxim.	16. 30. 1. E N E 1. }	media	29. 6 $\frac{14}{30}$	
— minim.	25. 29. 1. E S E 4. }			
Dies frigid.	13. 57. E b N 1. }	media Therm.	Altit. 46 $\frac{29}{30}$	
— tepid.	29. 40. S S VV 1. }			

Erysi.

Erysipelas & pustulosa Febricula frequens. *Variolæ* passim. Tempestas infesta Tabidis, his præcipuè, qui, elapsis Mensibus, Febre lenta pulmonaria correpti, ad Phthisin olim fuerant proclives.

M A I O.

Hujus Mensis Initio, labente *Barometro*, Pluvia, frigidaque Tempestas; Die octavo, benè Mane, etiam stagna Glacie fuere astricta: Vesperti autem ejus Diei Fulgura sæpe, at sine Tonitru prorsus. Cælum deinceps varium, variusque Ventus; à xvi. ad Finem usque Aquilo sæpe, Subsolanus sæpius, Mercurium sustulerunt, *Atmosphæræ* porrò Siccitatem & Apricitatem reddiderunt.

Pluvia $\frac{111}{3}$. — $\frac{2}{5}$. 6. 10. $\frac{1}{12}$. 14. 19. 20. $\frac{1}{24}$.
Dig. Dec.

= 1. 560.

Levis AB. 6. 10. p. m. N b VV 3.

8 Altitud. maxim. 8. 30. 0. N VV 1. } media 29. $6\frac{13}{31}$
—— minim. 5. 29 1. VV S VV 3. }
Dies frigid. 8. 54. VV N VV 1. } media Therm. Altit. $41\frac{26}{31}$
— tepid. 28. 35. E b S 1. }

Febres *peripneumonicae* & *erysipelatosæ*. *Variolæ*; ac Febriculæ cum Pustulis *rubeolosis* (vulgò the *Chicken-Pox*) passim, Tumores quoque Pedum urentes, at recedentes brevi.

J U N I O.

Nulla fuit *Baroscopii* Elevatio notabilis toto Junio: medio quidem mense Statio humilis, haud

haud exigua tunc ruente Pluvia. A xii. ad xxiii. Aer erat valdè crassus, ac humidus, dum Africus sæpe afflabat, intercurrente nonnunquam Malacia: Initio autem & Fine Subsolanus. Magna sub Finem Roratio.

Pluvia 2. ⁱⁱ 3. 7. 8. ⁱ 11. ⁱⁱ 12. — 14. 16. ⁱⁱⁱ 17.

Dig. Dec.

27. = 1.662.

8 Altitud. maxim. 26. 29. 9. N 1. } media 29. $6\frac{2}{3}$
 ——— minim. 13. 28. 7. S 3. }

Dies frigid. 4. 40. E 3x. } media Therm. Altitud. $32\frac{16}{30}$
 — tepid. 29. 29. E 1. }

Erysipelas & Variolæ epidemicæ: Febres intermittentes remittentes præcipuè, lentæ, nervosæ, frequentes. *Cephalalgia & Mania* passim. Tussis inter Pueros.

J U L I O.

Incipiente Julio serena satis effulsit Tempestas; Ventus orientalis isque velox admodum; a iv. Die ad x. sæpe vehemens, fidente Mercurio; inde ad Austrum deflectens *Barometrum* usque depressit, *Atmosfera* facta nebulosa, ac humida valde: sub Finem aliquanto resurgebat flante Favonio. Rara fuit apricitas post Diem sextum, etsi Tempestas erat æstuosa valdè.

Pluvia ⁱ 7. 9. 11. 16. — ⁱ 18. 21. 23. ⁱ 24. ⁱ 25.

ⁱⁱⁱ Dig. Dec.

27. 28. 31. = 1.918.

Ventus turbineus & Tonitru 7. Nocte E. Fulgura 15. Nocte.

8 Altitud.

☿ Altitud. maxim. 3. 29. 8. E b N 1. } media 29. $4\frac{2}{3}$
 ——— minim. 25. 29. 0. S b E 3x. }
 Dies frigid. 8. 36. E b N. 3. } media Therm. Altitud. $28\frac{22}{32}$
 — æstuos. 22. 22. Malacia. }

Variolæ multos invadunt. — Porro toto hoc Mense Febris putrida, lenta, sub Finem remittens, tandemque intermittens, fuit maximè *epidémica* in hac Regione. Caput, Stomachus & Lumbi laborabant potissimum, quasi ingruentibus *Variolis*, magna cum Oppressione Pectoris, Suspiriis & gravi Languore: talis fortè affectus nomen dedit Febri *variolosæ* † Sydenhamii. Pueri, Juniores, Fœminæ, Infirmitiores, hac Febre præcipuè fuere correpti. Sanguis eorum detractus rarò viscidus erat; Urina cruda plerumque, ac subtenuis, cum cineritia, mucosa & imperfecta *Hypostasi* sæpe, quasi ex Polline farraceo (*ῥώσας κοινώδης* Hippocratis:) quo Sedimentum perfectius, eo major Spes salutis effulsit. Lingua, non arida valdè, glutinoso quodam & subfusco obducta fuit Mucore. Sub morbi Finem *Diarrhœa*, aut cruenta nonnumquam *Dysenteria* (præsertim si Vomitus non fuerat Initio Arte promotus) urgebat maximè, imò quibusdam erat exitio. Rubræ autem *Petechiæ*, Pustulæ *miliares*, rubræ, urentes, aut graves erumpentes sudores, morbum *sapissimè* solvebant penitus.

Venæ Sectio rarò, nisi Morbi Initio, profuit; Vomitoria verò erant pernecessaria: *epispastica* dein frequentia, & gradatim admota, lenia interea *Cardiaca* Cinnabar, *Paregorica*, sero Lactis Cana-

Cana-

† Sect. iii. Capit. 3.

Canariensi & Potione diluta, subacida, largiùs epotis, fuere valde utilia. Quamprimùm Coctionis Signa, Urina nempe subsidente & remittente Febre, apparebant, Cortex Peruvianus juvabat apprimè. Sin autem Statu Morbi Coma, aut Delirium, accesserint, Opus fuerit extemplo Cucurbitulis scarificatis, Humeris Cervicibusque affixis, Sanguinem detrahère, applicando mox *Epispastica* ponè utramque Aures præcipuè, aut Capiti derafo; injecto protinùs *Enemate* laxante.

Utcunque lenia Purgantia; ex Rharbarbaro potissimùm, Morbi reliquias putridas sub Finem expurgabant percommodè; *Drastica* tamen, aut *Aloetica*, pestiferos omninò habuerunt Effectus: quorum nempe Usu intempestivo vim magnam Sanguinis dejectam vidimus, & horrenda excitata Tormina: imò post *Catharsin*, etsi valdè lenem, Haustus *paregoricus* erat omninò necessarius.

Quamplurimi hoc Morbo correpti fuerunt, pauci verò periere.

AUGUSTO.

Parùm utique Pluviæ durante Augusto; Initio quidem & sub Finem aliqua decidit, tunc quoque è madido Noto crassus influxit & valdè humidus Aer. A xº ad xxiv. fervida ac aprica Tempestas, Subsolano plerumque afflante placidè. Haud insignis erat elevatio, aut depressio *Barometri* hoc Mense.

Pluvia $\overset{4}{6}$. $\overset{11}{26}$. $\overset{1}{29}$. 31.
Dig. Dec.

= 1.002.

Magna sæpe Roratio Mense medio. Tonitru & longinquo ab Occidente 20. 23.

⌘ Altitud. maxim. 16. 29 9. E b N. 1. } media 29. 6.
— minima 6. 29. 2. VV N VV 2. }

Dies frigid. 8. 37. NN VV 1. } med. Therm. Altit. $28\frac{8}{30}$
— fervid. 23. 28. Malacia. }

Febris *epidémica* perdurat adhuc: medio autem Mense Pustulæ rubræ, *miliares*, longè erant frequentiores quàm Mense proximè elapso. *Variolæ* mali admodùm moris sæviunt. Scabies jam plurimos infestat, eos præcipuè, qui ab *epidémica* Febre convaluerant.

S E P T E M B R I.

Hoc Mense ruebant Vapores, quos fervor Æstatis excitaverat, in Pluvias nempè graves & perpetuas resoluti; Aer interim erat maximè crassus ac humidus: rara Apricitas, *Barometer* demissus valdè, Vulturnus fere assiduè à secundo Die ad decimum sextum, isque non raro vehemens; exin ad Finem usque Libs furens sæpe.

Pluvia $\overset{III}{2}$. $\overset{I}{4}$. $\overset{II}{6}$. $\overset{III}{12}$. 15. $\overset{III}{16}$. — $\overset{II}{19}$. $\overset{II}{21}$.

$\overset{I}{22}$. $\overset{II}{23}$. — $\overset{III}{30}$. = 6. 498.
Dig. Dec.

Procella 8. Nocte. S E b S — 21. S S VV
— 22. VV S VV. Turbo 10. E b N. AB. 12
E b S.

B

⌘ Altitud.

8 Altitud. maxim. 3. 29. 5. Eb N i. } media 29. $2\frac{14}{24}$
 ——— minim. 16. 28. 7. SS E 3. }
 Dies frigid. 23. 42. VV S VV 2. } med. Therm. Altit. $32\frac{14}{24}$
 — tepid. 1. 28. VV. 1. }

Variolæ adhuc malignæ grassantur maximè cum Maculis purpureis, sæpe etiam nigris, interspersis: Statu morbi Pustulæ nigrescunt, aut crudo diffluunt *Ichore*. Crustæ nigræ diu admodum, etiam convalescentibus, adhærescunt: *Crisis* in *Confluentibus* difficillima, nec Febri sæpe Finis est nisi post xvii. sæpe non nisi post xxi. Diem; Vermibus persæpe ex Alvo dejectis. —
 (B) *Febris epidemica* etiamnum perdurat, rariùs autem.

O C T O B R I.

Initio Pluvia, tunc Apricitas, surgente *Mercurio*; derepentè autem cecidit: à xv. ad xxiv. Pluvia perpetua. Vento subinde ex Plagis australibus furente: à xxiv. tamen ad ipsum Finem inter Boream & Vulturnum constitit, parca cadente Pluvia.

Pluvia $\frac{iii}{1.}$ $\frac{iii}{5.}$ 6. 9. $\frac{i}{11.}$ $\frac{i}{12.}$ 15. $\frac{i}{16.}$ ———
 Dig. Dec.
 $\frac{ii}{19.}$ $\frac{ii}{20.}$ $\frac{iiii}{22.}$ $\frac{i}{23.}$ ——— 26. 31. = 3. 985.

Procella 11. Nocte. S VV — gravis cum Fulgure & Tonitru 19. Nocte. S S VV — mane E S E. Grando 12. 20. 21. AB. 14. N VV 1.

8 Altitud. maxima 8. 30. 0. Malacia. } media 29. $4\frac{26}{27}$
 ——— minima 19. 29. 0. S S VV 4. }

Dies

Dies frig. 14. 55. N VV b VV 1. Pruina mane. } med. Therm.
 — tepid. 9. 34. S VV 3. } Altitud. 43 $\frac{15}{27}$

Sæviunt adhuc *Variolæ epidemicæ*, non hic solùm, sed undique ferè; eæque sæpe malignæ & atræ, quarum Crustæ nigræ, diu adhærentes, Faciem deturpant maximè.

Febris *secundaria* solito vehementiùs urget, ac perdurat diutiùs; non rarò ad vigesimum usque Diem & ultrà, pluresque morti committit. Ad hanc verò arcendam nihil successit feliciùs, nihil optatius, repetitis *Catharticis*, adjecto interdum *Calomelane*; *Paregoricis* verò interpositis subinde. Hoc non solùm in carissimis meis Liberis expertus sum, sed in quamplurimis aliis, faustissimo utique Eventu; sane vix ulla alia Medicina profecit.

Qui vult de hoc Argumento plura, adeat Epistolas viri, dum viveret, undique perdocti, JOANNIS FREIND; nec non illustrissimi RICARDI MEAD, aliorumque doctissimorum Medicorum, unà conscriptas: etiamque, si non pigebit, quæ & * ipse de hac Re olim disserui.

Vix quicquam profectò in his *Variolis* magis funestum observavi, quàm Rigores accedentes, aut Horrores, in ipsa Morbi *Acutè*: Symptomata utique in isto Morbo, isto Tempore, atro semper Carbone notanda!

Febris lenta, nervosa, jam fere cessavit penitus.

F 2

NOVEM.

N O V E M B R I.

Totus Mensis fuit procellosus admodum, ac maximè pluviosus; Libs sæpe furebat & Auster: hinc *Baroscopium* subsedit plurimum. Maximæ sunt Inundationes undique.

Pluvia $\frac{1}{1}$. $\frac{2}{2}$. $\frac{3}{4}$. 6. 7. $\frac{111}{8}$. $\frac{1}{9}$. $\frac{11}{11}$. $\frac{11}{13}$. $\frac{1}{16}$.
 $\frac{11}{18}$. $\frac{1}{19}$. $\frac{111}{20}$. $\frac{111}{23}$. $\frac{1}{24}$. $\frac{11}{25}$. $\frac{1}{26}$. 27. 30. = 6. 333.
 Dig. Dec.

Procella 2. S S VV—6. Nocte. S VV—18. &
 19. Nocte. S VV—24. Nocte. Sb VV—27. mul-
 to mane VV N VV. Magnum Lumen boreale 5.
 H. x. p. m. VV N VV 1.

8 Altitud. maxim. 22. 30. 2. VV N VV 1. } media 29. $4\frac{26}{29}$
 ——— minim. 25. 28. 7. S VV 3. }
 Dies frigid. 21. 56. N. VV 1. } media Therm. Altitud. $47\frac{14}{29}$
 — calid. 3. 40. S. S. VV 3. }

Variolæ epidemica adhuc. ——— *Febricula catarrhalis* cum importuna Tussi; *levi Dyspnœa*, *Anorexia*, *Languore* & *Doloribus rheumaticis*, sævit passim; cum autem solito vehementior est, in notham abit *Pleuritidem*, aut *Peripneumoniam*: at ex facili abigitur plerumque *Missione Sanguinis*, ac *Emetico* leni; unum, alterumve, postea applicando *Epispasticum*, & tunc exhibendo *Diluentia*, blanda *Sudorifera*, *Papaverina*, &c. inter quæ, *Sp. Volat. Oleos.* — *C. C. Elix. Asthmatic.* ex sero *Lactis Canariensi* diluto, tepido, profuerunt maximè.

D E C E M B R I.

Perduravit nimboſa valdè & pluvia Tempeſtas Diem aduſque decimum Decembris, Libanoto fremente; inde verò fortis ab Oriente Ventus *Mercurium* erexit plurimùm, ſudo nonnunquam conſequentē: à decimo nono deflexit ruruſus ad Auſtrum per aliquot Dies, & multa Pluvia cecidit. Ad Finem Menſis Apricitas. Aer per totum craſſus maximè & humidus, ac ſolito tepidior, nempe ut in ſuperiore Menſe fere.

	⁸¹	¹¹	¹³	¹¹¹	¹¹		¹		¹¹
Pluvia	1.—	3.—	5.—	7.—	9.	11.—	15.	18.—	20.
	¹¹	¹¹							
	21.	23.	24.	25.	28.	4.	180.		

Dig. Dec.

Grando vehemens 3. a. m. Nix. 16. E N E 1.
 Gelu 15. 16. Procella 3. Nocte. S VV—5. S S VV
 Permagus Maris Æſtus 8. S S VV 3.

Altitud. maxim.	16.	30.	2.	E N E 1.	} media 29. $6\frac{2}{3}$.
— minim.	1.	29.	0.	S VV 3.	
Dies frigid.	16.	63.			} media Therm. Altitud. $51\frac{17}{30}$
— tepid.	8.	44.	S 2.		

Tuſſes, Febris *catarrhalis* & *Variolæ* adhuc *epidemicæ*: Mania ſolito frequentior.

Tota Pluviæ Quantitas, Anno MDCCXXIX.
 Dig. Dec.

33. 055.

Notæ breves:

(A) Haud rarò equidem notavi, verno præfertim Tempore, Glaciem, etsi *Thermometrum Hauksbeianum* fuit ad 55. solùm; media autem Hyeme nullam, cùm tamen ad Gradum 65. & ultrà descenderit: quod quidem, Februario elapso, Diem inter decimum septimum & vigesimum primum contigit: tunc enim vix ulla, vel levissima, Glacies erat, quamvis *Atmosphæra* erat valdè frigida, Ventusque fortis ab Oriente Spiritum *Thermometri* depresserat ad 67. usque.—Notante clarissimo Cyrillo Aët. Philosoph. Anglic. No. 424. & 450.; cùm Spiritus Therm. Hauksbeian. est ad 55. tantùm, Gelu adest Romæ plerumque.—† Gradus adeò Frigoris, quo Glacies producitur, non videtur fixus & certus: quod sanè haud leve Argumentum est Congelationem non à sola Privatione Motus, aut Caloris, pendere ‡.

(B) Annon humida calidaque Temperies Aeris, Æstate prægressa, Fibras relaxando plurimum Sanguinem atque Lympham ad Lentorem nimium disposuerat? Olea verò Salesque Corporis ad Acrimoniam justo majorem? Idque præcipuè cùm & istis accesserit *Atmosphæra* Pressura solito plerumque minor? Estne ergo manifesta satis Febris hujus, & *Variolarum* malignarum, unà grassantium, Causa?

Per talem *Atmosphæra* Constitutionem Morbi contagiosi haud dubio propagantur maximè; tunc

† Vide *Prolegom.* p. xvi.‡ *Ibid.* p. xiii.

tunc enim Latrinæ, Mephitides & putrida omnia, longè pejùs fœtent: imò Animalium Caro, bubula scilicet, aut ovilla, longè citiùs corrumpitur quàm sicco durante, ac frigido, Aere, qui impura & morbida *Effluvia* excitat altiùs dissipatque. Cùm verò circumvolitent, imò quasi Terræ Superficiem circumvallent, Quantitate multò majore hauriuntur, non solùm ipso cum Spiritu, sed & per omnes etiam Corporis *Poros*: neque enim jam *Atmosphæra* Pondus idoneum, & debita Fibrarum Vis, satis validè impellunt Humores aut Contagia propellunt; quo plus Virus autem excipitur, eò peiores edit Effectus. Frigida contrà, vel procellosa, Tempestas, aut Contagem arcet, aut pestilentem dispellit Auram.

Quinetiam perdurante Aeris Constitutione calida, ac humida, Humores ipsi Corporis Lentorem nimium contrahunt & Acrimoniam: unde Contagii Vim tunc accipiunt promptiùs. Multum utique facit instans Sanguinis status ad promovendum, aut arcendum, Veneni Effectum. Hunc Vipera mordet, aut rabidus Canis, illumque itidem; alterum cita mors abripit, alter vix quidem ægrotescit. Hinc hyberna Frigora non solùm Febribus contagiosis obstant, quatenùs Aerem faciunt puriorem, sed & fibras Fluidaque Corporum nostrorum corroborando minùs obnoxia Pestilitati reddunt: atque ideò quoque Medicamen, quod hoc efficere potest, quale quidem est Cortex Peruvianus cum *Alexipharmacis* idoneis & *Stomachicis*, optimum proculdubio *Prophylacticum* erit. Ego uti soleo Tinctura Quinquinæ cum Cortice Aurantiorum Hispalensium & Radice Serpentariæ Virginianæ ex Vino Hispanico, aut Spiritu Vini Gallici.

CONSTITUTIO AERIS, &c.

Anno MDCCXXX.

JANUARIO.

INCIPIENTE Anno insignis *Barometri*
 Altitudo sudum fecit Cœlum &, Borea assidue
 perflante, frigidum: *Atmosfera* interim fuit
 tenuis & sicca, at nonnunquam glacialis quædam
 Nebula omnia Gelu quasi incrustabat, Die duo-
 decimo potissimum. Sub Finem Mensis, ver-
 gente ad Occasum Vento decidit *Mercurius*: ad
 ipsum verò Finem resurgebat, quod Serenitatem
 reduxit & Gelu.

Pluvia 14. 17. 20. — 24. 27. 28. 29. Nix 4.
 Dig. Dec.
 = 0. 666.

⌘ Altitud. maxima 10. 30. 6. E N E 1. } media 30. 0 $\frac{5}{3}$.
 ——— minim. 28. 29. 4. S VV 3. }
 Dies frigid. 12. 70. Malacia. } media Therm. Altitud. 59.
 — tepid. 28. 52. S VV 3. }

Variolæ sæviunt adhuc, haud tamen ita lethali-
 les: *Febris catarrhalis* plures adhuc infestat. Pa-
 roxysmi graves asthmatici frequentes.

FEBRUAR-

F E B R U A R I O.

Durante Februario Ventus ab Occidente, aut Meridie, frequens Pluviam demisit & Baroscopium; exeunte autem Mense Aquilo Glaciem, Grandinem, Nivem, miro quodam Modo; pulchra nempe Apricitate intercurrente subinde, maxima cum Aeris Tenuitate & Siccitate, induxit: delabente tamen usque Barometro

Pluvia 2. — $\frac{11}{4}$. — 6. $\frac{11}{8}$. 11. $\frac{1}{13}$. 13. 15. 16. 18. 20.
Dig. Dec.

Nix 8. — perpetua 27. Grando 14. 24. = 2. 3 15.
Lumen boreale permagnum 23. H. 9. p. m.
N b E 1.

8 Altitud. maxim. 1. 30. 1. E b N 1. } media 29. $5\frac{23}{28}$
—— minim. 27. 28. 8. E N E 2. }
Dies frigid. 1. 66. E b N 1. } media Therm. Altit. $52\frac{15}{28}$
—— tepid. 20. 48. VV 1. }

Variolæ adhuc *epidemicæ*, sed *distinctæ*, & raro *mortiferæ*: *Pleuritis* & *Peripneumonia* passim. *Morbi colici* graves sub *Finem Mensis*, ab eadem fortè (A) *Causa*, quæ fuit *Pleuritidis*; utrisque enim *Missio Sanguinis* profuit maximè; *Cruor*que æquè viscidus ex *Colicis*, ac ex *Rheumaticis*, aut *Pleuriticis* effluxit. *Lenia tantùm & anti-phlogistica Purgantia* juvabant, nocebant prorsùs *Drastica* & *Medicamenta calidiora*; imo horrenda sæpe excitabant *Tormina*, ac *Urinam* suppressibant penitus: *Clysmata* utique & *Fomenta emollientia* inveni utilissima.

MARTIO.

M A R T I O.

A quarto Martii Die octavum adusque Auster nimbosus Mercurium maximè depressit, plurima ruente Pluvia; inde ad decimum quintum nulla, nisi decimo, afflante plerumque Favonio: tunc cadente rursus Barometro Pluvia quoque descendit usque ad vigesimum primum: sub Finem verò resurgebat Barometer, licet Ventus variabat quotidie.

	$\frac{11}{3}$	$\frac{11}{4}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{11}{7}$			$\frac{11}{17}$	$\frac{11}{18}$	$\frac{11}{19}$
Pluvia	3.	4.	5.	6.	7.	10.	15.	17.	18.	19.
	$\frac{11}{21}$	$\frac{1}{25}$	26.	28.	29.	Grando	5.	23.	= 3.	432.
Levis	AB.	9.	H.	11.	p.	m.	Malacia.	Procella		
gravisque	Pluvia	6.	sera	Nocte.	SS	VV.				

8	Altitud. maxim.	31.	29.	9.	N 1.	} media 29. $4\frac{12}{31}$
—	minim.	7.	28.	5.	S b VV 3x.	
Dies frigid.	1.	63.	N N	VV	1.	} media Therm. Altit. $49\frac{22}{31}$
— tepid.	13.	42.	Malacia.			

Variolæ adhuc *epidemicæ*, at Ruri maximè. Morbi colici graves passim; necnon Peripneumoniæ Affectibus *nervosis* stipatæ, sub Finem Mensis præcipuè.

A P R I L I.

Ab ipso Initio Aprilis ad decimum octavum Diem varia fuit Cœli Facies ac Tempestatis, variante paululùm subinde *Baroscopio*: tunc Subsolani Afflatus Nubes dispulere & Pluviam, *Atmosphæra* quoque sicca facta est & tenuis valdè.

Malacia

Malacia interfuit frequens hoc Mense, plurimum Noctu decidente Rore.

Pluvia $\frac{1}{3}$. $\frac{1}{7}$. $\frac{1}{9}$. $\frac{1}{11}$. $\frac{1}{13}$. $\frac{1}{16}$. — 18. — 1. 258. Dig. Dec.
 Tenuis Glacies mane 20. E b N 1. Levis AB.
 1. Malacia — 3. VV N VV 1.

Altitud. maxim. 20. 30. 1. E b N 1. } media 29. $7\frac{13}{29}$
 ——— minim. 17. 29. 3. VV S VV 2. }
 Dies frigid. 4. 52. N VV b VV 2. } med. Therm. Altit. $43\frac{6}{29}$
 — tepid. 28. 37. Malacia. }

Morbus colicus & *Variolæ* adhuc passim. Febres *nervosæ*, remittentes, intermittentes, levi sæpe Delirio accedente, frequentes. Tumores Capitis *erysipelatosi*, medio præsertim Mense. sub Finem Tusses, Pleuritides, Peripneumoniæ, & veræ, & nothæ.

M A I O.

Fremuit ab Oriente, aut Septentrione, Ventus, accedente magna *Atmosphæræ* siccitate, donec octavo Die, stagnante Aere, pluvia decidit: ab undecimo ad vicesimum incerta admodum & Pluvia Tempestas, declinante *Barometro*, humidoque facto Aere; dehinc, etsi Pluvia fuit parca, Tempestas haud aprica sequuta est.

Pluvia $\frac{1}{8}$. 11. $\frac{1}{13}$. $\frac{1}{14}$. 15. $\frac{1}{17}$. $\frac{1}{18}$. 19. $\frac{1}{23}$. Dig. Dec.
 25. 28. = 1.604.

Altitud. maxim. 1. 29. 8. E b N 3. } media 29. $5\frac{7}{30}$
 ——— minim. 19. 29. 0. S 2. }
 Dies frigid. 3. 46. N b E 2. } media Therm. Altit. $37\frac{21}{30}$
 — tepid. 31. 30. N VV 1. }

Febres intermittentes & remittentes cum profusis Sudoribus jam grassantur, quibus, in Paroxysmis, accedit sæpissimè aut Delirium, aut *Diarrhœa*: hæ, vel ex levi Errore, in continuas malignas *nervosas*, transibant haud infrequenter. Crebræ quoque hoc Mense fuere Febres *rheumaticæ*, pleuriticæ, peripneumonicæ; facilè autem & abundè (B) expectorabant Sputa flava, subrubicunda, eaque brevi *judicatoria*; adeò ut, nisi ipso Morbi Initio, Venæ sectionem, saltem repetitam, haud desiderarent.

J U N I O.

Prævaluit hoc Mense Ventus occidentalis; nunc ad Austrum, nunc ad Septentrionem fluctens; & medio & exeunte Junio Aer valdè humidus: nulla fuit notabilis *Barometri* elevatio hoc Mense.

Pluvia 6.—¹¹9. ¹¹10. ¹11. ¹12. ¹¹15. 17. 18. 24.

Dig. Dec.

26.—28. = 1. 715.

8 Altitud. maxim. 1. 29. 8. N VV 1. } media 29. $5\frac{16}{30}$

— — — minim. 15. 29. 1. S VV 1. }

Dies frigid. 10. 41. VV N VV 1. } media Therm. Altit. $83\frac{3}{30}$

— calid. 28. 28. Malacia.

Jam fere vānescunt penitūs Febres *convexæ*: vix ullæ nisi de Languore Virium Querelæ, quod inter omnes.

JULIO.

J U L I O.

Spiravit usque ab Occidente Ventus, is verò lenis, & paulò magis vergens ad Austrum, toto Julio, Malacia sæpe interveniente: eadem pene, quæ in superiore Mense, Tempestas, ni quòd *Atmosphæra* magis humida esset, tepida & nebulosa, sub Finem Mensis præsertim.

Pluvia $\frac{1}{1}$. $\frac{1111}{7}$. 8. 10. 16. 25. — $\frac{1}{28}$. $\frac{111}{29}$. 31.
 Dig. Dec.
 = 2.050.

Tonitru è longiquo 1. Fulgur & Tonitru cum gravissima Pluvia. 7. VV. 1.

8 Altitud. maxim. 15. 29. 9. Malacia. } media 29. $6\frac{2}{31}$
 ——— minim. 29. 29. 3. VV 8 VV 2. }
 Dies frigid. 2. 40. NN VV 3. } media Therm. Altit. $31\frac{17}{31}$
 — calid. 22. 27. Malacia. }

Variolæ mali admodum Moris per totam fere Cornubiam: maximæ de Languoribus Querelæ undique, ac plurimi *hysterici* & *hypochondriaci* Paroxysmi. Exeunte Mense Icterus frequens valdè, ac plures Febres lentæ; aliquæ *miliares*. Jam Lues bovina grassatur.

A U G U S T O.

Ab initio Augusti ad Diem decimum septimum Ventus fuit varius, plerumque verò ab Occidente; tunc orsus est Aquilo, sudo consequente Cælo: inde Boreas, aut Vulturnus ad ipsum Finem. Aer fuit hoc Mense humidus sæpe

sæpe & nebulosus ; à decimo septimo tamen ad vicesimum tertium satis siccus .

Pluvia $\frac{1}{1}$. 6. 9. $\frac{11}{14}$. 15. 23. $\frac{11}{26}$. 27. 29. $\frac{111}{30}$.

Dig. Dec.

= 1. 538.

Magna AB. 28. E 2. Fulgur & Tonitru è longiquo 26.

⌘ Altitud. maxim. 18. 30. 0. N. 1. } media 29. 6.
 ——— minim. 26. 29. 2. S S E 2. }

Dies frigid. 24. 39. E N E 1. } media Therm. Altit. 29 $\frac{39}{32}$
 — calid. 12. 22. Malacia . }

Morbus regius frequens etiamnum cum Febricula & gravi nonnumquam *Hæmorrhagia*. *Variolæ* adhuc in Vicinia Cornubiensi ; perpauci aliter Morbi.

S E P T E M B R I.

Multa Pluvia decidit inter quartum & decimum quintum Diem Septembris, Vento interim variante quotidie ; post id Tempus Eurus ferè perpetuus, at Pluviæ parum, quamvis Cælum fuit plerumque nubilum, & Aer sæpe valdè humidus. Maxima Roratio à decimo septimo ad vicesimum quartum.

Pluvia 4. $\frac{1}{5}$. — $\frac{11}{10}$. $\frac{11}{11}$. $\frac{1}{12}$. — 15. 26. = 2. 068. Dig. Dec.

Levis AB. 24. E b S 1. — 27. N N V V 1. — magis lucidum 26. Malacia.

⌘ Altitud. maxim. 18. 30. 0. E 1. } media 29. $5\frac{23}{29}$
 ——— minim. 11. 28. 8. S V V 3. }

Dies frigid. 18. 45. Pruina. } media Therm. Altitud. 34 $\frac{45}{29}$
 — tepid. 6. 29. S 2. }

Plures

Plures *Apoplexia* & *Paralyfi* correpti sunt :
Mulieres multæ Tumore Crurum *erysipelatofo*
vexantur : Tusses & *Coryzæ* sub Finem fre-
quentes.

O C T O B R I.

Perflavit Diem adusque octavum Ventus orien-
talis violenter, quarto autem & quinto vehe-
mentissimè; adeò ut omnes fere Arbores, ictas
quasi Fulmine, Foliis spoliaverit; imò plures
evertit funditùs. Postea multo lenior ab Occasu,
aut Meridie, successit Ventus, Finem adusque
durans, multa interim ruente Pluvia. (C) Tan-
tos excitavit Vapores Procella Mensis initio, ut
reddita esset inde Atmosphæra maximè humida;
Frondes Arborum Gustu valde falsas deprehendi
ad tertium & ultra à Littore Lapidem: adeò
Mare perturbavit.

Pluvia 6. $\frac{2}{7}$. $\frac{1}{8}$. — 10. $\frac{21}{12}$. $\frac{1}{14}$. $\frac{11}{17}$. $\frac{111}{18}$. — 23:

— 25. $\frac{11}{28}$. — 30. = 3. 372.
Dig. Dec.

Procella 3. E 4. — 4. E 4. — 5. E b N 4.

8 Altitud. maxim. 16. 29. 8. VV 1. } media 29. $4\frac{8}{30}$
— — minim. 5. 29. 1.
Dies frigid. 6. 53. E 3. } media Therm. Altitud. $41\frac{5}{20}$
— tepid. 15. 38. Malacia. }

Multæ Tusses & Affectiones *rheumaticæ* toto
hoc mense, at fere sine Febre. Morbi colici,
Diarrhœa plerumque comitante, quamplurimos
invadunt; at longè vehementiùs cum sine *Diar-*
rhœa, Asthma, & notha Pleuritis, passim;

N O V E M B R I.

Initio Mensis horrida Tempestas; primo Die Fulgur cum Tonitru vehemens, gravissima ruente Pluvia, Libs. porrò sævissimè perfurebat; ab octavo autem magis læta Rerum Facies, *Mercurio* resurgente, ac Favonio flante: decimo sexto tamen Libs. recurrit nimbosus & pluvius admodum, Aer interim maximè humidus. A vicesimo sexto Septentrio perpetuus, qui *Barometrum* reddidit elatum valdè, Aeremque ficcum, accedente Gelu.

Pluvia $\frac{III}{1.}$ — $\frac{II}{3.}$ — $\frac{II}{5.}$ 6. $\frac{II}{8.}$ 10. 11. 15. $\frac{IIII}{17.}$ $\frac{I}{18.}$
 Dig. Dec.
 $\frac{II}{19.}$ 20. $\frac{II}{21.}$ $\frac{I}{22.}$ 23. 27. = 4. 480.

Procella R.S. VV 4^x. — 2. S VV 4^x. — 3. S VV
 b S 4^x. — S VV 4. Nix multa 25. p. m.

8 Altitud. maxim. 30. 30. 4. N. 1. } media 29. $7\frac{3}{29}$
 ——— minim. 3. 28. 9. S VV b S 4^x. }
 Dies frigid. 30. 61. N. 1. } media Therm. Altitud. $48\frac{28}{29}$
 — tepid. 22. 41. VV 1. }

Morbi colici plures cum affectibus rheumaticis: Gravedines & Catarrhi frequentes: Synochus putrida passim.

D E C E M B R I.

Permagna fuit *Barometri* Altitudo Mense Decembri, Septentrione, Borea, aut Euro, afflantibus assiduè.

Incipiente Mense rigidum Gelu, tunc quoque, ac sæpe post, serenitas: à vigesimo primo
 ad

1730)

Constitutio Aeris, &c.

31

ad Finem usque Aer valde humidus, Pluvia subinde cadente.

Pluvia 8. 10.—12. $\frac{1}{16}$. 23. $\frac{11}{25}$. $\frac{11}{26}$.—28. 31.
Dig. Dec.

= 1. 190.

8 Altitud. maxim. 3. 30. 5. Nb E 2. } media 30. $\frac{0^{21}}{28}$
— minim. 23. 29. 5. S S E 2. }
Dies frigid. 2. 68. N N E 1. } media Therm. Altitud. $58\frac{24}{28}$
— tepid. 27. 50. Malacia. }

Colica fuit frequens hactenus; *Rheumatismi* porro cum Inflammatione multò majore, quàm antea: Tusses siccae, laboriosae cum Tumore Faucium: Peripneumonia passim, sub Finem verò Mensis præcipue. Febres lentæ, nervosae per Viciniam, at in Oppido rarius.

Tota Pluviae Quantitas, quæ hoc Anno decedit, fuit 25. 698.
Dig. Dec.

Notationes aliquæ.

(A) Nihil sanè in Artem medicam pestiferum magis unquam irrepsit, quàm generalia quædam nomina Morbis imponere, iisque aptare velle generalem quamdam Medicinam. Ita videlicet omnis Dolor Ventris Morbus colicus nuncupatur protinus; indito sic Nomine, quid ultra Empirici, Batrones, id Genus omne, quàm Arcanum quoddam porrigere, aut *Pharmacopœia* cujusdam Indicem evolvendo, quærere quid ibi ad Colicem?

G

Quid

Quid inde? Elixir Salutis, Tinctur. sacra, Pil. Coch. min. vel è Duob. aut tale quid, exhibetur illicò; seu inflammata sint Intestina, seu constricta *Spasmo*: unde sæpe Toxica potiùs, quàm Remedia, fiunt. — Prudentis autem est Medici primò æstimare Morbi Causam, eumque deinde solvere tentare. — Adeò nimirum ubi sævit abdominis Dolor vehemens, fixus, pulsans; & acris Calor adest, Pulsusque velox & tensus, non protinùs exhibenda sunt acria *Cathartica*: quò plùs enim proceditur, *drastica* urgendo *Pharmaca*, eo vehementiùs furit Morbus, donec supervenit tandem *Ileos* crudelis, *Sphacelusque* demùm lethalis. Sed ante omnia, Sanguis mittendus est, nec parcè nimis: pòst enim Alvus vel leni respondebit *Cathartico*, obserata secùs validissimo. Ubi vero Pituita tenax & acida dominatur, & colicos producit Dolores, Res longè aliter se habet.

(B) In Morbis utique pulmonariis, ubi Excreatio facilis & expedita est satis, adeò non juvat Sanguinis Missio, ut eam sæpe supprimat omninò: nullo ideò Modo indicatur ex Usu fore, nisi evidens adsit *Plethora*, aut vehemens aliquis Dolor, aut *Dyspnœa* gravis, aut sinceri Sanguinis Sputum, urgeat. Audi Coum Senem, Πτύελον χρη' ἐπὶ πᾶσι τοῖσιν Ἀλγύμασι τοῖσι περὶ τὸν Πλευμόνα καὶ τὰς Πλευράς, ταχέως τε ἀγαπτίεσθαι καὶ εὐπετέως. Hippocrat. Prognostic. vide & ibidem paulò infra: porrò Coac. Prænotion. 13. Sect. de Pleuritide & Peripneumonia, ex editione Dureti: perpende etiam, quæ Ballonius in Epidemic. de hac Re optimè conscripsit; si is non est, quæ ex eo & Dureto diligenter congeffit Baglivius. Appendic. ad Pleuritidem. Tyroni certè medico consulo,

ut

ut non audeat tractare Pectoris Morbos, antequam ista probè perlegerit.

(C) Plures utique Vapores excitat Procella quàm vel Sol ardentissimus, potissimum si à Mari venit: hinc post Procellas graviores Atmosphæra plerumque redditur nebulosa valde, & graves corruunt Pluviæ; condensatis scilicet modò Vaporibus, quos Vehementia Tempestatis disperferat undique.

Minutissimæ quidem Aquarum Particulæ, sub Forma Vaporis, per Aerem diffusæ se mutuò fugere videntur; at Frigore condensatæ, vel adversis concurrentibus Ventis congestæ, aut Montibus impactæ obstantibus, in mutuos Amplexus ruunt & decidunt illicò.

CONSTITUTIO

AERIS, &c.

Anno MDCCXXI.

JANUARIO.

CUM novo Anno frigidissima Tempestas invasit ; omnia constricta Gelu , Nive omnia plena ! Asperam autem lenivit Brumam continua fere & pulchra serenitas. Venti aquilonares dominati sunt per totum Januarium , perdurante ad Finem usque rigidissimo Gelu ; Aer interea fuit valdè purus & ficcus . Exeunte Mense (A) *Barometer* decidit plurimum , quod demirabar utique ; quoniam ex iisdem Plagis flare perstabat Ventus : hoc verò accidebat forsan ob Copiam Nivis aliis in Locis delapsæ.

Nix 2. $\frac{1}{3}$. $\frac{1}{4}$. 5. $\frac{11}{24}$. 26. Grando nivosa
Dig. Dec.

30. 31. Imbres 11. 12. = 0.622.

Fortè vix Dimidium Nivis collectum fuit ; Nix nempe in Excipulo congelata , ibique restans , Locum haud dedit succedenti , adeò ut plurima esset difflata.

8 Altitud.

8 Altitud. maxim. 12. 30. 3. N E 2. } media 29. $9\frac{2}{22}$
 ——— minim. 28. 29. 1. N 1.
 Dies frigid. 31. 76. N. 2. } media Therm. Altit. $66\frac{2}{22}$
 — tepid. 21. 58. Malacia. }

Sævit Morbus colicus usque cum acerbo sæpe
 Dolore *Rheumatico*. Tussēs siccæ, laboriosæ, &
 Accessiones graves *Asthmaticæ*, frequentes, cum
 Tumore Faucium *anginoso* sæpissimè: his maxi-
 mè profuit *Hydromel* tepidum, Serum Lactis *Ca-*
nariense dilutius cum Elix. *Asthmat.* aut Pil. *Ma-*
thæi; interposito nonnumquam Oximelite *Scil-*
lino & applicatis Humeris Cervicibusque *Vesica-*
toriis. Cruciavit plurimos plurimùm Arthritis,
Variolæ passim in Cornubia.

F E B R U A R I O.

Initio Februarii resurrexit *Mercurius*, at Frigus
 remisit; octavo & nono, ab Austro Procella *Bar-*
ometrum depressit plurimùm: à decimo octavo
 ad Finem usque Venti Septentrionales Nubes a-
 begerunt; nulla omnino decidente Pluvia; sur-
 gente iterum *Baroscopio*.

Pluvia 3. $\frac{11}{4}$. $\frac{11}{10}$. $\frac{11}{11}$. 13. $\frac{1}{14}$. $\frac{1}{15}$. 16. 18.
 Dig. Dec.

Nix 20. Grando gravis 1. = 1. 706.

Lumen boreale parvum 19. H. 10. p. m.
 N b E 1.

8 Altitud. maxim. 2. 30. 3. E N E 1. } media 29. $6\frac{13}{27}$
 ——— minima 9. 28. 9. S S E 4.
 Dies frigid. 1. 73. N N VV 1. } media Therm. Altit. $57\frac{12}{27}$
 — tepid. 10. 53. VV 1. }

Tussis *Asthmatica* frequens adhuc. Pleuritides & Peripneumonix haud paucæ. Morbus *anginosus* (the Strangles dictus) inter Equos sævit plurimum.

M A R T I O.

Statio *Baroscopii* toto Martio fuit valde sublimis, Ventus ferme assiduè borealis, Malacia tamen sæpissimè intercurrente: Aer purus & maximè ficcus, exeunte Mense præsertim: Pluvia parca admodum, at pulchra plerumque Serenitas.

Dig. Dec.

Pluvia 4. 12. 18. 27. = 0. 140.

$\begin{array}{l} \text{Altitud. maxim. 2. 30. 4. Malacia.} \\ \text{minim. 12. 29. 7. Malacia.} \end{array}$	$\left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{media } 30. \text{ } 0 \frac{22}{31}$
$\begin{array}{l} \text{Dies frigid. 1. 62. N b VV 1.} \\ \text{tepid. 14. 45. NN VV 2.} \end{array}$	$\left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{media Therm. Altit. } 50 \frac{6}{31}$

Tusses adhuc & Angina valde frequens inter Equos. Graves Arthritidis Paroxyfmi, sævi quoque *Rheumatismi*.

(B) Pleuritides, Peripneumonix, Pleuro-peripneumonix; Tusses sicca, asthmaticæ, laboriosissimæ, sunt valde *epidemicæ*; perparcè admodum expuunt Ægroti, anhelant maximè; multi moriuntur.

A P R I L I.

Boreas, isque sæpe velox valde, à primo ad duodécimum Diem Aprilis perflavit; Tempestas intereà fuit admodum serena &, pro Anni Tempore, frigida maximè & sicca: à decimo tertio

1731)

Constitutio Aeris, &c.

57

tertio ad vicesimum Libs, aut Favonius, Pluvia cadente & Mercurio: recurrebat dein ad Orientem Ventus, vicesimo secundo & tertio valde procellosus, magis post vergebat ad Austrum, humescente Atmosphæra.

Pluvia 13. ¹¹¹15. ⁶16. ¹18. 19. 23. 24. 26. 28.
Dig. Dec.

= 1. 254.

Gelu 7. 10. 11. Tonitru 18. Per magna AB.
26. 10. p. m. N VV 1.

Altitud. maxima 7. 29. 9. E N E 3. } media 29. 5.
— minima 16. 28. 8. S S VV 3. }
Dies frigid. 10. 62. N E b N. 2. rigidum Gelu. } media Therm.
— tepid. 28. 43. E S E 2. — — — — — } Altit. $48\frac{21}{28}$

Jam morbus inter Equos evanescit. Variolæ passim: Pleuritides & Peripneumonix frequentissime sæviunt, ob Humorū Tenacitatem & difficilem Excreationem Morbus evadit valde periculosus; ubi verò expuitur facile, brevi sedatur; præcipuè si Sputa mista sunt rufo quodam Sanguine: Spumantia sanè & aquosa minime laudo.

M A I O.

Hoc Mense Subsolanus, aut Vulturū, flabant majore ex parte, Libs aliquando, Caurus sæpius; ad Finem verò fremebat Aquilo: à decimo nono ad tricesimum primum Aer erat maxime siccus.

Dig. Dec.

Pluvia 4. 5. 6. 8. 10. 16. 17. 22. 24. = 0. 634

Fulgur & Tonitru 22. 24. Malacia.

γ Altitud. maxim. 30. 30. 1. NN E 3. } media 29. 7.
 ——— minim. 6. 29. 3. S E 1.

Dies frigid. 1. 48. S E 1x. } media 36 $\frac{8}{31}$
 — tepid. 23. 28. N VV 1.

Morbi Pectoris adhuc. *Variolæ sporadicæ* ;
 passim *Erysipelas* ; Ischias solito frequentior :
 Tempestat autem ut plurimum salubris est.

J U N I O.

Procedente Junio Aer fuit valde siccus, Ventus
 subsolanus, aut arctous, Malacia non rarò inter-
 currente; sensim autem delapsus est *Mercurius*,
 Aerque factus est sensim humidior. A vicesimo
 Libs plerumque regnavit, *Atmosphæræ* Tempe-
 riem, ut solet, reddens humidam valde, nebulo-
 sam, atque etiam frigidiorē.

Pluvia 10. 16. = 19. 20. 23. 24. 25. 26.

Dig. Dec.

28. = 2. 148.

γ Altitud. maxima 1. 30. 0. E 2. } media 29. 4 $\frac{25}{26}$
 ——— minim. 20. 29. 1. VV S VV 1.

Dies frigid. \approx 38. N 1. } media Therm. Altit. 32 $\frac{5}{16}$
 — tepid. 20. 29.

Variolæ epidemicæ exque sæpe mali moris; sub
Crisin aut Humore crudo plenæ, aut nigram ex-
 hibentes Faciem. *Erysipelas* frequens, cætero-
 quin Mensis fuit saluber satis.

J U L I O.

J U L I O.

Haud notabilis fuit *Barometri* Ascensus; aut Descensus, hoc Mense; Ventus inconstans, Malacia porro interveniebat sæpissimè, multo decedente Rore: Aer ut plurimum siccus fuit & non rarò valde calidus, præsertim exeunte Mense.

Pluvia $\frac{11}{7}$. $\frac{1}{8}$. $\frac{11}{15}$. $\frac{11}{16}$. $\frac{11}{20}$. — $\frac{11}{23}$. $\frac{11}{25}$. $\frac{11}{31}$. = 1. 300.
Fulgur & Tonitru 31. p. m. S S E 11.

Altitud. maxim. 10. 29. 8. Malacia. } media 29. $5\frac{12}{26}$
— minim. 31. 29. 3. S S E 1. }
Dies frigid. 19. 37. E N E 1. } media Therm. Altitud. 27.
— calid. 30. 21. Malacia. }

Crebræ adhuc *Variolæ*: Febres intermittentes; tertianæ potissimum, sub Finem Mensis, at Ruri maximè.

A U G U S T O.

Ventus ab Exortu perflavit toto Augusto fere; Initio ad Septentrionem declinans, *Barometro* tamen haud multum surgente: sub Finem Vultur-
turnus plurimos attulit Vapores & Pluviam.

Pluvia 1. — 3. 9. 10. $\frac{1111}{21}$. $\frac{1}{22}$. $\frac{1}{23}$. $\frac{1}{25}$. $\frac{11}{26}$. $\frac{11}{27}$.
Dig. Dec.

28. 31. = 1. 988.

Levis AB. 16. N b E 1. Fulgur & Tonitru 9.
— 21. E S E 2.

Altitud. maxim. 12. 29. 9. N E 1. } media 29. $4\frac{12}{30}$
— minim. 26. 29. 0. E S E 2. }

Dies

Dies frigid. 12. 38.

— calid. 8. 22. N 1.

} media Therm. Altitud. 29.

Sævæ Variolæ, & Febres miliares rubræ, epidemicæ; Tussis convulsivæ inter Pueros.

S E P T E M B R I.

Ineunte Septembri Libs, aut Favonius; ab undecimo Eurus fere perpetuus; Malacia frequens autem medio Mense cum Roratione maxima: ad Initium & ad Finem Aer erat valde humidus.

Pluvia $\frac{1}{1}$. 2. 4. 6. 8. 18. $\frac{11}{23}$. 24. 26. $\frac{11}{27}$.

Dig. Dec.

28. — 30. = 1. 300.

Levis AB. 13. Malacia, permagna autem 27.
H. 10. Malacia.

8 Altitud. maxim. 11. 30. 0. E 1.

— — — — — minim. 27. 29. 2. S S E 2. } media 29. $5\frac{19}{25}$

Dies frigid. 9. 42. VV N VV 1.

— tepid. 1. 30. S VV 1. } media Therm. Altitud. $52\frac{21}{25}$

Variolæ passim. Febris miliaris cum pravis admodum Symptomatibus haud infrequens. Cholæræ plurimæ.

O C T O B R I.

Principio afflavit Zephyrus, Malacia sæpe interposita; ortus est Vulturnus undecimo, qui duravit fere ad Diem vigesimum septimum, flante tamen Borea à vicesimo ad vicesimum secundum: ad Finem Libs infremuit, labente plurimum *Baroscopio*.

Pluvia

Pluvia 6. 9. ¹¹13. ¹¹14. ¹¹15. 16. ¹¹24. 25. 27.
¹¹28. — ¹30. 31. = 2. 366.
 Dig. Dec.

Fulgur & Tonitru 14. Vesperi, Malacia.

Cholera adhuc, Febre sæpe comitante, & non rarò Eruptione *miliari* salutifera: colicus insuper Morbus jam grassatur.

N O V E M B R I.

Per Initia Novembris *Barometri* Statio fuit humilis, etsi Eurus Zephyro successit, qui spiravit à quinto ad duodecimum; à decimo tertio ad vicesimum tertium *Corus*, aut *Favonius*, surgente *Mercurio*: inde Boreas, Finem adusque perflans, Nubes dispulit, Aerem siccavit plurimum, rigidumque Gelu induxit.

Pluvia ¹1. — ¹¹4. ¹5. ¹7. ¹8. ¹¹9. 10. 14. 18. 20. 22.
 Dig. Dec.

Nix 28. = 2. 356.

♂ Altitud. maxim. 26. 30. 2. NE 3. } media 29. $6\frac{2}{29}$
 ——— minim. 8. 28. 7. SE 3.
 Dies frigid. 30. 66. NNE 1. } media Therm. Altit. $50\frac{10}{29}$
 — tepid. 3. 40. VV 1.

Mensis minimè morbosus: nihil nisi morbus colicus, isque fere à *Pomaceo* novello.

D E C E M B R I.

Alta fuit *Barometri* Statio toto fere Mense, flante plerumque *Cauro*, aut *Aquilone*: Libs verò interdum Nubes atque Pluviam invexit.
 Gelu,

Gelu, idque rigidum, à decimo nono ad vicesimum sextum, Borea furente; Aer interea pro Anni Tempore fuit siccissimus.

Pluvia 2. 5. — $\frac{11}{8}$. 10. 13. 15. — 17. 25. 28.

Dig. Dec.

— 30. Grando 7. Nix 26. = 1.452.

Levis AB. 19. N. 1. Procella 13. fera Noctē:
N w.

8 Altitud. maxim. 1. 30. 2. NN VV 1. } mediā 29. $8\frac{2}{3}$
—— minim. 6. 29. 4. VV b S 2.

Dies frigid. 52. 67. N E 1x. } media Therm. Altit. $56\frac{12}{28}$
— tepid. 12. 49. VV N VV 1.

Morbus colicus adhuc *epidemicus*; Gravedines frequentes.

Dig. Dec.

Tota Pluviæ Quantitas hoc Anno fuit 17. 266.
at magna pars Nivis, Mense Januario, amissa fuit.

NOTATIONES.

(A) Haud exiguum sæpe, ac subitum, *Mercurii* Descensum notavi, cum instantis *Atmosphææ* Facies nulla hujus Indicia prodiderit; sed inquirendo diligentius, aut vehementes Imbres corruisse, aut Fulmina, inter finitimos reperi: unde circumfusus Aer ad *Æquilibrium* restituendum illuc ruebat confestim.

(B) Ortum duxisse videntur hi Morbi *inflammatorii* à diuturna Frigiditate Aeris ac Siccitate, quæ Fibras tensas nimium & Sanguinem plus
justo

justo densum effecerant. Notavit olim Hippocrates, quod aquilonia Tempestas Tusses moveat, ac dolores Lateris & Pectoris excitet, Aphorism. v. Sect. 3. Ego verò observavi sæpissimè, quod quo sicciora fuere Tempora, eo parior Exscretio, ac Pectoris Purgatio difficilior evenit; quod tamen in Morbis pulmoneis permagni haud dubio momenti est: vix utique feliciter solvitur Peripneumonia sine larga Sputorum ejectione. Nec id magis promovet aliquid quàm larga & frequens Potatio tepidi alicujus Liqueoris *antiphlogistici*, nitrosi, leniterque detergentis; præcipuè post debitam Sanguinis Missionem: quòd si minùs ex Voto procedat, Gummi Ammoniacum, Scillitica, Oleosa, detergentia, *Mercurialia* idonea, & nonnumquam etiam *Volatilia*, adjicienda sunt. At bibere assatim tepidè, imò calidè, perpetuum esse debet, durante præsertim magna *Atmosphæ* siccitate: quod & Vapore Pulmones fovet & relaxat, & Sanguinem satis fluidum conservat. “Fervida hæc Liqueorum Potio (ait Baglivi) est mihi in Secretis pro dissolvendis pertinacibus Visciditatibus in Pleuritide epidemica & maligna, nec non in aliis Pectoris Morbis, à tali Causa pendentibus.”

At si nimia fuerit in Pulmones Destillatio, eaque cruda & acris, eam lenire oportet *Opiato* idoneo, quale est Syrupus e Meconio, Laudanum, Elixir asthmaticum, Pilula Mathæi, &c. Cursumque Humoris avertere debemus *Epispasticis* admotis; idque præcipuè Suris internis, modò magna adsit *Dyspnæa* & *Anacatharsis* difficilis: sunt enim salutifera maximè. Vel ipse Medicinæ Parens Abscessus ad Tibias ortos in Morbis,

Morbis etiam vehementibus Pulmonis utiles pronuntiavit : αἱ δὲ Ἀποσάσεις αἱ εἰς τὰ Σκέλεα, &c. Hippocrat. Lib. Prænotion. Quantus sanè Consensus est has inter Partes ab hoc uno elucet satis ; quod, qui ex Asthmate veteri Tumore Pedum hydropico laborant, Asthmate liberentur : Sponte autem evanescente Tumore, vel Arte repulso, protinùs anhelant.

Sed ut in Peripneumoniacis movere Sputa opportunum est maximè, id in simplice Pleuritide moliri ineptum est prorsùs. Nihil enim hic æquè juvat ac larga, frequens, & matura Sanguinis Missio, interposità quoque multa, diluente, emolliente Potione : hæc enim Sanguinem diluit & fovet, dum Fibras nimis rigidas relaxat, tandemque coacta resolvit ; præcipuè Nitro & Camphora rectè assumptis ; quibus & subinde rectissimè adjungitur Papaveris Lacryma, ad compescendam nempe Doloris Vehementiam : huic enim inest etiam relaxandi Vis maxima, adeoque in omnibus Morbis, ex nimia *strictura* (ut Methodici loquuntur) ante omnia juvat. Hinc est quod rapidum nimis Sanguinis Cursum reprimat, & morbidæ materiæ *Pepsin* promovet maximè : hinc vides plerumque post Opii Usus Sedimentum in Urinis copiosum.

Vera sanè Pleuritis haud magis *Bechica*, *Ec-clegmata*, atque id genus alia, poscit quam Inflammatio Cruris, aut ipsa Podagra : longè profectò magis proficimus Fomentis idoneis ; hæc enim sæpissimè levant Dolorem, Morbumque evocant. — Imò in pertinace ac sævo Dolo-
Cucurbitulæ, atque etiam ipsæ scarificatæ, juvant maximè, aliis vix aliquid proficientibus. Sic Celsus, Capit. de Laterum Dolo-
“ Confu-
“ gien-

“ giendum ad Cucurbitulas est antè summa in-
 “ cisa Cute. “ Sic Aretæus Cappadox, ἐπὶ
 λοτάτη γὰρ ἐπὶ τῶν Πλευριτικῶν ἢ ἀπὸ Συκίης Ὀφελείη,
 Cap. de Curatione Pleuritid. Quidni & *Epispas-
 tica* quandoque in graviore Casu admoveantur?
 Veteres sanè frequenter Sinapi super Pectus im-
 ponebant. — Vivit adhuc & viget bonus qui-
 dem ad sacra Minister, qui, multis abhinc An-
 nis, Pleuritide sævissima correptus erat. Hunc
 nihil prælarga, eaque quater repetita, Sanguinis
 Detractio juvabat, Anodyna & Fomenta parum,
 brevi recurrente vehemente Dolore: tandem le-
 vi Scarificatione facta, leniterque Cucurbitulis
 extracto Cruore, *Vesicatorium* superimponi iussi.
 Quid fit? intra perpaucas Horas evanuit omninò
 Dolor, neque postea recurrit. Fateor equidem
 quod Ulcuscula paulo difficiliùs sanarentur; sed
 quid istud, ubi Mors aliter brevi fuerit pro
 Remedio?

Quandoquidem ergo tanta fit differentia Pleu-
 ritidem inter & Peripneumoniam, non erit alie-
 num forsan *diagnostica* utriusque Signa descri-
 bere.

Proprium est Pleuritidis incipere à Rigore, quem
 mox Calor ardens excipit; hisque confes-
 tim accedit Lateris Dolor vehemens, pungens,
 nunc ad Spinam, ad Claviculas sæpe, nonnun-
 quam ad anteriora Pectoris, tendens: dum verò
 hæc vigent, insignis adest Pulsus Durities, Chor-
 dæ admodum tensæ vibrantis adinstar. Hæc qui-
 dem Pleuritidis Signa *pathognomini* πῶτατα pror-
 sùs agnosco; Tussis utique, Pace dixerim Ga-
 leni, haud rarò abest omnino.

Peripneumonia, ut ex Hippocrate Celsus, plus
 Peri-

Periculi quàm * Doloris habet. Pulmonum Gravitas ac *Dyspnœa*, Pectoris Oppressio, & Spiritus ex Ore fervens, purulentorumque Rejectio, Febre comitante ac Tussi, propria & minimè fallacia sunt Peripneumonix Indicia.

Fateor equidem quod hi Morbi, longè frequentius quàm vulgo putatur, aut invadunt unà, aut invalescenti Pleuritidi Peripneumonia quoque accedit: ideo Riolanus horum conjunctionem rectissimè nominavit *Pleuripneumoniam*. — Perpende modò utriusque Morbi Sedem, ita Rationem ex facili videbis cur hoc evenit sæpissimè. Exeunt namque ex *Aorta* ad Angulos pene rectos Arteriæ *intercostales*, ex quibus pleuriticæ; exeunt ex eadem ad eundem fere Modum Arteriæ *Bronchiales*, Pulmonis Substantiam irrigantes. Jam ergo cùm multo abundat Glutine Sanguis, & Vasa, solito magis elastica, Humores validissimè propellunt, Pars magis viscida Sanguinis, utpote levior ad Aortæ Latera urgetur, dum fluit mobilior puriorque per Axim Canalis; proinde & in Vascula Pleuræ & Pulmonis, modo descripto ab Arteria magna producta, impellitur: unde Sanguis maximè crassus, parumque idoneus harum Arteriarum Ramusculos permeare, Obstructiones ibidem ac Inflammationes creat. Quis adeò non videt, ita non mirandam esse Peripneumoniam cum Pleuritide conjunctam, ut mirum magis videatur, cur uterque Morbus, eadem urgente Causa, non semper concurrat simul; eoque magis cùm Lobi Pulmonum

Pleuræ

* *Ἀπὸνία ἢ μένος Φυέλμονη Πνεύμων, ἀπὸνος γὰρ ἡ Φύσις αὐτῆς*; Aret. Cappad. Capit. de Peripneum.

Pleuræ coalescant, quod non rarò, cætera sanis; accidit?

In ipso quidem Initio omnis Peripneumoniæ Sanguis rectissimè mittitur ex magno Vase, per magnum Vulnus, ut Quantitas & Vis ejus minuantur, & Locus adsit Diluentibus; ac ne, dum urget usque Inflammatio in extremis *Bronchialibus* Arteriis, ipsi etiam Ramusculi Arteriarum pulmonialium inde compressi, obstructi quoque brevi fierent, unde sævissima oriretur Peripneumonia, jugulans ocysimè; potissimum si multæ *Arteriolæ pulmonales* affectæ sint: quo in Casu vix aliquid proficiat nisi largissima Sanguinis Detractio, imò fere ad Deliquium usque. — Pro ratione autem majoris aut minoris, respirandi Difficultatis, major, minorve, Cruoris Quantitas emitti debet. Pulsus enim haudquam in hoc Morbo hujus satis fidus est Index; quandoquidem sæpe ob impeditum Sanguinis Cursum mirè turbatus: imò qui vix sentiendus erat ante venæ Sectionem, sæpe post validè pulsatur. — Haud tamen tutò mittitur post Diem quartum; utique si Sputa subflava, rubescentia, copiosa, libere rejiciuntur. Vide Notationem (B) Anno MDCCXXX.

Hæc pauca cursim de Pectoris Inflammationibus protuli; qui vult plura, eaque perfecta omnino, perlegat diligenter consummatissimos Boerhaavii Aphorismos Capit. de Peripneumonia, &c. — At proh Dolor, dum hæc scribo, ad Deos abiit Vir immortalis, quem *Sæcula nulla tacebunt!*

CONSTITUTIO AERIS, &c.

Anno MDCCXXXII.

JANUARIO.

MENSIS Januarii Principio afflavit Aquilo, & Sudum fecit & Gelu rigidum, *Atmosphæram* quoque maximè ficcā. Totum hoc pulchrum Ventus à Meridie brevi subvertit; imò xv. & xvi. gravissima ruebat Pluvia, inde Malacia perpetua fere ad Diem vicesimum secundum: post varia admodum, at plerumque pluvia Tempestas, cadente *Mercurio*.

Pluvia 8. 11. ⁱⁱⁱⁱ15. ⁱⁱⁱⁱ16. 17. 19. 22. 23. 24.
Dig. Dec.
25. 26. 27. 28. 29. = 3. 564.
Lumen boreale parvum. 18. Malacia.

8 Altitud. maxim. 21. 30. 0. Malacia. } media 29. 6.
—— minim. 27. 28. 9. S VV 3.
Dies frigid. 9. 70. N. 1. } media Therm. Altit. 58 ⁵/₂₆
— tepid. 26. 50. S VV 2. }

Morbus colicus Passim: Tusses, Raucedines, Gravedines & Tumores Faucium valde frequen-
tes.

FEBRUA.

F E B R U A R I O.

Toto hoc Mense Ventus occidentalis prævaluit, aliquando ad Septentrionem, sæpius ad Austrum flectens, continua quasi cadente Pluvia, haud tamen gravi: nullum Gelū.

Pluvia 2. $\frac{1}{4}$ — 7. — $\frac{11}{10}$. $\frac{1}{11}$. $\frac{1}{12}$. 14. 16. 19.

$\frac{11}{21}$ — $\frac{11}{23}$. 25. 26. 28. — 2. 924. Dig. Dec.

Levis AB. 7. W 1. Procella. 6. multo mane S S W 4^x. — 10. Nocte. S W b W.

Altitud. maxim. 13. 30. 1. V V N V V 1. } media 29. 7 $\frac{1}{2}$
 ——— minim. 7. 29. 1. V V 1.
 Dies frigid. 8. 56. V V N V V 1. } media Therm. Altit. 49.
 — repid. 4. 44. S S V V 2.

Iidem, qui in precedente Mense, Morbi, ac severiores: (A) Tussis convulsiva frequentes inter Pueros.

M A R T I O.

Incerta fuit durante Martio Tempestas; nunc nimbofa, sæpe tranquilla, Vento variante sæpissimè, plerumque vero è Septentrione. Initio & paulo ante Finem Barometri Statio erat satis alta, Aerque ficcus & purus; medio autem Mense, eoque desinente, concidebat Mercurius & Pluvia multa.

Pluvia $\frac{1}{1}$. 2. 5. 6. 7. 9. $\frac{11}{12}$. 13. $\frac{11}{14}$. $\frac{11}{18}$.

$\frac{11}{27}$. $\frac{11}{28}$ — $\frac{11}{31}$. Nix. 10. $\frac{11}{11}$. — 3. 174. Dig. Dec.

H 2

Fulgur

Fulgur & Tonitru 28. p.m. Procella 2. Nocte,
w N w — gravis 29. mane, S E 4^x.

$\begin{array}{l} \text{Altitud. maxim. 4. 30. 2. Malacia.} \\ \text{— — — minim. 30. 28. 8. E S E 3^x.} \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} \text{Altitud. maxim. 4. 30. 2. Malacia.} \\ \text{— — — minim. 30. 28. 8. E S E 3^x.} \end{array}} \right\} \text{media } 29. 6\frac{1}{30}$
 Dies frigid. 21. 64. N b VV 1. rigid. Gelu. } media Therm.
 — tepid. 20. 43. Malacia. } Altitud. 49 $\frac{26}{30}$

Tusses & Gravedines adhuc: Pleuritides, Rheu-
matismi, Peripneumonix, præcipuè verò nothæ,
sæviunt passim: *Variolæ Sporadicæ*.

A P R I L I.

Barometer haud fuit elatus per totum Aprilem,
quamvis Aquilo spiravit nonnunquam, ac Ma-
lacia interfuit sæpe: Medio & Fine Mensis Aer
liquidus erat & valde ficcus: à decimo octa-
vo ad vigesimum quartum humidus, perflan-
te Austro.

Pluvia $\frac{6}{1}$ $\frac{11}{3}$ 7. 10. $\frac{61}{15}$ $\frac{6}{18}$ $\frac{21}{19}$ $\frac{6}{20}$ 21.
 $\frac{11}{22}$ Dig. Dec.
 22. 23. 25. 27. = 2. 196.

$\begin{array}{l} \text{Altitud. maxim. 28. 29. 7. N 1.} \\ \text{— — — minim. 25. 29. 2. S b VV 3.} \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} \text{Altitud. maxim. 28. 29. 7. N 1.} \\ \text{— — — minim. 25. 29. 2. S b VV 3.} \end{array}} \right\} \text{media } 29. 4\frac{16}{29}$
 Dies frigid. 16. 53. Malacia. } media Therm. Altitud. 44 $\frac{1}{2}$
 — tepid. 27. 38. E S E 1. }

Idem usque regnant Morbi: *Variolæ* in Vici-
nia epidemicæ.

M A I O.

Subfrigida fuit *Atmosfera* hoc Mense, à de-
cimo sexto ad vicesimum secundum sicca valde
& fuda:

1732)

Constitutio Aeris, &c.

71

& fuda: Ventus tamen ex Plagis australibus *Baroscopium* depresso.

Pluvia 1. $\frac{11}{3}$. $\frac{11}{5}$. $\frac{1}{8}$. — $\frac{1}{12}$. 22. $\frac{11}{23}$. $\frac{1}{25}$. $\frac{11}{26}$.
Dig. Dec.

— 28. 30. = 2. 424.

8 Altitud. maxim. 21. 29. 7. N V V 1. } media 29. $4\frac{20}{54}$
— minim. 27. 28. 8. S S V V 3. }
Dies frigid. 21. 50. N V V 1. } media Therm. Altit. $40\frac{16}{31}$
— tepid. 16. 36. Malacia: }

Cholera Morbus passim; *Diarrhææ* frequentes;
Ferox Tussis plures cruciat Infantes ac Pueros,
eosque sæpe in Spasmos adigit.

J U N I O.

Ab Initio Junii ad Diem usque decimum octavum vix ulla Pluvia, Aer interim fuit maximè siccus & purus admodum, ac sæpe frigidulus. A Die quinto ad duodecimum Eurus, aut Malacia: à decimo nono ad vigesimum secundum gravis Pluvia, Zephyro flante; Septentrio autem post *Barometrum* crexit. Per magna Roratio hoc Mense, sub Finem præsertim.

Pluvia 17. $\frac{1}{19}$. $\frac{1111}{20}$. $\frac{11}{22}$. 24. = 1. 270. Dig. Dec.

8 Altitud. maxim. 26. 30. 0. N N V V 1. } media 29. $6\frac{3}{12}$
— minim. 10. 29. 2. Malacia: }
Dies frigid: 2. 40. N V V 1. } media Therm. Altit. $31\frac{12}{29}$
— calid. 28. 26. N. 1. }

Febres *miliares* compositæ & *Rubeolæ* passim.

H 3

JULIO

J U L I O.

Ad Principium & sub Julii Finem Aer fuit valde ficcus; Ventus enim è Septentrione spiravit, sed lenis admodum: ab octavo autem ad decimum quartum Pluvia multa, flante Noto. Frequens currente mense Malacia & Ros plurimus.

Pluvia 8. $\frac{1111}{9}$. — $\frac{11}{11}$. — $\frac{111}{13}$. — $\frac{0}{14}$. 22. $\frac{1}{27}$. 28.
 Dig. Dec.
 = 2. 288.

8 Altitud. maxim. 1. 29. 8. Malacia. } media 29. $5\frac{13}{31}$
 ——— minim. 12. 29. 0. S S E 2. }
 Dies frigid. 14. 38. S S V V 1. } media Therm. Altit. $29\frac{19}{31}$
 — calid. 31. 24. N N V V 1. }

Tempestas maximè salubris.

A U G U S T O.

Ineunte & exeunte Augusto Ventus ab Oriente *Atmosphæram* ficcavit plurimum; inter nonum & vicesimum sextum varius fuit, nunc scilicet ad Austrum, nunc ad Septentrionem. Parum admodum Pluviæ hoc Mense decidit, at immensa Vis Roris.

$\frac{1}{1}$ Dig. Dec.
 Pluvia 9. — 12. 19. 23. = 0. 362.

8 Altitud. maxima 30. 29. 9. E b N 2. } media 29. $5\frac{16}{30}$
 ——— minim. 12. 29. 2. S 2. }
 Dies frigid. 31. 38. E b N 1. } media Therm. Altit. $28\frac{22}{30}$
 — calid. 29. 23. S 2. }

Diarrhœa

1732.)

Constitutio Aeris, &c.

73

Diarrhææ frequentes : *Febres intermittentes* passim.

Morbilli jam ingruunt, *Fine* nimirum *Mensis*.
Tusles plures jam vexant *Equos*.

S E P T E M B R I.

Diem adusque decimum *Septembris* *Mercurii* Statio fuerat sublimis, *Boreas* interim ocys affans *Atmosphæram* reddiderat maximè puram: à decimo autem ad vicesimum quintum *Libs*, aut *Caurus*, multa cum *Pluvia*; inde *Eurus*.

Pluvia ^{III} 11. ^{III} 12. — ^I 15. ^{IIII} 17. 18. 19. 21. 23.

^{III} Dig. Det.

27. = 3.050.

Procella 26. Nocte, E S E. *Tonitru* Nocte 12. S W 1.

8 Altitud. maxim. 2. 30. 1. N E 2. } media 29.6.
— minim. 13. 29. 0. V V N V V 2. }
Dies frigid. 30. 45. E 3. } media Therm. Altitud. 35.
— tepid. 10. 29. S V V 2. }

Morbilli epidemici. — *Angina tussiens* undique inter *Equos* (dicta the *Strangles*) quæ plurimos suffocat prorsus.

O C T O B R I.

Gravissima sæpe & perpetua fere *Pluvia* decedit mense *Octobri*, nimbis ab *Austro* unà furentibus; plurimum etiam subsedit *Baroscopium*: id verò sub *Finem* erexit *Ventus aquilonius*, Aeremque siccavit.

H 4

Pluvia

Pluvia ^{II} 2. — ^{III} 5. ^{III} 7. — ^{II} 9. ^{III} 11. ^I 12. ^{II} 14. — ^{II} 16. 17.
^{III} 19. ^{III} 20. ^I 21. — ^{III} 23. ^I 24. — ^I 26. ^{II} 28. = 6. 342.
 Dig. Dec.

Procella 14. p. m. Fulgur & Tonitru 22. mane.
 S b E 2.

8 Altitud. maxim. 30. 29. 8. NNE r. } media 29. $2\frac{26}{29}$
 ——— minim. 14. 28. 7. S VV 4x. }
 Dies frigid. 31. 52. E b N 1. } media Therm. Altit. $3\frac{5}{29}$
 — tepid. 1. 34. E 1.

Tusses, Coryzæ & Morbilli maximè epidemici
 Jam morbus Equorum sævit maximè.

NOVEMBERI.

Aer fuit valde ficcus & tenuis, Ventusque ab Oriente, aut Septentrione, toto Novembri,isque à sexto Die ad decimum furibundus: à vicesimo ad Finem usque omni mane permagna Pruina & Gelu, dum lenis Aquilo spirabat.

Pluvia ^I 1. ^I 2. ^I 10. — ^I 12. ^I 16. — ^I 18. ^I 19. ^I 30.
 Dig. Dec.
 = 0. 584.

Turbo aquilonalis 6. H. 9. nocturna.

8 Altitud. maxim. 25. 30. 4. NE b N 1. } media 29. 9.
 ——— minim. 12. 29. 4. E S E 1. }
 Dies frigid. 29. 63. NE 1. } media Therm. Altit. $55\frac{18}{30}$
 — tepid. 1. 48. E b S 1. }

Morbilli adhuc, & Morbus epidemicus inter Equos.

D E C E M B R I.

Perstitit usque ad decimum Ventus aquilinus, hinc Subsolanus: à decimo sexto ad Finem usque Libs, aut Auster, permulta ruente Pluvia, ac subsidente plurimum *Mercurio*. *Atmosfera* Initio valde sicca erat & frigida rigido cum Gelu; à decimo sexto autem tepida, nebulosa & humida.

Pluvia	4.	$\frac{9}{13}$.	$\frac{1}{16}$.	18.	$\frac{111}{19}$.	$\frac{111}{20}$.	$\frac{1}{22}$.	$\frac{1}{23}$.
					Dig. Dec.			
24.	$\frac{111}{25}$.	$\frac{11}{26}$.	$\frac{1}{27}$.	$\frac{11}{29}$.	30.	31.	= 4.918.	
Fulgura	20.	21.	Nocte.	Procella	29.	Nocte		
S	4 ^x .	Nix	10.	E b N	1.			

8	Altitud. maxim.	2.	30.	2.	N E 1.	} media' 29. $5\frac{20}{28}$
		minim. 31. 28. 8. S VV 2.				
Dies	frigid.	8.	66.	N E 2.	} media Therm. Altitud. $54\frac{13}{28}$	
		— tepid. 25. 44. S 1.				

Tusses, Gravedines, Anginæ, valde frequentes. Lues equina adhuc grassatur, sed immutata valde est.

Tota Quantitas Pluviæ, Anno MDCCXXXII.
Dig. Dec.
= 33.096.

De Pertussi Puerorum.

(A) Ingens adfert Solamen (inquit *Syndeham*)
Venæ Sectio *Pertussi* Infantum, in qua Remedia
quælibet, Pectori dicata, longo post se linquit
Inter-

Intervallo : Idem hoc sentit *Harris* de Morb. acut. Infant. — Oleosa utique & mucosa Medicamenta damno prorsus ; quippe quæ Morbum augent, non abigunt certè : iis utcunque Praxis vulgata utatur.

Quæ mihi adeò magis esse ex Ufu, longa probavi Experientia, sequuntur. — Sive evidens *Plethora* adsit, sive Sputum Sanguine tinctum, Venæ Sectionem præcipio semper ; idque præcipuè, si Febricula, quod sæpe fit, urget, aut Vultus inter tussendum fere nigrescit : hanc insuper repeto nonnunquam, pro Ratione scilicet Virium & Ætatis. Mox levem moveo Vomitus Syrup. Flor. Persicor. Oxymel. Scillitic. Infus. aut Decoct. Ipecacuanhæ. — Tussis enim, partim saltem, est à Stomacho, ut monuit olim *Waldschmidt* ; nam vix unquam cessat Tussis convulsivæ Paroxysmus antequam irritans Pituita tenax Vomitu rejicitur : imò tanta sæpe est Illuviei Copia, ut Vomitionem terve, quaterve, proritare necesse sit.

Solvenda porro subinde est Alvus, at lenibus tantum utendum est *Catharticis*, nempe *Rhabarbaro*, *Mercurio alkalizato*, *Calomelane*. Proluvies namque mucosa hoc modo expurgatur, adeoque nec *Chylum* inquinat, nec, Vasa Lactea subeundo, Sanguinem. Nocet utique astricta nimium Alvus : nam Febriculam infert, aut Dyspnoeam aggravat maximè. — Nec solum Evacuantibus opus est, exhibenda sunt etiam quæ & Nervos & Stomachum confirmare valent, ac Lentorem Sanguinis attenuare. Hoc Opus absolvent optimè *Mercurialia*, & *Cortex Peruvianus*, *Stomachicis* idoneis adjectis. Spiritus interea Difficultas & Pectoris Oppressio Solutionem Gum. Ammo-

Ammoniac. Expressionem Milleped. aut tale quid desiderant sæpe; Vehementiam autem Tussis interdum compescere licet Elix. Asthmat. le Mort. è Syrup. Diacod. quod quidem est optimum, ac tutissimum, in hoc morbo *Anodynum*. Atqui si humor acris admodum in Laryngem, aut Pulmones, destillat, eum oportet avocare admoto Cervicibus *Epispastico*.

His cedit Remediis facile hic Morbus, alias sæpe contumax admodum; nec nisi Tempore & Mutatione Coeli fugandus: decantata sanè Muliercularum *Specificæ* (quantum ego unquam observavi) meræ sunt Quisquiliæ: imò Muscus pyxidatus, modò si quid valeat, propter Vim astringentem, adeoque corroborantem, & ad Naturam Corticis Peruviani aliquanto accedentem, valet. Nobile namque hoc Indiæ *Pharmacum* non solum leptos attenuat Humores, sed & totum *Systema* Fibrarum confirmat; atque sic utraque Facultate agendo Febres intermittentes discutit. — Atqui periodica hujus *Pertussis* Accessio, haud minus certa sæpe quàm vel Intermittentium Paroxysmus, non multum abesse ab earum Indole hunc Morbum indicat: hoc magis etiam probabile videtur, quod uterque Morbus, eadem plerumque Tempestate, grassatur, ab eadem propè Causa pendet, & iisdem fere curatur Remediis.

CONSTITUTIO AERIS, &c.

Anno MDCCXXXIII.

JANUARIUS.

INGREDIENTE Anno Pluvia frequens *Atmosphæram* humidavit, Vapores autem paulò post Ventus ab Oriente discussit, à decimo sexto ad vicesimum quintum durans, surgente *Barometro*. Per paululum hoc Mense Gelu, imò exeunte eo Aer erat valdè nebulosus & pro Ani Tempore tepidus.

Pluvia 1. — $\frac{11}{4}$. 5. $\frac{21}{7}$. $\frac{111}{8}$. $\frac{1}{9}$. 15. $\frac{111}{22}$. $\frac{111}{29}$. 30.
Dig. Dec.

§ 1. = 2. 384.

Procella 7. Nocte. S. Gelu 14. N w 1. — 21.
E N E 2.

8 Altitud. maxim. 24. 30. 2. E 1. } media 29. $7\frac{20}{31}$
—— minim. 8. 29. 3. S VV 3. }
Dies frigid. 21. 62. E N E 2. } media Therm. Altitud. $51\frac{25}{31}$
— tepid. 28. 47. S 1. }

Tusses, Coryzæ, Morbilli frequentissimi.

FEBRUAR-

F E B R U A R I O.

Flavit ab Occidente Ventus toto Februario, ad Austrum vergens subinde, non rarò etiam ad Septentriones: Aer intereà fuit humidus & algidus, at non æquè crassus ac elapso Mense.

Pluvia $\frac{1}{1}$. — $\frac{1}{4}$. — $\frac{1}{6}$. $\frac{1}{7}$. 8. $\frac{1}{11}$. 14. 17. — $\frac{1}{20}$. $\frac{1}{22}$.
 Dig. Dec.
 $\frac{1}{24}$. — $\frac{1}{28}$. = 3.734.

Procella 1. Nocte. S w. Levis AB. 2. H. 10.
 NN w 1.

Altitud. maxim. 15. 30. 0. NN VV 1. } media 29. $6\frac{12}{26}$
 ——— minim. 4. 29. 2. S VV 2. }
 Dies frigid. 10. 60. N VV 1. Gelu & maxima Pruina. } media
 — tepid. 7. 49. S S VV 2. ——— Therm. }
 ——— Altitud. } $53\frac{12}{26}$

Morbilli plures Infantes Puerosque peremerunt; declinante nempe Morbo, quasi Peripneumonia suffocatos: nihil profuit fere nisi tempestiva Sanguinis Missio.

Hoc Tempore hanc Regionem infestavit Morbus, omnium quotquot ego saltem memini antehac maximè *epidemicus*; omnes pervasit Domos, Pauperum Tabernas Regumque Turres: vix unus, aut alter, Rure, vel in Urbe, Senex, aut Puer, robustus, aut infirmus evasit. — Quandoquidem ergo tanta fuit ejus in omnes Vis (idque profectò citius, tardiusve, per magnam Terrarum Partem) è Re fore duxi accuratam Morbi, prout hic se habuit, Historiam Scriptis mandare.

Ab

Ab ipso Initio Februarii, & in Cornubia, & in Damnonia citeriore, sævierat Morbus hic *epidemicus*; nos tamen Plymuthi ante iv. Iduum Februarii vix attigit: quo Die, nempe Saturni, plurimi subitò quasi correpti erant, postridie innumeri, ad xv. kalend. Martii omnes undique.

A levi incepit Horrore Morbus, cui mox accessere vagi & incerti Calores, Gravedo, magna ac importuna valde Sternutamenta; Dolor tunc Dorsi & Artuum errans, ac Pectoris sæpe, at non consistens, gravissimam verò propter Tussim non rarò valdè molestus: Tussi intereà & Sternutatione immensa Vis Muci tenuis & acris ejecta fuit. Hæc quasi à Frigore (ut dicitur) recens suscepto; paulò post tamen Febris aliqua, interdum haud exigua, secuta est, Pulsusque velox, nequaquam verò, ut Pleuriticorum, durus & tensus; neque erat Urina valde rufa, sed crassa, ac plerumque subalbida: Lingua non arida, sed plurimo albescente mucro obducta fuit. Omnibus fere aderat Insomnia, Vertigo insuper, aut atrox Capitis Dolor angebat plurimos, levi nonnumquam comitante Delirio. Tinnitus Aurium quamplurimis molestus fuit, multisque in Meatu auditorio Dolor acutus, in Abscessum aliquando desinens; Aspretudo tamen & Faucium Apostemata frequentius enata sunt. Omnes penè ad Sudores fuere valde proclives; qui multi, faciles, continui, intra Biduum, aut Triduum, erumpentes Febrem fere discusserunt prorsus, Urina plurima, subalbida, aut subflava, deponente Sedimenta; lateritia verò rarò admodum: plurimis autem, an ob profusos Sudores, an ob *Epispastica*, nil statuo, fuit valde difficilis.

Alvus.

Alvus biliosa Morbum sæpissimè absolvit: haud rarò Pustularum urentium Eruptio.

En Morbi hujus *epidemic*i, ut hìc sæviit, Descriptio! Cui quidem licet omnes fermè succubere paululùm, Letho tamen (si numerum spectes) paucissimi, quos inter Infantes præcipuè, ac Senes pulmonarii.

Abiit plerumque vel intra Quatriduum perbreve, manente solum infesta Tussi, eaque sæpe diuturna valde, cum majore Virium Dejectione quàm quis, pro Ratione Valetudinis, crediderit: idque præsertim, ubi intempestiva Sanguinis Missio præcesserat.

Illos potissimùm Venæ Sectio adjuvit, quos Pectoris Dolor, aut Gravitas, oppresserat; idque ingruente, non sanè declinante, Febre: Omnium penè sanguis albida quadam Pellicula contactus fuit, haud tamen valde glutinosa; nisi, ubi, ob Missionem Sanguinis diutiùs neglectam, in Pleuritidem, aut Peripneumoniam, Febris abierat; quod quidem haud paucis contigit, ex nimio præsertim *Volatilium*, & *Cardiacorum* Usu.

Nausea, aut Vomitus urgens, lene postulabat *Emeticum*, quòd & Stomachi Aegritudinem & Pectoris Oppressionem levabat maximè. Sudores exprimebat insuper; ad quos promovendos Potus multus, tepidus, diluens, etsi Sitis non admodùm urgebat, erat necessarius omninò: quippe sine Sudore vix unquam lætus hujus Morbi exitus. Serum vinosum dilutius fuit instar omnium, tepidè epotum; quod utique tanto erat in Usu, ut vix satis suppeteret Lactis ad id conficiendum.

Perutilia fuere, nec omittenda, *Vesicatoria*, pone Aures ac inter Scapulas admota; Dolori Capitis

Capitis enim atque Tumori & Asperitati Fau-
cium certissimum tulerunt Levamen: quinetiam
nimiam in Pulmones Destillationem, Cursum
scilicet acris Colluviei avertendo, prohibuerunt:
——Me adhortante, pro Remediis fuere ma-
ximè Lap. Contrayerv. Spirit. Volat. Oleos. Sp.
C. C.—Lavend. C. Elixir. Asthmat. le Mortii,
& Potiones ex Spermat. Ceti solut. cum larga
Potione Decocti cujusdam pectoralis tenuis, aut
Seri Lactis dilutissimi: quæ & percommode
simul Tussim lenibant, ac Sudores eliciebant
optimè. Ubi verò, post Sanguinis emissionem,
Respiratio gravior & Excretio difficilis preme-
bant, Solutio Gummi Ammoniaci cum Oxy-
melite Scillitico fuit necessaria prorsus: jam
enim instar Peripneumoniæ nothæ urgebat Mor-
bus, & eandem omninò Postulabat medendi
Methodum; Pectoralia nempe maximè inci-
dencia, & Tibiis *Epispastica*; *Emetica* nonnun-
quam, aut lenia *Cathartica*.

Furebat Tussis per totum Morbi Impetum;
sæpe adeò vehementer utique, ut eam *Anodynis*
cohibere fuisset difficile satis: imò usque adeò
interdum perduravit post Febrem abactam, ut
haud paucos, post unum alterumve Mensem,
in Tabem lethalem abriperet; illos præcipuè,
quibus fuerat olim ex Pulmonum Infirmitate
Valetudo minùs prospera. Cum verò notaverim
frequenter, quòd Tussis, oborta *Dyarrhæa*, pro-
fligata esset, *Eccoprotica* ex Rhabarbaro, Manna,
Tartaro solubili, &c. exhibui subinde, facessente
Febre; oprato (quod solet) Eventu, Duce Na-
tura: quæ porrò Cibi Appetentiam, toto Morbi
Tempore prostratam valde, brevi restituebant.

1733)

Constitutio Aeris, &c.

83

Morbus fuit herclè, ni ex admissio gravi Errore, rarò lethalis, quem tamen multi, vel ob ipsam ejus Frequentiam, temerè spernentes, feras dedere Poenas Stultitiæ, asthmatici, hectici, tabidi.

M A R T I O.

Januario & Februario tepidiore, successit Martius per Initia paulò frigidior; Ventus quippe ex Plagis arctois spiravit, surgente Barometro: post verò frequens Vulturus *Mercurium* demisit, multamque Pluviam. Ab octavo ad vigesimum secundum Aer satis ficcus fuit & tenuis, inde multo humidior.

Pluvia 1. ¹7. ¹8. 14.—¹¹¹16. 17. ¹¹23.—¹¹25.—¹¹27.

Dig. Dec.

¹28. Nix 10. ¹21. Grando 9. 19.—3.098.

Levis AB. 21. 10. p. m. N W 1. Gelu rigidum 10. 11.

Altitud. maxim. 3. 30. 2. N N VV 1. } media 29. $4\frac{2}{28}$
 ——— minim. 21. 28. 9. S E 3. }
 Dies frigid. 10. 62. N b E 1. } media Therm. Altit. $52\frac{23}{28}$
 — tepid. 28. 44. E S E 2. }

Incipiente Mense Febris *catarrhalis* undique maximè *epidemica*, quæ & adhuc perdurat; jamque etiam Pleuritides, Peripneumoniæ, & veræ, & nothæ, Anginæ quoque frequentes.

A P R I L I.

Ventus ab Oriente; ad Septentrionem verò sæpe deflectens, toto Aprili prævaluit, unde Aer
 I ficcus

ficcus & frigidulus evasit; sub Finem præsertim: Malacia tamen subinde & Nebulæ aliquando intervenire.

Pluvia $\frac{ii}{8}$. $\frac{iii}{13}$. $\frac{i}{15}$. $\frac{iii}{17}$. $\frac{i}{18}$. $\frac{iii}{22}$. = 2. 284. Dig. Dec.

§ Altitud. maxim. 19. 30. 0. Malacia. } media 29. 6.
 ——— minim. 13. 29. 1. S E 1.

Dies frigid. 27. 50. N E 3. } media Therm. Altit. $42\frac{26}{30}$
 — tepid. 22. 38. Malacia. }

Febris *epidemica* adhuc passim Rure; multique nunc tabescunt ex malè iudicata Febre. Peripneumonia & Pleuritide multi corripuntur.

M A I O.

Hoc Mense mediam plerumque Stationem tenuit *Baroscopium*, flante fere quotidie Subsolano; *Atmosfera* maximè sicca fuit & tenuis; à duodecimo ne vel Guttula Pluviæ, at Ros plurimus & Malacia frequens.

Pluvia $\frac{iii}{6}$. $\frac{ii}{8}$. $\frac{i}{10}$. $\frac{i}{11}$. $\frac{i}{12}$. = 1. 010. Dig. Dec.

§ Altitud. maxim. 22. 29. 8. E 1. } media 29. $5\frac{10}{27}$
 ——— minim. 7. 29. 2. Malacia. }

Dies frigid. 5. 46. E 2. } media Therm. Altit. $37\frac{10}{27}$
 — tepid. 30. 28. Malacia. }

Febres pulmonariæ, ac intermittentes, invadunt plures. Haud pauci modò Phthifici mortui sunt, rupto interdum Pulmonis Apostemate; illi præcipuè, qui ex Febre *catarrhali* in Tabem inciderant, & quibus etiam inde Tumor Pedum aquosus accesserat.

JUNIO.

J U N I O.

Venti fuerunt mutabiles durante Junio, sæpe ex Oriente, sed ab Occidente sæpius ad Austrum plerumque vergentes: intervenit haud rarò Malacia. Initio Aer erat ficcus; Fine & ficcus & calidus. Maxima Roratio sæpe.

Pluvia $\frac{11}{5}$. $\frac{1}{8}$. 9. $\frac{1}{13}$. 15. — $\frac{1}{19}$. $\frac{1}{20}$. 25. = 1. 534
 Maxima AB. media nocte 27. W N W 1. Fulgura 12. nocte. Tonitru 26.

Altitud. maxim. 22. 29. S. Malacia. } media 29. $4\frac{28}{30}$
 ——— minim. 18. 28. 8. S b VV 3. }
 Dies frigid. 21. 36. VV 2. } media Therm. Altit. $28\frac{26}{39}$
 — calid. 27. 24. VV 1. }

Febres remittentes & intermittentes adhuc, jam sæpe cum Pustulis rubellis.

J U L I O.

Toto fere Julio Aer fuit valde ficcus & fervidus, paucæ Pluviæ, Rorationes autem maximæ, Ventus Australis rarò, Corus & Aquilo sæpè: nihilominus, Statio Baroscopii erat ut plurimum humilis.

Pluvia 14. $\frac{1}{15}$. $\frac{1}{16}$. 21. $\frac{1}{28}$. 30. 31. Grando
 $\frac{1}{16}$ Dig. Dec. = 0. 772.

Magna AB. 10. 10. p. m. N W 1. Tonitru 16. p. m. S S E 2. — 28. p. m. N N W 1.

Altitud. maxim. 1. 29. 7. N N E 1. } media 29. $4\frac{6}{26}$
 ——— minim. 29. 29. 0. N b VV 1. }
 1 2 Dies

Dies frigid. 31. 34. N VV 1. } media Therm. Altit. $24\frac{8}{26}$
 — fervid. 9. 16. N VV 1. }

Febres intermittentes sparsim : Cholera & *Diarrhœa* frequens. Mulieres plurimæ immenso mensium Profluvio laborant. Omnes fere de Languoribus ob Æstum enormem undique conqueruntur.

AUGUSTO.

Perpetuus spiravit ab Occidente Ventus ; ad Meridiem sæpe deflectens , crebrò etiam ad Septentrionem. Priore Mensis Parte Pluvia, Tonitru, Fulgura frequentia, eaque gravissima, Sudo tamen subinde intercurrente.

Pluvia / 1. $\frac{11}{3}$. $\frac{11}{4}$. $\frac{11}{6}$. $\frac{11}{7}$. $\frac{11}{10}$. — $\frac{11}{12}$. 16. $\frac{11}{17}$. 18.
 — Dig. Dec.
 21. 24. 27. — 29. 31. = 4. 500.

Fulgur & Tonitru vehemens 3. 6. 7. 10. vesp. Procella 17. nocte. S w.

8 Altitud. maxim. 24. 29. 9. N N VV 1. } media 29. $4\frac{22}{30}$
 — minim. 7. 29. 0. S S VV 1. }
 Dies frigid. 24. 43. N N VV 1. } media Therm. Altitud. 33.
 — calid. 5. 24. S VV 1. }

Perpauci Morbi : aliqui *Diarrhœa* & Cholera Morbo corripiuntur.

SEPTEMBRI.

Varia fuit Tempestas Ventusque varius hoc Mense, à nono tamen ad Diem decimum octavum ab Oriente, ad Austrum declinando plerumque. *Atmosphæra* erat sicca, & Statio barometrica

1733)

Constitutio Aeris, &c.

187

metrica altior ut plurimum quàm elapso Augusto: Maximæ & crebræ Rorationes.

Pluvia $\frac{1}{1}$. $\frac{1}{2}$. 3. $\frac{11}{5}$. 11. 12. $\frac{11}{13}$. 14. 21. 24.

Dig. Dec.

$\frac{11}{25}$. 26. 28. 30. = 1.978.

Magna AB 8. 10. p. m. N N W 1. — levis
29. H. 9. w N W 1.

Fulgur & Tonitru 12. & 13. a. m. Fulgura
nocte 26.

Altitud. maxim. 19. 30. 1. Malacia.

— minim. 26. 29. 0. S V V b V V 2. } media 29. $6\frac{2}{29}$

Dies frigid. 30. 49. N N E 1.

— tepid. 5. 33. S V V 2. } media Therm. Altit. $37\frac{20}{29}$

Tusses & Catarrhi valde frequentes. Ad Finem Mensis Cholerae & Diarrhaeæ sæviunt.

O C T O B R I,

Eurus & Aquilo hoc Mense sæpe affiantes
Barometrum extulerunt multum, Temperiemque
Aeris siccam & frigidam reddidere, etsi haud
rarò intervenit nebula. Per Initia Mensis Ros
plurimus.

Pluvia $\frac{11}{1}$. — $\frac{11}{2}$. $\frac{11}{11}$. 23. — $\frac{11}{25}$. 27. — $\frac{11}{29}$. = 2.026. Dig. Dec.

Magna AB. 27. 9. w N W 1. Per magnæ
Pruinæ 15. 16. N N E 1. Glacies 31. N N E 1.

Altitud. maxim. 18. 30. 2. E 1.

— minim. 25. 28. S V V 3. } media 29. $7\frac{1}{3}$

Dies frigid. 31. 60. N N E 1.

— tepid. 3. 37. S S V V 1. } media Therm. Altitud. $46\frac{24}{31}$

Cholera & Diarrhoea adhuc. Eruptio pustulosa *Scorbutica* frequens sine Febre. Apoplexiæ passim: sævæ aliquæ Febres peripneumonicae, *Rubeolæ* & Morbi colici plurimi.

N O V E M B R I.

Ex Occasu plerumque Ventus spiravit Novembri, at sæpe ad Septentrionem deflexit, quamvis Aer erat solito magis tepidus; sub Finem valde crassus & humidus.

Pluvia 7. 9. $\frac{1}{10}$. $\frac{11}{11}$. $\frac{1}{12}$. 14. 15. 17. 20.
Dig. Dec.
21. $\frac{1}{26}$. 28. — 30. = 1.882.

Magna AB. 27. H. 2. matutina. N w 1. —
29. 10. N w 1. Procella 20. nocte. S. 4.

8 Altitud. maxim. 1. 30. 2. N N VV 1. } media 29. $7\frac{25}{28}$
— minim. 11. 29. 1. S VV 3. }
Dies frigid. 5. 58. Glacies } media Therm. Altit. $48\frac{22}{28}$
— tepid. 15. 44. S 2.

Rubeolæ adhuc frequentes: Febres aliquæ pulmonariæ, Morbus colicus passim.

D E C E M B R I.

Hic Mensis fuit nimbosus maximè, continua fere Procella eaque sæpe gravissima, a Die nono vicesimum tertium adusque perduravit, Africo furente, dum Pluviæ corruerunt plurimæ, & horrida nonnumquam Fulmina. Ineunte quidem Decembri apricitas aliqua effulsit cum tenui Glacie, Aer autem erat valde crassus; quintus utique Dies fuit valde nebulosus & caliginosus maximè:

1733.)

Constitutio Aeris, &c.

89.

maximè: Immensa forte Vaporis Copia Barometrum sustinuit partim, quod perpetuæ Procellæ aliter multo magis depresserint.

	<u>1</u>	<u>21</u>	<u>1</u>	<u>111</u>	<u>116</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	
Pluvia	1.	2.	9.	11.	12.	13.	— 15.	— 16.
								17.
	<u>1</u>	<u>11</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>11</u>	<u>1</u>		Dig. Dec.
	20.	— 22.	23.	— 25.	26.	— 29.	30.	31.
								4. 688.

Graves Procellæ 11. 12. 14. 16. 22. 23. 26.

Maximi Maris Æstus à 12. ad 14.

Fulgur & Tonitrua gravissima cum vehemente Grandine 12.

———— diu durantia 16. S VV b VV 4.

} Altitud. maxim. 6. 30. 1. N N VV 1.	} media 29. $5\frac{26}{32}$
} Dies frigid. 7. 62. E 1.	} media Therm. Altitud. $40\frac{22}{32}$

Incipiente Mense Morbi colici, & Peripneumonix nothæ cum Affectibus nervosis passim: Tusses & Gravedines frequentes valde sub Finem Mensis: Paroxyismi quoque multi hypochondriaci & hysterici.

Dig. Dec.

Tota Quantitas Pluvix hoc Anno = 29. 884.

CONSTITUTIO AERIS, &c.

Anno MDCCXXXIV.

JANUARI O.

POST nubila Phœbus ! novo quippe cum Anno multo lætior surgit Cœli Facies; Boreas nempe paulo post Initium Januarii oriens Vapores dispersit & Nubes, rigido accedente Gelu Cœloque sereno: Aeris autem Temperies longè magis tepida fiebat exeunte Mense.

Pluvia 1. $\frac{11}{2}$. 8. 16. $\frac{11}{22}$. Nix & Grando
Dig. Dec.

4. 5. = 1.480.

Procella 2. w S w. Fulgur & Tonitru cum
multa Grandine 22. mane.

⌘ Altitud. maxim. 29. 30. 4. Eb N 1. } media 29. $9\frac{16}{29}$
——— minim. 3. 29. 4. VV 2. }
Dies frigid. 14. 71. E N E 1. } media Therm. Altit. $60\frac{4}{29}$
— tepid. 26. 54. N VV 1. }

Gravedines ; Tussesque frequentes : Morbi
colici plurimi : Peripneumonix passim.

FEBRUAR

F E B R U A R I O.

In alta perstitit Statione *Baroscopium* Diem ad usque undecimum Februarii, flante Cauro; à decimo quinto ad decimum octavum Procella perpetua, imò sæpe violenta maximè: ab Occidente Ventus turbineus iterum vicesimo quarto & quinto, immensa quoque Vis Pluviæ tunc decidit, maximèque subsedit *Mercurius*. Nisi ipso Mensis Initio vix ulla Glacies.

				<u>iii</u>		<u>iiii</u>	<u>iii</u>	<u>ii</u>	<u>i</u>
Pluvia	2.	3.	4.	12.	13.	— 15.	16.	17.	18.
	<u>iii</u>	<u>i</u>	<u>iiii</u>	<u>iiii</u>					
	19.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	— 5.	554.
Fulgura cum Grandine	17. nocte.						w N w. 2.		

8	Altitud. maxim.	1.	30.	4.	NE	1.	}	media	29.	$6\frac{16}{26}$
	minim.	24.	28.	5.	S b	E 4.				
	Dies frigid.	1.	62.	Gelu.			}	media	Therm.	Altitud.
	— tepid.	12.	50.	S VV	2.					

Incipiente mense Morbi *peripneumonici*; procedente Anginæ, Coryzæ, Tusles plurimæ.

M A R T I O.

Ventus quoque occidentalis toto duravit Martio, majore ex Parte vergens ad Austrum, unde frequens Pluvia & Aer crassus & humidus; sub Finem ad Septentrionem deflexit paululum.

		<u>i</u>	<u>i</u>		<u>ii</u>	<u>ii</u>	
Pluvia	1.	— 4.	5.	6.	9.	10.	12. — 14.
	<u>i</u>	<u>ii</u>	<u>i</u>	<u>i</u>	<u>ii</u>		
	18.	19.	20.	22.	23.	— 25.	— 28.
							— 2.
Procella	19. nocte.						S 4 ^x .

8 Altitud.

γ Altitud. maxim. 31. 30. 0. VV N VV 1. } media 29. 5.
 ——— minim. 13. 29. 0. S VV b S 2.
 Dies frigid. 15. 56. VV N VV 1. } media Therm. Altit. $48\frac{2}{3}$
 — tepid. 23. 45. VV b S 1.

Tusses, Faucium Tumores, Lippitudines hoc Mense frequentes: multi Rheumatismo correpti, aliqui Peripneumonia, & Paraphrenitide; plures sub Finem Apoplexia.

A P R I L I.

Ne vel Guttula Pluviae Diem adusque decimum octavum; à primo ad duodecimum Corus, inde ad vicesimum tertium Subsolanus, post Libs; medio Mense Aer erat ficeus & tenuis.

Pluvia 18. $\frac{1}{1}$ 19. $\frac{111}{1}$ 20. $\frac{1}{1}$ 22. $\frac{11}{1}$ 23. $\frac{11}{1}$ 25. $\frac{11}{1}$ 26. $\frac{11}{1}$ 27.
 Dig. Dec.
 29. 30. = 2. 126.

γ Altitud. maxim. 12. 30. 0. N N VV 1. } media 29. $6\frac{6}{28}$
 ——— minim. 23. 29. 4. E S E 2.
 Dies frigid. 13. 50. E N E 1. } media Therm. Altit. $43\frac{23}{28}$
 — tepid. 28. 37. VV S VV 2.

Tussis & Tumor Faucium frequens adhuc: Febres intermittentes, nec non Apoplexiæ, haud paucae: Ophthalmiæ passim.

Hoc Mense grassari cepit Febris, quædam (si ita dicam) *anginosa*, furens indies magis magisque. — Quos corripuit, primò Algor invasit, mox incertus Ardor & Cephalalgia, Vomitus protinùs aut Diarrhæa, pauloque post Dolor Faucium acutus & Tumor: hinc Febris haud levis, Languor, Anxietas, ac pectoris Oppressio, accedente

edente sæpe Delirio, aut soporoso Affectu, quorum haud dubia fuere prænuncia Urinæ vel tænes, vel quales Jumentorum turbidæ. —

Felix ille tunc Ægrotus, cui Sudores eruperunt effatim, aut Pustulæ rubræ; si ne hæc quidem, Erysipelatis aliquid: ubi nihil horum, brevi instabat Fatum; nisi opportuna *Diarrhœa*, aut tempestiva Diruptio Apostematis Faucium, aut eniens Parotis, faustè sublevarent.

Morbus hic haud rarò, vel intra sex Dies discussus fuit; sæpe verò diutiùs in hærentem, septimo, octavo, aut nono, Die, erumpentes Pustulæ crySTALLINÆ (miliares dicunt) plurimæ expellebant prorsùs: modo nimirum haud præmaturè recessisset, quod certo sanè fuit Ægrotis Exitio. Idem omninò dicendum est de Papulis rubris, quæ sæpe etiam Statu Morbi apparebant.

Pueros & Juvenes, potissimum invasit Febris, qui Vermes crebrò deiciebant: Seniores rarò decubuerunt. Urina erat rufa plerumque, subrubrum, vel ab ipso Initio, deponens Sedimentum: Lingua verò plurimo muco subflavo fœdata.

Desideravit Febris hæc *epidemica*, quàm primum quis ea correptus erat, Missionem Sanguinis eamque sæpe repetitam; haud rarò utique vehementer urgente Morbo, ad tertiam usque Vicem; etsi Cruor emissus non erat viscidus admodum, interdum floridus satis: Vomitu dein lenem Stomachi Purgationem, continuò *Epispastica* Auribus, Cervicibus, Humeris. Sorbitio tepida, *antiphlogistica*, permulta, erat necessaria prorsùs, levi sæpe interposito *Cardiaco*, nempe ex Lapid. Contrayerv. Croco, Theriac. Andromach. Confect. Fracastorii, Confect. Raleigh. &c. idque

idque præcipuè dum appropinquabat Morbi Status, maximè profectò cum *Exanthemata* evaserint sublivida; quod quidem pessimi Ominis! Gargarismata emollientia, subacida, detergentia, ulceroso Gutturi conducebant maximè, sensim insuper sæpeque deglutita *Mucilagine* ex Semin. Cydoniorum & Psyllii, Syrup. Moror. aut de Rub. Idæis edulcorat. vel Linctu aliquo *anodyno*, Tussi urgente præsertim, quæ fuit sæpissimè permolesta. Ut primùm aspera & squamosa quasi apparuit Cuticula, Purgantia lenia ex Rhabarbaro, &c. cum *Mercurialibus* profuere maximè, perfectamque Sanitatem brevi restituebant.

M A I O.

Ventus ab Occasu, flectens maximè ad Septentrionem, toto fere Mense spiravit, intercurrente nonnunquam Vulturno. *Atmosphæræ* Temperies fuit multo frigidior solito; Statio *Mercurii* utplurimùm demissa.

Pluvia $\frac{2}{1}$. 7. 11. 12. 15. — 18. 21. $\frac{1111}{25}$. 26.

Dig. Dec.

28. — 30. Nix 13. Grando 14. — 1. 764.

Leves AB. 14. 15. N w b N 2. Fulgur & Tonitru 28. p. m.

Altitud. maxim. 10. 29. 9. N 1. } media 29. $4\frac{1}{3}$
 ——— minim. 29. 29. 0. S E 2. }
 Dies frigid. 14. 52. NN VV 2. insolitum Frigus! } med. Ther.
 — tepid. 25. 37. Malacia ———— } Altit. 42.

Tussis convulsiva inter Pueros frequens; Febres intermittentes passim. — Nunc Febris *anginosa* epide-

epidemia sævit maximè : Angina graviùs urget, cui jam frequenter accedunt Aphthæ molestissimæ, & cum fera Tussi Strangulatio fermè, ni frequens subveniat tepida Sorbitio & perpetua fere Gargarizatio.

J U N I O.

Eurus assiduè flavit à sexto fere ad vigesimum ; Initio & Fine Corus : Atmosphæra magis tepida fuit, ac humida, quàm Mense priore ; ambo utique plus fatis nubili.

Pluvia $\frac{1}{2}$. $\frac{111}{6}$. $\frac{1}{8}$. 10. $\frac{1}{11}$. $\frac{111}{14}$. $\frac{11}{15}$. 20. $\frac{1}{21}$.
 $\frac{111}{23}$. $\frac{1}{26}$. Dig. Dec. 29. = 3. 208.

Altitud. maxim. 4. 29. 7. NVV b VV 1. } med. 29. 4 $\frac{12}{29}$
 ——— minim. 24. 29. 1. VV N VV 1. }
 Dies frigid. 10. 40. S E b E 1. } media Therm. Altit. 31 $\frac{16}{29}$
 — calid. 22. 26. Malacia. }

Febres intermittentes adhuc ; *Ophthalmiæ* passim . Morbo jam *epidemico* accedunt Pustulæ fere omnigenæ , atque haud rarò Eruptiones *erysipelatosæ* : minùs verò premuntur Fauces ; Febris quippe jam magis ad exteriora tendit . Die sexto, aut septimo, Cuticula aspera fit & rupta, velut aspersa crassiore Farina ; idque quo magis eo melius ; tandem tota penè desquamatur : ex Pedibus sæpe tantis Portionibus ut Soleam quasi detractam referant hæ Morbi Exuvix . Hic equidem lætissimus est Morbi Exitus : ubi verò *Exanthemata* tardè admodùm & parciùs erumpunt, erupta verò livescunt, maximæ Anxietates, Languores, Deliquia sequuntur ; pauloque

que sæpe pòst Vomitus, aut *Diarrhœa*, enormis, quæ *Ægros* non rarò celeriter rapit.

Hæc Febris, ut omnes fere quas *Pustulæ* comitantur, contagiosa est; plures namque ea correpti in eadem sæpe *Domo* decumbunt. — Quod verò jam *Cutim* magis petat quàm superiore *Mense*, ob majorem *Aeris Calorem* esse arbitror, *Humores* elicientem extrà: medio enim *Mai*o cùm *Atmosphæra*, pro *Anni Tempore*, erat maximè frigida, *Dolor* ac *Faucium Tumor* urgebant gravissimè.

Eadem omninò medendi *Methodus* juvat usque; nunc porrò *Mercurialia*, sine stimulis salinis præparata, aptissimè adjecta sunt: quippe quæ in aliis cutaneis *Eruptionibus* inveniuntur efficacia maximè, quidni & in his utilia sint? Ista utique vel in ipsis *Variolis* prospero sæpissimè *Eventu* exhibui. *Humores* enim lentos nimium attenuant, glutinosa *Vasculorum Repagula* expediunt, *Saliumque Cohæsiones* diffringunt, *Succos* demum morbosos *Fluxos* reddunt, tandemque abigunt prorsus; dumque *Pondere* solùm & *Subtilitate Partium* agunt, *Sanguinem* incendunt minimè.

JULIO.

Prior *Julii* Pars fuit aprica satis, at subfrigida; *Ventus* plerumque à *Septentrione*; medio *Mense* *Libs* intervenit, *Pluvia* ruente; tunc iterum *Septentrio*; à xxv. ad xxviii. pluvius *Vulturius*. *Trigesimo* primo, *Vento* omni momento variante, immensa *Quantitas Pluviæ* decidit; *Cataractæ* ad instar; inter *Horam octavam matutinam* & *Meridiem* ad *Digitum* saltem integrum, licet.

1734)

Constitutio Aeris, &c.

97

licet Milliaribus quindecim ad Orientem vix ulla.
Aer fuit hoc Mense valde humidus & Barometrum humile.

	$\frac{2}{12}$	$\frac{111}{13}$	$\frac{1}{14}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{17}$	$\frac{11}{26}$	$\frac{1}{29}$	$\frac{111}{31}$
Pluvia	12.	13.	14.	16.	17.	26.	29.	31.
Dig. Dec.								
=	2.982.							

8	Altitud. maxim.	5.	29.	8.	N.	1.	}	media	29.	$4\frac{19}{31}$
	minim.	26.	28.	9.	S E	3.				
Dies	frigid.	3.	38.	N	1.	}	media Therm.	Altitud.	30	$\frac{2}{31}$
	calid.	24.	24.	Malacia.						

Febres intermittentes adhuc: Tussis frequentes inter Adultos, *convulsivæ* inter Pueros. Magnæ undique de Spirituum Languoribus Querelæ. — Quamplurimæ Aviculæ, dum Plumas exuunt, moriuntur.

Furit etiamnum Febris *epidemica* inexplicabili quodam Angore quosdam, vel intra sex sæpe Dies, perimens. Hos leve primò corripuit Delirium, quod utique peioris fuit ominis, quàm si, more Bacchantium, aperto exarserant Furore. Nil perinde tunc profuit ac Sanguinis Detractio Cucurbitulis scarificatis, Humeris Cervicibusque admotis: post *Clysmata* laxantia, aut mitiora *Cathartica*; frequentia porro *Vesicatoria*, Cruribus præcipuè.

AUGUSTO.

Suda Tempestas Initio, medio autem Augusto permulta Pluvia, eoque quidem exeunte nimia. Libanotus frequens, isque ad Finem maximè furens, *Barometrum* valde depressit, Aeremque reddidit humidissimum; maximæ fuerunt Rorationes

tiones Mensis Principio, Aquilone spirante. Auster turbineus Nocte inter ix. & x. Diem *Mercurium* præcipitavit plurimum gravissimamque Pluviam; Maris autem Æstum extulit maximè.

Pluvia $\frac{111}{9}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{11}{12}$ $\frac{11}{13}$ $\frac{11}{14}$ $\frac{11}{16}$ $\frac{1}{17}$ $\frac{1}{19}$ 23.
Dig. Dec.
25. 26. $\frac{11}{28}$ $\frac{1}{29}$ $\frac{11}{30}$ 31. = 4. 022.

Procella 9. Nocte. S S E 4. — 28. Nocte. S w 4^r. — 29. Nocte. S w 4^r. — 30. w S w 4^r. cum Fulgure & Tonitru.

8 Altitud. maxim. 3. 29. 8. N 1. } media 29. $3\frac{27}{32}$
—— minim. 10. 28. 7. S S VV 3x. }
Dies frigid. 31. 42. S VV 3. } media Therm. Altit. $30\frac{26}{31}$
— calid. 7. 24. N b VV 1. }

Febris epidemica plures adhuc premit, ingenti sæpe cum Vomitu & Diarrhæa: Ophthalmiæ passim: Scabies valde frequens. Variolæ jam grassari incipiunt, ac Febres lentæ nervosæ.

Plurimæ Aviculæ canentes pereunt: perrarò auditur stridula Cicada. — Æstas fuit magis nubila, magis frigida, magis denique pluviosa solito: Omnia nunc Loca Aqua & Limo plena sunt.

S E P T E M B R I.

Toto fere Septembri Ventus ex Occidente spiravit, ad Septentrionem verò majori ex Parte deflectens, qui *Barometri Mercurium* exaltavit: manet usque tamen *Atmosphæra* madida & paulo frigidior.

Pluvia

Pluvia $\frac{11}{1}$ $\frac{11}{2}$ $\frac{1}{3}$ 8. 17. 20. $\frac{11}{21}$ 22. — 24
Dig. Dec.

27. 28. 30. = 1. 752.

Parva AB. 9. H. 10. NN w. 1. Procella 21.
p. m. S w — 24. nocte. w S w 4^x.

Vehemens Grando 22. w N w 2. Magna
Pruina 26. N b E 1.

Altitud. maxim. 17. 30. 0. Malacia. } media 29. $6\frac{3}{27}$
— minim. 1. 29. 0. VV 2. }
Dies frigid. 26. 54. N b E 1. } media Therm. Altit. $41\frac{10}{27}$
— tepid. 1. 36. — }

Jam evanescit fere Febris *epidémica*, nec multum augetur *Variolarum* Numerus. Cholerae, Febres *nervosae*, *miliares*, intermittentes, passim.

OCTOBRI.

Initio Africus nimbosus multam demisit Pluviam; quarto Die saeviit Vultur; à decimo quinto ad vicesimum tertium perflavit Aquilo, & *Mercurium* erexit plurimum; sub Finem Corus: Aer frigidus est ac humidus.

Pluvia $\frac{11}{1}$ $\frac{11}{2}$ $\frac{11}{3}$ $\frac{11}{4}$ 5. 7. — 10. $\frac{11}{11}$ $\frac{11}{12}$ $\frac{1}{13}$
Dig. Dec.

15. 19. 21. 23. 26. 28. 29. = 3. 154.

Fulgur & Tonitru cum Grandine 2. p. m.
Grando 7. 8. Fulgur & Tonitru 12. p. m. per-
magni Maris Aestus à 1. ad 4. Diem.

Altitud. maxim. 22. 30. 3. E N E 1. } media 29. $5\frac{26}{30}$
— minim. 4. 28. 8. S E b E 3^x. }
Dies frigid. 19. 64. N N E 2. } media Therm. Altitud. 52.]
— tepid. 1. 43. S VV 4^x. }

Variolæ jam factæ sunt *epidemicæ*. Morbi colici à *Pomaceo* novello frequentissimi. *Catarrhi* & *Faucium* Tumores haud rari; imò quædam adhuc *Reliquiæ* *Febris epidemicæ* sparsim notantur. *Febris nervosa* & *miliaris* passim.

N O V E M B R I.

A primo Novembris, Diem ad usque viceſimum, Ventus inter Orientem & Septentrionem constitit, qui & paulo sicciorem reddidit *Atmosphæram*, multoque magis frigidam, *Baroscopium* verò extulit maximè: inter Diem autem xxi. & xxiv. fremente Africo, permulta Pluvia decidit, corridente admodum *Mercurio*; at brevi Aquilo redux restituit Rem.

Pluvia 1. $\frac{1}{4}$ 4. $\frac{11}{4}$ 10. 21. $\frac{1111}{4}$ 23. $\frac{111}{4}$ 24. $\frac{5}{4}$ 29.
Dig. Dec.
= 2.068.

Gelu, idque subinde rigidum, hoc Menſe frequens.

8 Altitud. maxim. 27. 30. 4. N N E 1. } media 29. $8\frac{14}{29}$
—— minim. 23. 28. 8. S V V 3. }
Dies frigid. 27. 68. N N E 1. } media Therm. Altit. $58\frac{31}{29}$
— tepid. 2. 52. Malacia . }

Variolæ & Morbi colici valde *epidemicæ*: *Apo-*
plexiæ plures: Colica biliosa passim.

D E C E M B R I.

Pluvia, procellosa, horrida, Tempeſtas hunc finivit Annum. Vix unus & alter Dies sine Pluvia toto Decembri; Libs vehemens perfurebat sæpiſſi-

1734)

Constitutio Aeris, &c

101

sæpissimè, gravi subinde cum Pluvia: inde *Barometrum* erat frequenter * mirè depressum. Jam magnæ sunt Inundationes undique. Aer fuit maximè humidus, Gelu rarissimum, etsi *Atmosphæra* fuit valde frigida sæpe.

Pluvia 1. — ⁱⁱⁱⁱ4. — ⁱⁱ6. 7. 9. 10. — ⁱⁱ12. — ⁱⁱⁱ14. 15. —
ⁱⁱ17. 18. 20. — ⁱ23. 24. 26. — ⁱⁱ28. 29. 31. — ⁱⁱⁱ6. 192.
 Dig. Dec.

Procella 1. S w — 10. p. m. S w b S 4. — 14. à primo mane S w 4^r. — 26. w N w. — 27. w 4^r. — 29. w S w 4.

8 Altitud. maxim. 25. 30. 0. N V V b V V 1. } med. 29. 3²/₃₁
 ——— minim. 14. * 28. 2. S V V 4^r. }
 Dies frigid. 22. 64. N N E 1. Gelu, } med. Ther. Altit. 58⁴/₃₁
 — tepid. 1. 52. V V S V V 2. }

Variola valde *epidemicæ* & sæpe *mortiferæ*: Colice jam non adeò frequens. *Rheumatismi* multi; *Febres putridæ* & *petechiales* passim.

Maxima fuit Pluviæ Quantitas hoc Anno:
 Dig. Dec.
 nempe = 37. 114.

CONSTITUTIO AERIS, &c.

Anno MDCCXXXV.

JANUARIO.

QUAMVIS *Baroscopium* fuerat sublime valde de Initio Januarii, Ventusque arctus; id tamen procellosa Tempestas, à sexto ad decimum quartum fere perpetua, ac subinde gravissima, ad ultimum penè Gradum deturbavit: quod autem postea, à Die scilicet vicesimo ad Finem usque, ad summum fermè erexit Aquilo. *Atmosphæra* fuit rigida & sæpe humida valde: sub Mensis finem rigidum Gelu.

Pluvia 2. 5. ¹¹ 6. ¹¹ 7. 8. ¹¹ 10. ⁴ 11. — ¹¹ 13. ¹ 14. ¹¹ 18.
Dig. Dec.

19. 22. Nix 9. 11. = 2. 526.

Procella 6. nocte. S w 4^x. — gravissima 8. S w 4^x. circa Meridiem *Mercurium* depressit ad 28. 3. — vehemens 10. nocte S S E 4^x. 8 28. 4. violenta duravit Procella ad Horam octavam matutinam Diei undecimi; *Barometer* verò subsedit ad 28. 1. rarè *Mercurium Baroscopicum* infra hunc gradum notavi!

8 Altitud.

8 Altitud. maxim. 4. 30. 5. N b VV 1. } media 29. 6²⁴₃₀
 ——— minim. 11. 28. 1. S 4^x.
 Dies frigid. 25. 70. N 1. } media Therm. Altitud. 59²⁹₃₀
 — tepid. 6. 54. S VV 3. }

Variolæ sunt maximè *epidemicæ*, quædam valde malignæ; utpote quibus non rarò accedunt *Hæmorrhagiæ* ex omnibus fere Corporis meatibus, & (A) *Petechiæ* lividæ & nigræ. Vix unum vidi his correptum Affectibus servatum; nam in tanta Pestilentia Sanguinis *Crasis* dissolvitur penitus, & maximè putrescunt Humores: imò Cruor emissus, putris instar Saniei, diffuit; nec, ut solito, in Frigore coagulatur.

Colicus Morbus cum Doloribus sævis *rheumaticis*, & *Paresi* nonnunquam Brachiorum Manuumque, à *Pomaceo* novello, frequens adhuc: Multæ Tussés sub Finem Mensis: *Ophthalmiæ*, Febres *miliares* & *erysipelatosæ* passim.

F E B R U A R I O.

Sublimem retinuit Stationem *Mercurius* ad Diem usque decimum sextum, Septentrione afflante, aut Vulturno: sub Finem madidus Notus *Baroscopium* demisit. Sudum haud rarò eluxit hoc Mense: Gelu affuit rariùs.

Pluvia 8. 14. ^{II}17. 18. 22. ^{III}23. — ^{III}26. 27.
 Dig. Dec:
 = 1. 978.
 Procella 26. nocte: S S w 4^z

8 Altitud. maxim. 2. 30. 5. NNE 1. } media 29. 7²⁵₃₀
 ——— minim. 27. 29. 0. SSVV 3^x. }

104 *Constitutio Aeris, &c.* (1735)
 Dies frigid. 21. 66. E N E 1. rigidum Gelu. } media Therm.
 — tepid. 2. 52. Malacia. ———— } Altit. $57\frac{18}{25}$

Pleuritides & Peripneumoniæ frequentes, at
 Rure maximè: *Variolæ epidemicæ* adhuc, sed non
 ita pestiferæ.

Jam in Popellum ingruit Febris quædam con-
 tagiosa, Pustulis sæpe & *Petechiis* comitata:
 Merx admodum infelix! Classe, ut credere par
 est, advecta; quippe quæ diu antè inter Nautas
 apud *Portum-magnum* commorantes sævierat,
 multosque dederat Letho: de hac plura Mense
 sequente.

M A R T I O.

Varia fuit Tempestas Mense Martio, varia
 quoque *Barometri* Statio, nunc alta nempe, nunc
 valde depressa. Libs Initio, à sexto ad decimum
 septimum Vulturnus, tunc Aquilo, post Cau-
 rus: *Atmosphæra* erat frigida satis, at paulo hu-
 midior.

Pluvia 1. 2. $\frac{11}{4}$ $\frac{1}{5}$ 14. $\frac{11}{15}$ $\frac{11}{16}$ $\frac{1}{23}$ — $\frac{1}{25}$.
 Dig. Dic.

28. 30. 31. = 2. 234.

Maximus Maris Æstus 15. mane S b E 3^r.
 Gelu à xx. ad xxiii.

8 Altitud. maxim. 21. 30. 0 NE 2. } media 29. $3\frac{29}{30}$
 ———— minim. 16. 28. 7. S S E 3. }
 Dies frigid. 20. 64. N b E 2. } media Therm. Altit. $54\frac{4}{30}$
 — tepid. 15. 50. S b E 3. }

Variolæ hæctenus *epidemicæ*: Pleuritis & Peri-
 pneumonia passim; Apoplexiæ quædam.

Nunc

Nunc maximè dispergitur Contagium epidemicum in Plebeculam maximè. — Quibus Febris hæc contigit, primò levi quasi Horrore, ac universa penè Lassitudine, correpti sunt; mox Nausea & vertiginoso Capitis Dolore: haud vehemens tamen infecuta Febris est; nec immodica Sitis, quamvis media Lingua scabra fuit & fusca, imò sæpe arida valde, utroque verò à Latere Mucò oblita subflavo. Interim de Dolore Gutturis, haud rarò strangulante fere, & de teneris Oculis, Lumina refugientibus, multæ Quærelæ. Urinæ plerumque χριμώδες erant, aut tennes, paucæ, luridæ, vapidæ instar Cerevisiæ: quæ quidem omnibus in Febribus sunt pessimæ Notæ!

Hæc ferme per Quatriduum, quo aut vigiles omninò decubuerunt, aut ne sentientibus quidem brevissimus & maximè interruptus obrepit Somnus. Jam Surditas, Desipientia, Suspirium frequens, immanis Præcordiorum Oppressio, Manuum Tendinumque Tremor & Subsultus accedebant: attamen de Valetudine rogati vix querebantur quicquam, adeò invaluerat Torpor.

Diem circiter sextum, nunc citiùs, nunc tardiùs, *Petechiæ* rubræ, purpuræ, lividæ, nigræ, imò, Vibices quasi, sæpe apparuerunt. Mali admodum Ominis hæc *Exanthemata*! eoque pejoris, quo magis ad Nigritiem spectabant. Frequenter porrò videbantur innumeræ Maculæ minutissimæ fusci Coloris, Cutis Lenticulas aut Pulicum Morsus adumbrantes, sed paulo magis atræ: quas utique haud minùs esse lethales observavi quàm ipsas nigerrimas. — In hoc Rerum Statu, aut Sopor perpetuus urgebat, aut

Furor cæcus; imò sæpe haud erat affidentibus, etiamsi robustis, facile Ægros continere, ne è Lectulis exilirent, tanquam aliò abituri: quo quidem Symptomate vix aliud magis tunc funestum memini.

Tristitia dum hæc agebantur, Sudor profusus, viscidus, olidus, aut foetidissima, livida, *Diarrhæa* miseros colliquabat Ægros. Lingua porro nigra, aridissima, Vox Faucibus hærens, Singultus, *Spasmi*, Pulsus formicans, aut coacervatus, Livor Manuum, ac sæpe ipforum etiam Cubitorum, atræ Mortis certissima instabant Præ-nuncia: Die undecimo, aut decimo quarto plerumque, multo citiùs nonnunquam. Tanta fuit, tamque cita, Putrefactio Cadaverum, ut ea sepelire fuerit necesse prorsùs aliquando vel intra Horas viginti quatuor.

Dira quidem hæc & acerba maximè! erant autem plurimi, quibus Sors melior, Die scilicet quarto, aut quinto, benignum dedit morbi exitum; Eruptione nempe Pustularum rubrarum, *miliarium*, atque blandi per totum Corpus Sudoris. — Multi diu morbo conflictati, innumeras tandem habuere Pustulas *miliares*, limpidas, sæpe salutiferas: pluribus autem erat periculosæ plenum opus Alexæ.

A P R I L I

A Die secundo Aprilis ad decimum spiravit Eurus; post varius Ventus variaque admodum Tempestas, at pro Anni Tempore frigida & humida.

Pluvia 1. $\frac{1}{8}$. $\frac{1}{9}$. 10. $\frac{1}{14}$. — 16. $\frac{1}{18}$. $\frac{1}{20}$. 22.

$\frac{11}{11}$ Dig. Dec.

24. 27. 29. = 2. 252.

Ventus vehemens 22. prima Luce. W N W
Nox procellosa 26. S 4.

8 Altitud. maxim. 16. 29. 9. E S E 2. } media 29. $5\frac{10}{29}$
—— minim. 10. 28. 8. S E 2.

Dies frigid. 7. 54. E b S 2. } media Therm. Altit. $46\frac{20}{29}$
—— tepid. 25. 42. VV N VV 1.

Auctus jam Variolarum Numerus est: atque modò Febris *anginosa miliaris*, quæ verno Tempore elapsi Anni fuit hic *epidemica*, vicinam infestat Regionem. — Febris contagiosa, maligna, sævit jam magis quàm antehàc unquam. Rarò nunc adest strangulans Faucium Dolor, paucæque nunc erumpunt Pustulæ; at Loco earum *Petechiæ* fuscæ, purpureæ, nigræ, ac nimis frequenter lividæ Vibices, atro semper Carbone notandæ! — plurimi moriuntur.

M A I O

Boreas afflavit, aut Corus, à primo ad vicesimum quartum Maii, post Vulturnus; Tempestas fuit valdè frigida ac nubila. Maximæ Pruinæ à duodecimo ad decimum quartum.

Pluvia 1. 11. 12. $\frac{11}{15}$. 17. 20. 22. $\frac{11}{23}$.

$\frac{1}{1}$ Dig. Dec.

24. 26. 30. 31. = 1. 646.

Grando vehemens 23. Fulgur & Tonitru 30.

8 Altitud. maxim. 19. 30. 1. N VV 1. } media 29. $6\frac{12}{31}$
—— minim. 16. 29. 1. S E 2.

Dies

Dies frigid. 14. 14. N VV 1.

→ tepid. 31. 36. SS E 1.

} media Ther. Altit. 43. $\frac{6}{31}$

Multi Apoplexia corripuntur: *Variola* adhuc. Febris contagiosa plurimos perdidit; optima sæpe sprexit Consilia: sequens tamen Methodus permultos servavit.

Ipso quidem Morbi Initio Venæ Sectio profuit, rarò post unquam: imò temeraria suscepta Manu sæpe obfuit maximè. Si tamen post Sanguinis Missionem *Cephalalgia* & Vertigo urgebant usque fuit utile admodum Cucurbitulis scarificatis, Humeris Cervicibusque admotis, Sanguinem detrahère: quod quoque Vomitionem, post excitandam, reddidit tutiorem. Cruorem vix unquam notavi valde glutinosum, Serum plerumque verò viride erat, haud rarò rubellum; quod infaustum semper! quibus enim id contigit, *Petechias* nigerrimas, aut Vibices habuere certo certius cum Phrenitide perpetua, aut gravi Comate.

Continua fere Nausea, ac frequens, biliosus, Vomitus lene semper poscebant *Emeticum*, quo & Ventriculi Colluvies ejiceretur & præcautum foret contra pestiferam *Diarrhœam*, quæ aliter Morbi statu, aut paulò post, semper evenit, nam ubi Ventriculi Saburra, diutius morando, acrior, fit assiduè; tandem per Intestina descendens, ista utique torquet maximè.

Nullò non Tempore Morbi *Epispastica*, alia scilicet aliis succedentia, necessaria fuerunt omninò; lenia porrò desiderabant *Cardiaca*, eaque repetita frequenter, Languor continuus & collabentes assiduè Vires: quæ & Sudores etiam maturos, criticosque sæpe, movebant, aut Pustulas expelle-

expellebant. Ad hæc promovenda Confect. Raleigh. Theriac. Andromach. Lap. Contrayerv. Rad. Serpent. Virg. aliquando Sal. C. C. &, quibus non fuit ingrata admodum, non uno solum Nomine laudanda, Camphora (quæ nempe Opio. felicius arcessebat Somnum, ac Delirium compescebat magis) aptissima fuere Remedia. —

Imò, quod multò minore Pompa paratur, Vinum rubrum *ustulatum* (quod dicitur) Cinnamomo & Maci incoctis cum Aquæ pauxillo, haud minus efficax ad Vires sustinendas inveni, quàm celeberrima *Alexipharmaca*; non in hoc tantum Morbo, sed & in omni Febre lenta & *nervosa*, potissimum cum coliquante Sudore, vel immodico Alvi Fluxu declinante. Didici hinc tandem, quod astringentia Aromatica mitiora *Crasin* Sanguinis firmando, Fibrasque Vasculorum corroborando, vera fuere hujus exeuntis saltem, Morbi *Alexiteria*; fortasse & Antidota fuissent.

— Ipsi etiam Veteres Antidotis & *Alexipharmacis* immiscebant semper astringentia quædam Medicamenta, ut passim apud eos videre est.

Ad eum adeò Finem, optato demùm cum Successu, post summum Morbi Incrementum, exhibui aliquam ex Cortice Peruviano Medicinam cum *Alexipharmacis* idoneis & Elixire Vitrioli Mynsichti acidulatam; nec otiosè intereà expectans Sedimentum Urinæ laudabile, & (quod dicitur) lateritium: modò scilicet vel minimam Morbi Remissionem observassem. — Si in singulari Gangræna valeat Quinquina, quidni in universa Humorū Corruptione? *Exanthemata* nigra, Vibices & citissima Cadaverum Putrefactio, *gangranosam* utique Sanguinis *Diatthesin* significabant.

In longis equidem Febribus nihil magis necesse est, quàm Solida inter & Fluida Æquilibrium conservare debitum. Nihil ad id sanè facit efficacius, quàm, diluente Liquore, Sanguinem fovere assiduè, ac Vim Fibrarum confirmare Medicamentis appositis; donec Natura, his Auxiliis Morbi Vitrix, læta Crisi eum expellere possit: nam ut Febris ardens Fræna semper poscit, lenta sæpiissimè indiget Calcaribus. — Profectio nunquam non Arte molienda Crisis est, cum nil ultrà assequi valeat Natura. — Febribus ideò tardè admodum decreascentibus, lenia *Cathartica* sæpe ex Usu sunt maximè, *Cardiacis* interim assumptis: In hac sanè, de qua agitur suprà, cum vix alia profecerint, Rhabarbarum exhibitum quotidie valuit plurimùm; Vinum ustulatum interim assatim sorbendo: hoc Modo enim putris expurgata fuit Colluvies, & Viribus interea consultum est optimè.

J U N I O.

Caurus hoc Mense spiravit sæpiissimè, hiscebat etiam subinde Libs: Vulturnus à decimo nono ad vigesimum secundum. Aer erat plerumque valde frigidus, crassus & humidus.

Pluvia ^{III} 1. 3. 4. 11. 15. 16. — 18. 19. 20. Dig. Dec. — 22. 25. 26. 28. — I. 936.

8 Altitud. maxim. 5. 29. 9. N VV 1. } media 29. 5 $\frac{7}{29}$
 ——— minim. 18. 29. 1. S VV 3. }
 Dies frigid. 2. 44. N VV 1. } media Therm. Altit. 36 $\frac{6}{29}$
 — tepid. 14. 34. Malacia: }

Variola,

Variola, & Febres intermittentes, haud infrequentes. Febris *miliaris* rubra cum enormi Vomitu & Alvi Fluxu Rure grassatur usque. Morbus contagiosus modò sub Finem Mensis mitescit paululum.

J U L I O.

Aer fuit humidus maximè & frigidus toto Julio, Ventus ab Occidente plerumque & Plagis australibus, Eurus aliquando: Tempestas utique fuit nubila, pluvia, infausta admodum, Hyemini magis quàm Æstati similis. Omnes Fructus pauci acerbi sunt & immaturi. Vix audis Ciadam, rari volitant Papiliones: Plurimæ Aviculæ canentes inter Plumas exuendas intereunt.

Pluvia 1. — $\frac{III}{3}$. $\frac{I}{6}$. 7. 10. $\frac{II}{11}$. 12. $\frac{III}{14}$. $\frac{II}{15}$.

Dig. Dec.

6. 19. 21. 22. $\frac{III}{25}$. — 27. 30. = 3. 536.

Procella 11. nocte w b S. Tonitru 30. p. m.
Coruscationes nocte.

Altitud. maxim. 28. 29. 7. S E 1.

— minim. 16. 28. 9. S VV 3x.

Dies frigid. 19. 42. SS VV 2.

— tepid. 30. 30. VV 1.

} media 29. $4\frac{4}{30}$

} media Therm. Altit. $34\frac{28}{30}$

Febris *epidemica* contagiosa hic imminuta est valde, at sævit adhuc in Vicinia: Multi *Variolis* usque laborant; (B) Pfora frequens.

S E P T E M B R I.

Nubilus fuit, madidus & frigidus, hic Mensis; Caurus afflavit sæpè, Libs aliquando, Eurus frequenter, sub Finem præcipuè: Boreas viii. ix. x.

Pluvia $\overset{0}{11}$ 1. $\overset{1}{12}$ 3. $\overset{0}{14}$ 6. $\overset{III}{16}$ 7. $\overset{I}{17}$ 11. — 14 — 16. 17. Dig. Dec.
18. 20. 22. 24. $\overset{2}{26}$ 28. 29. = 1.918.

Altitud. maxim. 23. 29. 9. E 1. } media 29. $8\frac{7}{30}$
— minim. 11. 29. 2. VV NVV 1. }
Dies frigid. 28. 46. S E 1. } media Therm. Altit. $36\frac{14}{30}$
— tepid. 3. 30. N VV 1. }

Febres petecbiales sparsæ adhuc: Variolæ frequentes: Diarrhæa & Cholera multos infestant: Tusses plurimæ & ad Finem Mensis.

O C T O B R I.

Venit ab Oriente Ventus fere constans per totum Octobrem, Initio & Fine ad Septentrionem inclinans; unde Aer tenuis factus est, at paulo frigidior: medio autem ad Austrum.

Pluvia $\overset{II}{7}$ $\overset{II}{8}$ — 10. 12. $\overset{II}{14}$ $\overset{III}{26}$ $\overset{III}{27}$ = 2. 756. Dig. Dec.
Levis AB. 3. Malacia — 4. E. 1. — 12. N. 1.
Gelu & maxima Pruina 30. E N E 1.

Altitud. maxim. 30. 30. 1. E N E 1. } media 29. $6\frac{17}{30}$
— minim. 9. 29. 1. VV NVV 1. }
Dies frigid. 30. 64. } media Therm. Altit. $47\frac{22}{30}$
— tepid. 26. 40. S S E 2. }

Multæ

Multæ Febres lentæ, ac intermittentes, passim. Aliqui hoc Mense, subito quasi Asthmate correpti, in Tumores Pedum & Abdominis, hydropicos velut, inciderunt, ex quibus nonnulli brevi sunt mortui. — Multi Canes Rabie perciti.

N O V E M B R I.

Sequitur November pluvius admodum & procellosus, sub Finem præcipue: turbidus Auster prævaluit maximè, crassamque fecit *Atmospheram* ac humidam valde. — Excunte Mense per magnæ Inundationes undique.

	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>7</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>17</u>
Pluvia	4	5	7	9	10	13	14	15	17
	<u>19</u>	<u>21</u>	<u>23</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>27</u>	<u>29</u>	<u>4</u>	<u>922</u>
	19	21	23	25	26	27	29	4	922

Procella 9. ab Hora x. a. m. ad 2. p. m. S. W. 4^x. — 23. tota Die S. W. — 26. Nocte S. 4^x. — 27. S. 4^x. — Maximi Maris Æstus 27. quamvis Luna jam erat in *Quadratura*; altiores etiam quàm si Interlunium fuisset, aut Plenilunium. Tonitru vehemens 24. Noctu.

Altitud. maxim.	11.	30.	0.	N V V I.	} media 29. 4 ¹⁴ / ₃₀
minim.	27.	28.	4.	S 4 ^x .	
Dies frigid.	1.	58.	Malacia.	} media Therm. Altit. 49 ¹⁶ / ₃₀	
— tepid.	19.	44.	S S V V 2.		

Cephalalgia, *Vertigines*, *Insultus epileptici*, *Tumores Faucium & Parotidum*, frequentes: *dyspnoica Pectoris Gravitas* haud paucos premit. * *Febres lentæ nervosæ plurimæ*. — Multi Canes rabiosi circumcursant.

D E C E M -

* Vide *Dissertationem de Febre lenta nervosa*, infra, p. 147.

D E C E M B R I.

Vix unquam *Atmosphæram* memini ita humidam fuisse, ac erat toto Decembri; etsi Subsolanus perflabat sæpissimè: fateor equidem quòd madidus Notus intervenit frequenter, ac Pluvix haud parum demisit.

Pluvia $\frac{1}{1}$. $\frac{1}{4}$. $\frac{1}{5}$. $\frac{11}{6}$. 7. 9. 17. 19. $\frac{11}{24}$. $\frac{11}{25}$. $\frac{11}{28}$.

$\frac{111}{100}$ Dig. Dec.

30. 31. = 2. 364.

Gelu rigidum 12. 66. E b N 1. — 13. 64. E 1. — 16. E 1. — 23. 64. E 1.

Procella 24. Nocte. S b E — 27. S w b w 4. Maximi Maris Æstus 21. 22. E S E 2. — permagni 24. 25. 26. Austro furente.

Altitud. maxim. 21. 30. 0. E b S 2. } media 29. $6\frac{6}{27}$
 ——— minim. 28. 29. 0. S VV b VV. 3x. }
 Dies frigid. 12. 66. E b N 1. } media Therm. Altit. $54\frac{8}{27}$
 — tepid. 1. 46. VV b S 2. }

Tusses, Colli Fauciumque Tumores, Rauce-
dines, levi sæpe cum Febricula, sunt valde fre-
quentes, Febres putridæ *nervosæ* passim.

Dig. Dec.

Summa Pluvix hoc (C) Anno est = 30. 974.

Notationes quædam.

(A) Hæ Maculæ oriri videntur ab infraclis aut dissolutis, Sanguinis Globulis, *Arteriolas se-
rosas* intrantibus; dumque ibi hærent, *Petechias*

L

fer-

formant, aut Vibices; velut in Contusionibus Sanguis ruber in Vasa iniqua urgetur, & Cutim reddit discolorem. — Pestiferæ semper sunt, quòd Cruorem putridum esse, aut maximè solutum, denotant: imò adeò sæpe dissolvitur Sanguis, ut profusæ subsequantur *Hæmorrhagiæ*. Quòd quidem *Scorbuticis* quoque accidit crebrò, cum ne vel minima Febris Signa adsint, etsi totus fere Corporis Habitus innumeris violaceis Maculis inficitur; qui tamen mox, ac ne quidem tale quid somniantes, funesto sæpe Sanguinis Fluxu corripiuntur: iste tamen Cruor nunquam, more solito, concrevit. — Hos certe *Scorbuticos* austera acida, opportunè data, adjuvant maximè, ut haud rarò notavi. — In talibus ideò *Variolis*, & aliis maculosis Febris, valeant plurimum. — Missio Sanguinis utique obesse magis, quàm prodesse, videtur.

(B) Estne peculiaris aliqua *Atmosphæræ* Constitutio ad Eruptiones cuticulares gignendas apta? utique per idem fere Tempus, quo *Variolæ*, aut pustulosæ Febres, grassantur, *Exanthemata* quoque omnigena, ut Papulæ, Scabies, Erysipelas, &c. infestare solent, ut observatur sæpissimè: imò dudum, & vulgò noverint vel Mulierculæ, quod *Morbilli*, aut *Rubeolæ*, *Variolas* plerumque præcurrunt. Nonne adeò desumendum sit hinc Monitum *prophylacticum*? — Forte lenia *Mercurialia*, quæ in aliis Cutis Morbis tantum valent, tempestivè assumpta, aut *Variolis* sint Antidota, aut morbum saltem faciant leviorè: idque potissimùm cum & Vermiculos enecent, qui junioribus præcipuè adeò infesti sunt, & tam diras sæpe (unà sævientibus *Variolis*) movent Tragedias. — Hæreo tamen ne fortè Sanguinem quo-

quorundam dissolvant nimum, & ad *Hæmorrhagias* disponant fatales: hoc autem ex facili præcaveri potest Corticem Peruvianum, aut tale quid, exhibendo simul.

(C) Annis maximè pluviosis hic debet annumerari, ob Frequentiam saltem, si non ob Pluviæ Quantitatem: nam continua fere decedit, quanquam rarè admodum gravis. Imbres utique vehementes Aerem faciunt sicciorem, quatenus Vapores per *Atmosphæram* congestos deturbant; hinc post eos plerumque Aer purus valde & liquidus apparet, & multo majorem ejus siccitatem *Hygroskopica* indicant: densa autem, & nebulosa quasi Pluvia, omnia humectat maximè.

— Vix unquam sanè memini *Atmosphæram* magis fuisse humidam & crassam, quàm hoc & elapso Anno: Hyems fuit tepida nimis, Æstas perfrigida; utraque infesta semper & Pluviæ ferax, ac nunquam non Morbis abundans; — Ex quo sanè tam udas habuimus Tempestates, Febres putridæ, lentæ, *nervosæ*, ac intermittentes omnigenæ, per has Regiones grassatæ sunt maximè; etiam in hoc Oppido & per Viciniam, cum tamen Annis abhinc viginti veras intermittentes rarissimè viderim. Imò bene memini Milites plurimos, emeritos, ad Arcem nostram olim transvectos ab Oris Icenis & Portu magno, perinaci admodum Quartana tantum non confectos penitus; qui tamen hic, à sola Benignitate Cæli, convaluere protinus.

CONSTITUTIO AERIS, &c.

Anno MDCCXXXVI.

JANUARI.

TRISTI sub Aspectu Annus exoritur : dum enim *madidis Notus involat Alis*, perpetuæ fere ruunt Pluviae. Paucissimi sanè fuere Dies aprici toto Januario : *Atmosfera* verò quàm maximè humida & crassa ; exeunte Mense algida . Gelu. rarò admodum , Diluvia sæpe.

Pluvia	$\frac{11}{1.}$	$\frac{1}{2.}$	$\frac{11}{3.}$	4.	6.	8.—	$\frac{1}{10.}$	$\frac{11}{11.}$	$\frac{11}{12.}$	—
	$\frac{11}{14.}$	—	$\frac{11}{16.}$	—	$\frac{11}{18.}$	$\frac{1}{19.}$	21.—	$\frac{11}{23.}$	$\frac{11}{24.}$	$\frac{11}{25.}$
									$\frac{11}{28.}$	$\frac{1}{30.}$
Dig. Dec.										

31. = 5. 070.

Grando 2. 13. 20. 26. Fulgur & Tonitru cum Pluvia gravissima 16. Vesperi.

Gelu 16. N N W 1.—22. N N W 1. Procella 25. Vespere. S S W.

$\begin{array}{l} \text{Altitud. maxim. 6. 29. 8. VV N VV 2.} \\ \text{— minim. 25. 28. 7. S S VV 4.} \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} \text{Altitud. maxim. 6. 29. 8. VV N VV 2.} \\ \text{— minim. 25. 28. 7. S S VV 4.} \end{array}} \right\} \text{media 29. } 2\frac{27}{30}$

Dies

1736.)

Constitutio Aeris, &c.

119

Dies frigid. 22. 66. N N VV 1.

— repid. 4. 50. S b VV 2.

} media Ther. Altit. 56 ¹⁶/₃₀

Multi Tussi vexantur, Fauciumque & Parotidum Tumore. Apoplexia & Paraplegia passim. Prurigo & Pustulæ frequentes.

F E B R U A R I O.

Quamvis Initio Februarii Tempestas fuit nimboſa valde, mox tamen ſucceſſit Apricitas aliqua, ac Frigus acre, ſtante plerumque Vento aquilonali, qui Aerem ſiccabat plurimum, & omnia ſæpe rigido conſtrixit Gelu. Principio Menſis Inundationes permagnæ; poſt etiam ſatis Terris Nivis atque Grandinis miſit Pater.

Pluvia ^{III} 1. ^{II} 2. ^{II} 3. ^I 5. ^{II} 7. 8. 9. 14. 26.

Nix 16. 17. N N w 1. — 19. S S E 1.

^I — 20. E 3. — 23. N N w 3. — 24. N N w 2.

Dig. Dec.

= 3.082.

Grando 2. w N w 2. — 19. 21. 24.

^I — 26. E S E 2. — 28. N N w 1.

Leves AB. 7. E S E 1. — 19. E b S 1. — magna AB. 6. H. 8. p. m. N. 1. Radii coruſcantes vibrantur vel ab ipſo Auſtro, Corona lucida magis vergit ad Orientem quàm vidiffem antehac unquam.

Magnus erat hic Maris Æſtus Die 16. N N w 3. at minimè inundans ut apud Londinenſes, Icenos, Cantianos atque Belgarum Oras, ubi quàm maximus fuit.

8 Altitud. maxim. 29. 30. 0. N b E 2. } media 29. 3 $\frac{16}{26}$
 ——— minim. 22. 2. 5. VVS VV 2x. }
 Dies frigid. 13. 72. NN E 1. } media Therm. Altit. 60 $\frac{6}{26}$
 — tepid. 2. 56. VV N VV 2. }

Tusses & Catarrhi levi sæpe cum Febricula permulti; Anginæ, Pleuritides & Peripneumoniæ haud raræ: Juniores quamplurimos Perniones vexant maximè.

M A R T I O.

Frigida Tempestas ad Diem usque decimum Martii, post autem multo tepidior evasit: Spiravit Eurus hoc Mense sæpissimè, & pulchra non rarò affulsit Apricitas cum Aere puro siccoque.

Pluvia 1. 6.—8. $\frac{II}{11}$. 19. $\frac{IIII}{21}$. 23. 27. $\frac{II}{29}$.
 Dig. Dec.
 Nix 3. E 3.—8. N w 1.—2. 13⁸.

8 Altitud. maxim. 1. 30. 0. Eb N 2. } media 29. 4 $\frac{11}{31}$
 ——— minim. 22. 28. 8. S S E 2. }
 Dies frigid. 7. 66. N VV, 1. rigid. Gelu & maxima Pruina. }
 — tepid. 27. 45. S S E 2. media Therm. Altit. 51 $\frac{8}{31}$ }

Perniones ulcerosi molestissimi frequenter. Peripneumoniæ passim, præcipuè verò nothæ.

A P R I L I.

Eurus afflavit sæpe, Boreas nonnunquam; Caurus frequenter, hoc Mense; quod *Barometrum*, diu depressum, resurgere fecit, Nabesque

1736)

Constitutio Aeris, &c.

121

que abegit : à decimo quinto tamen ad vicesimum quintum Pluvia frequens.

Pluvia 1. $\frac{1}{15}$. — $\frac{11}{18}$. — $\frac{1}{21}$. 22. $\frac{11}{25}$. Grando 15.
Dig. Dec.

— 1. 340.

Pruina maxima 11. 12. Maximæ Rorationes
ad Finem.

⌘ Altitud. maxim. 3. 30. 1. E 1. } media 29. $7\frac{1}{2}$
——— minim. 25. 29. 3. VV S VV 1. }
Dies frigid. 11. 58. N 1. } media Ther. Altit. $43\frac{25}{30}$
— tepid. 29. 32. Malacia. }

Pleuritides & Peripneumonix frequentes : Anginæ & Ophthalmix passim.

M A I O.

Perflavit Euris plerumque durante Maio, isque sæpe velox, ac deprimens *Mercurium baroscopicum*, Aquilone tamen, aut Coro, nonnunquam intercurrente. Ineunte Mense Frigora pro Anni Tempore haud exigua, post verò Aer tepidus sæpe & tenuis.

Pluvia $\frac{111}{2}$. 4. 5. $\frac{11}{9}$. 11. $\frac{11}{12}$. 15. 16. $\frac{111}{22}$. 23.
Dig. Dec.
27. = 2. 536.

Ventus vehemens 21. p. m. E S E. Magnus Halo circa Lunam 9. H. 10. p. m. E 2. — per magnus igneus Halo 11. H. 10. p. m. S E 3.

⌘ Altitud. maxim. 19. 29. 8. E S E 2. } media 29. 5.
——— minim. 12. 29. 1. S E 3. }
Dies frigid. 3. 52. NN VV 1. Frigus insolitum ! } med. Ther.
— tepid. 31. 27. N N VV 1. ————— } Altit. $39\frac{10}{31}$.

Pleuritides & Peripneumonix sparsim: Eruptio Pustularum rubrarum urentium plures molestat. Tempestas infesta tabidis.

J U N I O.

Per Initia Junii Aer valde crassus fuit & humidus; tenuis post, ac fervidus sæpe, Finem adusque, fere Mensis, maximo decidente Rore: dum incerto admodum Cursu spiravit Ventus; Eurus sæpe, Boreas haud raro, Caurus quoque interfuit frequenter, Libs Initio.

Pluvia $\frac{1}{3}$. 4. 6. $\frac{1}{13}$. 14. 23. $\frac{11}{27}$. $\frac{1}{29}$
 III Dig. Dec.

30. = 1. 6 14.

Fulgur & Tonitru 29. Nocte. S E 2. — è longinquo 23. — 28. p. m.

8 Altitud. maxim. 18. 29. 9. N N E 1. } med. Bar. Alt. 29. $6\frac{3}{30}$
 ——— minim. 27. 29. 3. E S E 2. }
 Dies frigid. 6. 38. V V N V V 1. } media Therm. Altit. 26. $\frac{6}{30}$
 — fervid. 11. 20. N N E 1x. }

Febres tertianæ, semitertianæ, & quotidianæ, passim: Ophthalmiæ frequentes: Phthisici colliguntur maximè. Alique Pleuritides & Peripneumonix incipiente Mense: psorica Eruptiones plurimæ. — Innumeri Afili Armenta molestissimè infestant.

J U L I O.

Varius fuit hoc Mense Ventus, & Malacia frequens, Caurus verò sub Finem plerumque, sudo existente Cœlo, ac fervido, cum Rore maximo.

ximo. Immenſa Viſ Pluviæ decedit Die ſecundo
& octavo, flante Vulturno; decimo autem, eo-
dem perflante Vento, quantum vix unquam per
idem Temporis Spatium; ab Hora enim iſtius
Diei tertia pomeridiana ad quintam matutinam

Dig. Dec.

undecimi Pluvia fuit 1. 686.

Pluvia 1. ¹¹¹¹ 2. ¹¹¹¹ 3. ¹¹¹¹ 8. ¹¹¹¹ 10. — 12. — 14. ¹¹ 19. ¹¹ 25.

Dig. Dec.

28. = 4. 870.

Procella 2. Nocte. S E. Fulgura Nocte 13.

8 Altitud. maxim. 16. 29. 9. Malacia. } media 29. $5\frac{2}{3}$
—— minim. 11. 29. 1. SS E 2x.

Dies frigid. 4. 40. N 2. } media Therm. Altit. $27\frac{16}{31}$
— fervid. 29. 18. VV N VV 1.

Febres intermittentes & *miliares* aliquæ mali
admodum moris, Ruri præcipuè: *Variolæ* hîc
sporadicæ: *Choleræ*, *Diarrhææ*, ac *Dysenteria*
etiam, undique valde frequentes ſunt.

AUGUSTO.

Ineunte Auguſto Aer fuit craſſus & valde
calidus, medio Menſe multo frigidior, flante
Cauro; cæterum Ventus erat inconfans maxi-
mè: ſub Finem Ros plurimus decedit, ac redie-
re Calores.

Pluvia 1. ¹¹ 4. ¹¹ 6. ¹¹ 7. ¹¹ 8. ¹¹ 12. — 14. ¹¹ 15. ¹¹ 17. ¹¹ 26.

Dig. Dec.

28. 31. = 1. 834.

Nox procelloſa valde 13. S w b w 4. Ful-
gura 20. Noctu. Magni Maris Aëſtus 26. 27.
S S E 2x.

Die

Die 25. w i. inter Horam nonam vespertinam & undecimam Zona quædam angusta, at lucida valde, ab imo Occidente ad summum Orientem usque extensa, magnæ Iridis instar effulsit, stupente Populo. AB. 29. N 1.

♂ Altitud. maxim. 18. 29. 8. N VV b N 1. } media 29. $4\frac{17}{39}$
 ——— minim. 26. 29. 1. S S VV 2. }
 Dies frigid. 16. 42. VV N VV 1. } media Therm. Altit. $27\frac{7}{30}$
 — fervid. 3. 19. VV S VV 1. }

Febres *miliæres*, malignæ, frequentes, in Cornubia præsertim. Cholerae, *Diarrhææ*, *Dysenteria* eæque aliquando cruentæ, frequentissimæ.

Mellificant Apes optimè; plurimæ Cicadæ & Vespæ. Optimum undique Frumentum.

S E P T E M B R I.

Flavit plerumque Corus Mense Septembri, Initio & sub Finem Pluvia: altam fere tenuit Stationem *Barometer*: Aer majore ex Parte crassus.

Pluvia 1. $\frac{1}{2}$ 3. $\frac{1}{2}$ 4. $\frac{1}{2}$ 6. 8. 10. 13. 15. $\frac{1}{2}$ 22. — $\frac{1}{2}$ 24.
 Dig. Dec.

26. — 29. = 1. 5 12.

Leves AB. 26. 27. H. 9. N w 1. Maximus Halo circa Lunam 12. H. 11.

♂ Altitud. maxim. 21. 30. 0. N N E 1. } media 29. 7.
 ——— minim. 30. 29. 3. S VV b S 3. }
 Dies frigid. 18. 50. maxima Pruina N N VV 1. } media Ther.
 — calid. 7. 29. S VV 1. ———— } Altit. $36\frac{20}{29}$

Cholerae, *Diarrhææ*, *Dysenteria*, adhuc valde frequentes, Febre nonnunquam comitante.

Pluri-

Plurimæ Febres *miliares*, *scarlatina*; pustulosæ; aliquæ porro lentæ, *nervosæ*: sæpe cum Glandularum Parotidum Fauciumque Tumore, ac profusis semper Sudoribus: Australibus in Oris Devonix & Cornubiæ præsertim.

O C T O B R I.

Ineunte & exeunte Octobri immensa Pluvix Copia decidit, dum Libs. sæpe fremuit vehementer: à duodecimo autem ad vigesimum primum ne minima Pluvia, Euro flante, aut Aquilone: ad Finem Mensis Aer erat valde crassus & humidus.

	1111	1	11	11	111	111	11
Pluvia	1.	— 3.	6.	7.	— 9.	10.	11. 22. 23.
	11	11	111	11	111	Dig. Dec.	
—	26.	27.	— 29.	30.	31.	= 6. 534.	

Procella 1. multo Mane. S b w — 7. S w — 9. Mane. S w b w 4^x. ab Hora autem prima ejus Diei pomeridiana ad tertiam usque Corus vehementissimus, quasi Circius Gallicus omnia deturbans, perfremuit, velocissimè cadente *Mercurio*. — Maximus Halo subluteus circa Lunam 6. H. 8. w 1. AB. 27. H. 8. w N w 3. media autem Nocte Grando gravis & Fulgura.

8	Altitud. maxim.	21.	30.	1.	N N E 1.	} media 29. 4 ¹ / ₃
	minim.	9.	28.	4.	N V V 4 ^x .	
	Dies frigid.	21.	54.	N N E 1.	} media Therm. Altit. 42 ¹² / ₃₀	
		16.	36.	E S E 1.		

Febres lentæ, *nervosæ*, *miliares*, haud paucæ, cum Sudoribus profusis: Cholerae ac *Dysenteriae* adhuc passim; præcipuè Mensis Initio: Sub Finem Tusse ferina inter Pueros.

Morbus

Morbus pestilens Boves consumit plures & Porcos in Australi Devoniam.

NOVEMBRI.

Altum plerumque tenuit Gradum *Barometer* hoc Mense: Ventus ab Oriente sæpe spiravit, sæpe & à Septentrione. Aer fuit non rarè valde humidus & gelidus sæpe: Initio Glacies, ad Finem Gelu maximæque Pruinae.

Pluvia 1. 6. 7. 9. 11. 12. 16. 18. 21. 24. ⁱⁱⁱ
Dig. Dec.

25. 28. = 1. 150.

Procella Vesperi. 24. S w b w; & tota fere Nocte Grando multa 7.

AB. levis, 7. N E 1. — major 8. H. 10. N N E 1: magna variegata 13. H. 7. N w 1.

Altitud. maxim. 5. 30. 3. E N E 1. } media 29. 8 ²/₂₉
minim. 25. 28 8. VV 2.

Dies frigid. 27. 65. E N E 1. } media Therm. Altit. 58 ²⁵/₂₉
— tepid. 22. 44. VV N VV 1.

Dysenteria adhuc: *Tussis convulsiva* passim. Innumeri fere Tussi, Coryza, Tumoribus Colli ac Faciei, corripuntur; haud pauci Angina. Plurimi Morbo *rheumatico* vexantur.

DECEMBRI.

Perstat usque *Mercurius* altam tenere Stationem, etsi medio Mense Libs furens istum deturbavit, plurimamque demisit Pluviam, *Atmosphæram* verò fecit humidissimam. Sanè ab Exitu Octobris, ad hoc usque Tempus, Aer immensa Vaporum

porum Cópia abundavit, quæ, partim saltem, *Mercurium* sustinuit. Septentrio Gelu nonnunquam produxit, idque sub Finem Mensis rigidum.

	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{11}{12}$		$\frac{1}{2}$	$\frac{11}{12}$	$\frac{1311}{12}$	$\frac{1111}{12}$
Pluvia	2.	3.	4.	5.	10.—	13.	14.	15.—	17.
	$\frac{111}{12}$	$\frac{111}{12}$	$\frac{111}{12}$		$\frac{1}{2}$				
	18.—	20.	22.	25.	27.	28.	31.—	5.026:	

Dig. Dec.

Fulgur & Tonitru cum vehemente Grandine
6. primo Mane. w N w 4^r.

Procella 17. Nocte. w S w — 20. bene Mane.
S w b w.

γ Altitud. maxim 24. 30. 4. N 1. ——— minim. 20. 29. 1. S VV b VV 4.	$\left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\}$ media 29. 7 $\frac{18}{29}$
Dies frigid. 25. 70. N 1. — tepida 14. 48. S VV 3.	$\left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\}$ med. Therm. Altit. 55 $\frac{20}{29}$

Diarrhœæ & Dysenteriæ adhuc; *Rheumatismus* frequens & *Icterus*: maximæ Querelæ de languido Virium Statu undique. — Tumores Fau-
cium, Glandularum, Parotidum, ac Maxilla-
rum; Tusses, Destillationes, Coryzæ, Raucedines, levi non rarò comitante Febricula, per omnes undique. Plures vel in iisdem Ædibus simul & semel corripuntur; evanuerè vero hæc omnia facillimè, modò se in lectulo paululùm continerent, & multa tepida Potione Sudores elicerent.

Tota Pluviæ Quantitas Anno MDCCXXXVI.
Dig. Dec.

= 36. 706.

CONSTITUTIO AERIS, &c.

Anno MDCCXXXVII.

JANUARIO.

ATMOSPHERA, innumeris adhuc gravata Vaporibus, *Mercurium Barometricum* sustinet usque ad Stationem sanè præaltam, Cauro plerumque spirante. Aer intereà æquè humidus esse perstat, ac si afflaret madidissimus Austro; irruit quidem medio Mense Libs, durans tamen parumper: à vicesimo primo ad vicesimum quintum Gelu.

Pluvia 2. 7. 12. — 14. ⁱ16. ⁱⁱⁱ17. 26. 27. 29.

ⁱ30. Nix 24. Grando ⁱ28. = 1. 588.

Halo circa Lunam magnus omni Nocte à 27. ad Finem.

8	Altitud. maxim.	19.	36.	6.	N 1.	} media 30. $1\frac{8}{30}$
—	minim.	17	29.	6.	S VV 2.	
Dies	frigid.	25.	70.	Malacia.	} media Therm. Altit. $55\frac{2}{30}$	
—	tepid.	1.	48.	VV 1.		

Febricula *catarrhalis* innumeros etiamnum infestat, prout Mense Decembri: imò & jam quam-

quamplurimi Equi eodem penè Morbo affici videntur, quorum certè pereunt plures. Haud parcè quoque grassantur Pleuritides ac Peripneumonix, nothæ præcipuè: nec infrequens est Icterus.

F E B R U A R I O.

Ventus occidentalis hoc Mense prævaluit, ad Septentrionem sæpe, ad Austrum verò flectens sæpiùs; Aquilo nonnunquam, aliquando Vulturinus, interfuit: humidus permanfit Aer, ac subsedit Barometer.

	ⁱⁱⁱ	ⁱⁱ	ⁱⁱⁱ		ⁱⁱ		ⁱ	ⁱⁱⁱ	
Pluvia	<u>i.</u>	<u>3.</u>	<u>6.</u>	8.	11.	13.	14.	15.	16.
									17.
	ⁱⁱ	ⁱⁱ	ⁱ						
	<u>18.</u>	<u>19.</u>	<u>21.</u>	<u>24.</u>	Grando	25.	26.	= 3.	488.

Dig. Dec.

Maxima Pruina & Gelu 5. 6. 8. 9. Procella, Fulgur & Tonitru 17. Nocte. w b N. Maximus Halo circa Lunam 27. 28.

8	Altitud. maxim.	9.	30.	2.	N b E 1.	} media 29. $7\frac{1}{27}$
	minim.	16.	29.	2.	S VV 3x.	
Dies	frigid.	2.	66.	N 1.	} media Therm. Altit. $55\frac{3}{27}$	
	tepid.	23.	49.	S VV b VV 2.		

Multi Rheumatismo & Angina laborant, pluri adhuc Morbo catarrhali pulmonario. Variolæ hic sporadicæ, multis in Locis epidemicæ. Tussis anginosa durat usque inter Equos.

M A R T I O.

Principio & Fine Martii Euris afflavit, aut Boreas, medio autem plerumque Corus: Aer evasit tenuis magis & ficcus ad Finem præcipuè; delapsis scilicet jam Vaporibus.

Pluvia $\frac{III}{7.}$ $\frac{I}{8.}$ $\frac{I}{10.}$ $\frac{II}{11.}$ $\frac{II}{13.}$ $\frac{II}{14.}$ $\frac{I}{15.}$ $\frac{I}{16.}$ — $\frac{II}{18.}$
 Dig. Dec.
 19. 20. 21. 22. 30. 31. — 4. 328.

Levis AB. 7. w N w 1. — 18. N. w b w 3.
 Procella 18. a. m. S 4^r.

Altitud. maxim. 6. 30. 1. N N E 1. } media 29. $5\frac{12}{32}$
 ——— minim. 14. 28. 8. VV b N 3^r. }
 Dies frigid. 6. 64. rigidum Gelu. } media Ther. Altit. $52\frac{2}{3}$
 — tepid. 31. 46. S E 1. ——— }

Pleuritides, ac Peripneumonix, & veræ & nothæ, haud raræ: Rheumatismus, Ischias diu admodum vexans, & sævæ Arthritides, multos cruciant. ——— Tussis plurimæ cum Gutturis Dolore ad Finem Mensis.

A P R I L I.

Ab Initio Mensis ad Diem decimum octavum Ventus ex Oriente perflavit, à vicesimo Libs, aut Argestes: ineunte Aprili Aer fuit valde frigidus, medio ficcus admodum, & exinde tepidior.

Pluvia $\frac{IIII}{1.}$ $\frac{II}{2.}$ $\frac{I}{4.}$ $\frac{I}{8.}$ $\frac{I}{9.}$ $\frac{I}{19.}$ $\frac{III}{21.}$ $\frac{II}{22.}$ $\frac{II}{23.}$
 Dig. Dec.
 16. 28. gravis Grando 24. — 3. 058.

Procella

1737)

Constitutio Aeris, &c.

131

Procella 2. E S E 4. — 13. tota Die. E 4^x.

8 Altitud. maxim. 12. 30. 0. N E 1^x. }
 ——— minim. 23. 29. 0. S S E 3. } media 29. 6⁴/₂₈
 Dies frigid. 6. 5. E 1. }
 — tepid. 30. 32. E 2. } media Therm. Altis. 43¹¹/₂₈

Multi Apoplexia, Paralyfi & Vertigine correpti sunt; aliqui Pleuritide & Peripneumonia. *Variolæ* passim: Asthma valde frequens, medio Mense præsertim. — Tusses, Coryzæ, Tumores Colli ac Faciei undique. — Crebræ Tusses *convulsivæ* inter Pueros in australibus *Damnoniæ* Oris.

M A I O.

Recurrrens jam ad Orientem Ventus per totum fere Mensem spiravit, ad Austrum flectens sæpe, ad Septentrionem verò sæpiùs magisque. Tempestas fuit per Initia (si Diem unum, alterumve, excipias) tepida satis: post verò fervidissima successit. Rorationes maximè Agros Hortosque fovebant assiduè durante Tempore fervido, alioquin omnia fere fuissent adusta.

Dig. Dec.

Pluvia 8. 9. 13. 15. 27. = 0. 332.

Fulgur & Tonitru hic 27. p. m. S w b. w 2.
 Fulgur & Tonitru ad Septentrionem, prope Alpes *Damnonienses*, & in occidentali Parte *Cornubiæ*, cum gravissima Pluvia 24. 25. 26. nulla hic.

8 Altitud. maxim. 16. 30. 0. N E r. }
 ——— minim. 22. 29. 2. E S E 2. } media 29. 5¹¹/₃₀
 Dies frigid. 10. 52. N 2. insolitum Frigus! }
 — fervid. 25. 15. Malacia. ——— } media Therm. Altis. 29¹⁶/₃₀

M

Febres

Febres *miliares* compositæ (commistæ nempe cum Pustulis limpidis Papulæ rubræ) hic passim, valde frequentes in occidua Cornubia. Initio Mensis plures Morbis Capitis correpti, ac Pectoris. Multi *Hæmorrhagiis* immodicis laborant; quarum Causa haud dubia fuit enormis admodum Aeris Mutatio: medio enim Mense penè horruimus Frigore, sub Finem arsimus Æstu.

J U N I O.

Priorem Junii Partem Aquilo frequens siccam quidem reddidit, ac frigidam valde; calida verò posterior evasit, Cauro plerumque spirante. Aer per totum fere Mensem fuit tenuis admodum, plurimæ verò & maximæ cecidere Rorationes. — Terra, Solis Ardore percalefacta, quamplurimos emittit Vapores, qui, nocturno condensati Frigore, Herbas Graminaque grato fovant Humore: nisi totos fere, dum exhalantur, Ventus rapidus secum verrat per Auras. Ideò cum aut nullus sit Ventus, aut lenis admodum, Ros plurimus videtur, dum fortis adsit dissipatur protinùs; æquè tamen exhalante Terra Vapores.

Dig. Dec.

Pluvia $\frac{1}{4}$. $\frac{11}{5}$. $\frac{1}{14}$. $\frac{1}{17}$. $\frac{11}{18}$. 23. 25. = 1. 066.

Tonitru a. m. 25. N W 1.

8 Altitud. maxim. 7. 30. 0. N 1. } media 29. $6\frac{12}{30}$
 ——— minim. 5. 29. 2. E N E 1. }
 Dies frigid. 15. 42. N N VV 1. } med. Ther. Altit. $27\frac{26}{30}$
 — fervid. 22. 19. Malacia. }

Procedente Mense Febres *rheumaticæ* & *Coryzæ* plurimæ: *Diarrhæa* frequens admodum.
 Tusses

Tusſes *convulſivæ* inter Pueros paſſim. *Variolæ* in Vicinia, jam verò hic nullæ.

J U L I O.

Æſtuosus ſubſequitur Julius, craſſum tamen congerit Aerem creber ex Austro & Occidente Ventus, ſub Finem præcipuè. Immenſa Viſ Roris decidit Initio. Muſcæ innumeræ moleſtant undique, & Erucæ plurima vorant.

Pluvia 8. 13. 14. 18. 19. 20. 22. 23. 25.

Dig. Dec.

28. — 31. = 1. 320.

Tonitru è longinquo 7. 11. Procella 22. S w b S 4^x.

8 Altitud. maxim. 4. 19 7. S E 1. } media 29. 4.
—— minim. 22. 29. 0. S V V b S 4^x.

Dies frigid. 31. 36. N V V b V V 1^x. } med. Ther. Alt. 25 ¹⁸/₃.
— fervid. 7. 17. V V S V V 1.

Febres *miliares*, rubræ præcipuè: Peripneumoniæ & Morbi colici paſſim. Tusſes *convulſivæ* in Australi Devoniam quamplurimos infeſtant Pueros. *Ophthalmiæ*, & *Choleræ* haud raræ.

A U G U S T O.

Ineunte & exeunte Auguſto Ventus fuit ut plurimùm Septentrionem inter & Occidentem, Libs autem medio interfuit frequenter: *Atmoſphæra* facta eſt craſſa valde & humida, ac multo frigidior.

Pluvia 1. ¹¹¹¹ 2. ¹¹¹ 3. ¹¹ 5. ¹¹ 6. ¹¹ 7. 10. 13. 15. ¹¹ 19.
 20. ¹¹ 21. ¹ 23. ¹¹ 25. 26. = 3.848.
 Dig. Dec.

Gravis Procella 20. primo Mane. S w b S
 4^x. AB. 9. H. 10. N w b w 1. maxima AB.
 10. H. 9. N w 1. Hujus Radii variis erant,
 atque maximè vividis, distincti Coloribus: Co-
 rona pulcherrimè rutilans à Zenith nostro ad O-
 rientem duodecim circiter Gradibus, ad Meridiem
 quoque declinabat paululùm. Permagna rursùs
 AB. 11. 10. p. m. N w b N 1. Corona erat
 eodem ipso Loco, quo hesternæ Noctis Coloris
 Ferri igniti. Levis AB. 12. H. 9. w N w 1.

8. Altitud. maxim. 9. 29. 9. N VV 1. } media 29. 5.
 ——— minim. 20. 28. 8. S VV b S 4^x. }
 Dies frigid. 4. 44. N N VV 1. } media Therm. Altit. 33²⁷/₂₉
 — calid. 17. 29. S S VV 2. }

Tusses, Diarrhææ & Cholerae, valde fre-
 quentes. Febres lentæ, nervosæ & miliares pas-
 sim: Variolæ sporadicæ.

SEPTEMBER 1.

Toto hoc Mense humilem tenuit Stationem
 Barometer, Vulturno plerumque flante, aut
 Africo. Aer interim redditus est humidus val-
 de, & frigidus: nam Septentrio quoque aliquan-
 do intercurrebat.

Pluvia 2. ¹¹¹ 11. — 15. 18. ¹¹ 19. ¹¹ 20. — 22. — 24. ¹¹¹¹ 26.
 27. ¹ 28. — 30. = 2.826.
 Dig. Dec.

Procella

1737)

Constitutio Aeris, &c.

133

Procella 11. S E b S 4^x. — 22. S w 4. Fulgur & Tonitru a. m. 20.

Maximus Halo circa Lunam 27. S b w 1^x.

8 Altitud. maxim. 10. 29. 9. N N E 1. } media 29. 3¹⁸/₂₇
 ——— minim. 22. 28. 5. S V V 4. }
 Dies frigid. 30. 46. N N V V 1. } media Therm. Altit. 36⁸/₂₇
 — calid. 6. 28. E S E 1. }

Diarrhœa plurimi laborant, aliqui *Febribus* intermittentibus, *anomalis*; multi *Morbo colico* & *Cholera*. — Tumores *Faucium*, *Parotides*, *Coryzæ* cum *Tussi* valde frequentes: *Variolæ* sparsæ. Nec infrequens est *Icterus*, nec *Rheumatismus*.

O C T O B R I.

Frequens ab Oriente Ventus, Mense Octobri; *Baroscopium* subinde erexit; qui porrò, ad Septentrionem deflectens sæpe, Tempestatem, fecit paulo frigidior, non rarò tamen intercurrente pulchra tepidaque Die: Aer autem plerumque humidus fuit & crassus.

Pluvia ¹¹/₁. 5. ¹/₈. 9. ¹¹/₁₁. ⁶/₁₅. ¹/₁₈. 24. 30.
 Dig. Dec.

= 1.556.

Procella 15. Nocte: S w 4^x. Glacies & maxima Pruina 14. 15. N N E 1.

Die 20. H. 7. p. m. vividam Iridem lunarem observavi, densissima, at tenuissima, decidente Pluviola.

8 Altitud. maxim. 14. 30. 1. N N E 1. } media 29. 6²/₃
 ——— minim. 16. 29. 0. V V b S 2. }

M 3

Dies

Dies frigid. 22. 61. N E 2x. } media Therm. Altit. 50 $\frac{25}{30}$
 — tepid. 3. 43. N b E 1. }

(A) Icterus frequens; Variolæ passim. Dentium Dolores, Tumoresque Faucium ac Faciei, cum Cruciatibus rheumaticis sæpe, præcipuè Lumborum, plurimos vexant.

N O V E M B R I.

Nunc Boreas, nunc Corus, Mercurium Barometri sustinent usque, maximè per Initia Novembris, Aerem tamen neutiquam desiccabant: medio quidem Mense haud parum sæpe intervenit humidus Auster.

Pluvia $\frac{11}{12}$. — $\frac{1}{14}$. — $\frac{1}{17}$. $\frac{1}{19}$. 23. — 25. 26. 28.
 Dig. Dec.

= 1. 334.

AB. 1. 10. p. m. E N E 1. — 7. N w b N 1.
 Vehemens Ventus 27. p. m. N w b w.

8 Altitud. maxim. 4. 30. 4. E N E 1. } media 29. 8 $\frac{14}{25}$
 — minim. 16. 29. 1. VV 1. }
 Dies frigid. 30. 65. N E 1x. } media Therm. Altit. 53 $\frac{6}{26}$
 — tepid. 12. 48. S b VV 2. }

Per omnia undique Loca incessit hoc Mense Morbus, medio tamen hoc in Oppido potissimum: omnes fere, cujuscunque fuerint Habitus, aut Ætatis, corripuens; Modo quidem haud ab simili, quo Febricula catarrhalis epidemica Anni MDCCXXXIII. at sæviore multo.

Magna adfuit Gravedo & Capitis Dolor, Nausea frequens, Sternutamenta perpetua, Destillationes maximæ, ac Tussis sæpissimè importuna

tuna valde. — Per Initia discruciauit multos acerbus Dorsi atque Lumborum Dolor, quod malè plerumque significabat; nam & magna simul accessit Præcordiorum Oppressio & haud modica Febris, sæpe planè *peripneumonica*: perliquida verò expuerunt, rarò coctum aliquid. De his actum esset prorsùs, si Phrenitis quoque interfuisset. — Tanta sæpe fuit in Fauces Destillatio, ut Anginam haud levem faceret: sæpiùs verò Faciei Tumor, Parotidum, Maxillarum, sequutus est, ac immensa Pituitæ acris ex Ore Naribusque Fluxio. — Plurimos acutissimus Dentium Dolor torfit, etiam quibus antè fuerant sanissimi: idque persæpe uno solùm à Latere, desinens accuratissimè inter Dentes *incisores*. Doluit & sæpe dimidium tantùm Caput, quasi in *Hemicrania* exquisita.

Longe plurimi sola laborabant Febricula cum Gravedine infesta, *Catarrho* & molestissimis Dentium Doloribus, accedente ut plurimùm Tumore Faucium & Aspredine: Juniores autem, crescente Morbo, delirabant sæpe. — Per multos cruciavit Dolor *rheumaticus* vagus, quosdam *ischiadicus* vehemens, non rarò durans diu: haud paucos errantia Tormina corripuerunt, *Diarrhæa* sæpe insequente *critica*. Lingua fuit alba plerumque, rarò arida, nec multùm sitiebant Ægri; Urina turbida fere & subrubra. Cruor sæpè Pleuriticorum similis.

Febris hæc *catarrhalis* plures jam per Hyemes plus, minusve, grassata est: varias autem induit Formas, pro Ratione variarum Hominum Constitutionum. Plures levis solùm Febricula tenuit, modico protinùs discussa Sudore; haud paucos autem *Peripneumonia* gravis: in Genere

tamen multo vehementius hoc Anno sævit, & largiorem Sanguinis Missionem postulavit.

Omniñò mihi pendere videtur à crasso, udo, gelidoque Aere, Spiracula Cutis ocludente, & acrem intra Corpus Colluviem congerente: nam & præcedit hunc Morbum semper, ac comitatur, crassa admodum humidaque *Atmosphæra* Temperies: nec grassatur unquam, nisi Mensibus hybernis, & ejusdem prope Indolis esse videtur cum Hyemali Febre *Sydenhamii*.

D E C E M B R I.

Varia fuit admodum hoc Mense Aeris Temperies, nunc frigida valde, flante Aquilone, nunc longè tepidior, irruente Africo sæpe, nec infrequenter Vulturno: immensa Vis Vaporum, per *Atmosphæram* diffusa, *Barometrum* mirè sustinuit; etsi haud paucæ corruerunt Pluviae.

Pluvia $\overset{11}{2}$. $\overset{11}{4}$. — $\overset{11}{6}$. $\overset{11}{8}$. $\overset{11}{12}$. $\overset{11}{14}$. — $\overset{11}{16}$. $\overset{11}{18}$. — $\overset{11}{20}$.
 $\overset{11}{22}$. $\overset{11}{23}$. $\overset{11}{24}$. $\overset{11}{26}$. $\overset{11}{30}$. Grando $\overset{11}{31}$. — $\overset{11}{2}$. 620.
 Dig. Dec.
 Procella 18. S S E $\overset{11}{4}$. — 30. S S W $\overset{11}{4}$. Maxima sæpe Pruina.

☿ Altitud. maxim. 4. 30. 3. N N E 1. } media 29. $\overset{11}{8\frac{25}{31}}$
 ——— minim. 8. 29. 3. S V V 3x. }
 Dies frigid. 29. 73. N E 1. } media Therm. Altitud. $\overset{11}{57\frac{2}{31}}$
 — tepid. 24. 49. S V V 2. }

Prima Vespera Diei hujus Mensis quinti Cœlum totum, Nube quasi tenui obductum, rutilabat maximè, Lumine velut Ignis triumphalis reflexo: haud minorem utique spargebat Lucem, quàm vel ipsa plena Luna, Nubibus operta. Per dura-

duravit verò mirum hoc *Phænomenon* ad mediam fere Noctem; at longè clarissimè effulsit inter Horam quintam & septimam vespertinam: levem sanè Vulgum haud leviter perterruit; hic tristitia Incendia timens, ille Cœlum deprecans perinde quasi sanguineum. — Aer toto fere Die nebulosus fuerat, ac tepidus, irrorante sæpe Pluviola, præcipuè post Meridiem; vix ullus Ventus: Vesperi verò Nebula ingratum mittebat Odorem; imò per Dumeta fortè tunc perequians, Pluviolæ Guttulis aspersus, insuavem admodum percepi Gustum, ceu ab ingrato Dulcore. — Longè, latèque, insolitum hoc Lumen Septentrionales Europæ Partes illustravit; apud Kilkenniam verò, in Hibernia, Globus quasi igneus, in Aere suspensus, videbatur, eodem Vesperi, per Horam fere; tunc terribili Fragore displosus, Flammas dispergebat undique.

Ad extremum fere Mensis duravit passim Morbus *epidemicus*, jam verò evanescit; plurimi tamen inde conqueruntur de maximo Virium Languore: Aliqui in Icterus, plures in Phthisin incidunt; permulti in Arthritidem & *Rheumatismum* pertinacem.

Quod ad hujus *Epidemici* Curationem attinet; parum certè discessimus à Methodo, quàm Anno MDCCXXXIII. suprà descripsimus: atqui in hoc sanè magis fuit necessaria Sanguinis Detractio, imò & nonnunquam repetita juvit; præsertim urgente Febre, ac sæviente Dorsi, aut Pectoris, Dolore. — At magno certè implicatur Errore quisquis in Morbis hujusmodi ab acri nempe Pituita productis, æquè liberalem Venæ Sectionem imperat, ac in vera Pleuritide, aut Peripneumonia; quod quidem can-

didisse

didissimus notavit dudum Sydenhamius, aliàs utique haud parcus Sanguinis detractor, *Section v. Capit. v.* quem velim ut consulat Lector.

Post Sanguinis Missionem frequentia *Epispastica* admoveri jussi: ex Ulcusculis acerrimi Seri Quantitas planè stupenda defluxit.

Nihil magis in hoc Morbo profuit, quàm blandus, tepidus, per omnia Membra æqualiter diffusus Sudor. Nihil eum ciebat tutius, quàm Serum Lactis vinosum dilutius, tenue Decoctum Eryngii, aut tale quid, epotum tepidè: optimo quoque Successu subinde dedi Misturam ex Sale Cornu Cervi, Succo Limonum saturato, Aqua Menthæ, aut Hyssopi adjecta. Hæc percommodè movebat Sudores; si minùs id quidem, saltem Urinam; porrò mollem semper præstabat Alvum: omni utique Modo Colluviem expellit pituitosam, ac Spiritum reddit expeditiorem, admisto præcipuè Oximelite scillitico. — Elixir asthmaticum le Mortii Tussis Vehementiam lenibat optimè, & promovebat etiam Sudores. — Alvus non solùm per totum Morbi Impetum tenera servanda erat, sed & sub Finem purganda; ne graviora crearent Mala morbida Reliquiæ.

Post Febrem penitùs abactam, obstinatissimi sæpe permanebant Dolores *rheumatici*, quos quidem expugnabant benè *Cathartica Mercurialia*. Nihil tamen inveni præstantius, quàm sequentem Antimonii Præparationem; quæ profectò totam istius Mineralis Potentiam continet: eam ideo (sit Venia Verbo) Antimonii *Essentiam* nomino.

Omnes olim intendi Nervos ut ex Stibio Medicamentum aliquod utile exprimerem; omnes fere Chemistarum & Alchemistarum Processus non exploravi solum, sed & in Ægrotis etiam variis sæpe probavi; plures sanè mirabilis agnosco. Virtutis: hoc tamen affirmo sanctissimè, nihil indè melius, nihil tutius, nihil efficacius, deprehendi unquam, quàm tritum illum, ac simplicem Vitri *antimonialis* Infusum ex Vino albo generoso, Aromate aliquo *Stomachico* adjecto. Possidet enim, experto crede, possidet, totas Antimonii Vires; quippe qui epotus largiter maximas movet Vomitiones, in minuta tantum Quantitate, ad Guttas puta viginti, aut triginta, adhibitus Sudores elicit benignos; paulo tamen majore Alvum solvit leniter: quid potest aliud majus ulla alia Stibii Præparatio? Quamvis autem tantæ sit Virtutis Vinum hoc *Antimonia-*
tum, minutissimis tamen Stibii Particulis, prope dixerim *Effluvis* solum imbuitur: quæ, cum sint inter minima fere Naturæ, angustissima Corporis Vascula permeant facillimè; tantæ verum Efficaciæ, ut vel magnum Canalem alimentarium stimulent potenter, multo magis idè exiles Corporis Canaliculos: ob summam autem Tenuitatem eos minimè lædant.

Hic idè Tibi sisto, Lector bone! Medicamentum, paratu quidem facillimum, at Viribus maximum: in omnibus enim Vasculorum Obstructionibus percommodè exhiberi potest, seu primas expurgare Vias; seu intima Corporis Penetralia detergere velis. Nihil utique ad Sudores excitandos datur aptius, nihil tutius; nam parum admodum excalescit: unde in ipsis Febribus, lentis præcipuè & intermittentibus, adhibe-

adhibetur optimè ; nec non in quamplurimis Morbis chronicis ; in *Rheumatismo* rebelli potissimum. — Id utique spondeo, nullas huic deesse Vires, quas ulla habet Stibii Præparatio, Strophis utcunque pomposis venditata, aut improbo confecta Labore.

Tota Pluviæ Quantitas, Anno MDCCLXXVII.

Dig. Dec.

27. 364.

Brevis Commentatio de Morbis Ictericis.

(A) In Ictero sæviore non rarò *Hæmorrhagias* vidi ex omnibus fere Corporis Meatibus, vix ullis cedentes Remediis ; imò haud citiùs uno Loco Fluxum cohibueris quàm eruperit alio. Id in piissima olim Matrona, tristi admodum Exemplo, notavi, quæ icterica, ac febriculosa, Sanguinem profudit vehementer ex Naribus, Viis urinariis, Utero, Intestinis, tandemque cum Sanguine Animam ! Et si *Hæmorrhagiam*, per breve saltem Tempus, restinximus sæpe ; pro Ratione verò qua Fluxus substitit infrà, eo violentiùs è Naribus profluxit.

Multis abhinc Annis Generosus quidam robustus, Poculis meracioribus Spirituique Vini ardenti nimitum deditus, in gravem incidit Ictericum ; ex quo tamen sanus satis evaserit, si medicis Præceptis obtemperaverit probè : At ille contrà, quòd Gingivæ sæpe funderent Sanguinem, & Dentes essent *Scorbuto* scædati, Medica-

istro cuidam (si Diis placet) ad Dentes se commisit, qui Dentifriciis & Scalpris validè perfricans Dentes atque Gingivas, tantam excitavit *Hæmorrhagiam*, ut eam cohibere, vel valentissimis Stypticis, nequirent Chirurgi in Arte bene versati: sed innumeris profiliens Rivulis Sanguis, seëtis quasi Arterioliis, per omnem undèque Gingivam, sedecim Horarum Spatio Hominem, penè exsanguem, confecit.

Certè nunquam non aliquid subest Periculi; ubi Morbo arquato vexatis accidit profusio Sanguinis; denotat enim acerrimum & maximè solutum Statum Cruoris: quo quidem in Casu, Attenuantia, *Aloetica*, *Volatilia* atque *Chalybeata* exhibere, perinde est ac Hominem jugulare, è contrà Acida, diluentia, demulcentia, Aquæ acidulæ & id Genus alia, juvant maximè. Prodest sæpe plurimùm Seminum Cannabis ex Lacte Decoctum, aut Emulsio ex Seminibus Papaveris albi & Amygdalarum dulcium, post levem Sanguinis Missionem (si Febricula urgeat & ferat Pulsus) & Alvi Solutionem debitam. — Sanè haud scio, annon modica Venæ Sectio æquè necessaria sit in *Hepatitis*, ac consequenter in Obstructione Hepatis cum febriculosa Sanguinis *Diathefi*, atque in *Pleuritide*, aut *Peripneumonia*; præcavet enim graviora Mala, Inflammationes scilicet, *Apostemata* dira, aut *Scirrhomata*.

Est verò alia *Icteri Species*, & (ut ajunt) toto Cœlo diversa, quæ, ab inerte & viscida Bile pendens, diversam omninò poscit medendi Methodum: hîc enim lentus nimis & crassus Sanguis glutinosam valdè, ac vapidam, generat Bilem; quæ tandem Vasa obstruit biliaria, adeò
ut

ut Hepatis obstructio Morbi potius Effectus sit quàm Causa. — In hoc igitur Casu Emetica primò, Cathartica dein Aloetica & Mercurialia desiderantur; Attenuantia tunc saponacea, tartarica, volatilia, tandemque Chalybeata, necessaria sunt: cave tamen sis ne Chalybeata Medicamenta præproperè adhibeas, ante scilicet quàm fluxos reddideris Humores; aliter enim, pro Remedio, immedicabilis forsan Hepatis Scirrhus eveniet.

Atqui hic non possum quin laudem maximè *Tartarum regeneratum*, seu (ut dicitur) *Terram Tartari foliatam*, ut Remedium dissolvens maximè, non solum ad Morbum regium aptissimum, sed ad alios etiam quammultos. — Conflatum quippe ex Acido oleoso subtilissimo Aceti, & Sale fixo Alcalino, fit Sapo quidam mirabilis & penetrans maximè; qui omnibus quibuscumque Liquoribus miscetur promptissimè, vel in ipso *Alcohole* Vini facile dissolubilis: hinc omnia gummata, resinosa, oleosa, viscosa, sive Animalia, sive Vegetabilia, solvit optimè; imò Gummi Lac, Succinum, Myrrham, tenacissima certe Corpora. Unde lentos nimium & glutinosos Corporis Humores potentissimè dissolvit, & Vasorum Obstructiones reserat maximè. Quamvis autem tantas possidet Virtutes, vix ullam habet Acrimoniam: imò, quod mirabere forsan, æquè tutò Pleuriticis, ac ipsis Hydropicis, exhibetur. Eximius sanè Usus est Medicamentorum, quæ Pondere & Subtilitate crassos & lentos Humores comminuere possunt: longè tamen feliciores erunt Effectus Ope Saponis alicujus detergentis, qui glutinosum & pingue resolvat. — Honos sit Corpusculo humano! Utriculi sordidi non æquè

æquè terfi & puri redduntur sola Aqua & Lapidibus, aut Globulis plumbeis, conquassatis, ac si adhibeatur quoque smecticum aliquod Laxivium.

—— Rectè quidem præcedere debet Usus Saponis alicujus Medicamentorum Exhibitionem, quæ plurimo pollent Momento, ut glutinosos incidat Humores eosque *εὑπός* reddat.

Latuit diu Sal hic, sive Sapo, nobilissimus inter Strepitus Fucosque Alchemistarum, recondita Farragine Titulorum celatus; utpote *Sapo Sapientium*, *prima Materia vegetabilis*, *Sulphur Naturæ vegetabile*, *Sal harmoniacum vegetabile*, *Mercurius Naturæ & Philosophorum*, ut apud Lullium, Parisinum, Guidonem, &c. invenies: recentiores verò eum aptiore Nomine, *Aceto radicato* scilicet, & *Terra Tartari foliata* insigniebant; semel etiam apud Lullium in Apertorio suo Terra foliata vocatur. —— Hujus autem Compositio apud omnes consistit in Admixtione intima, ad Saturitatem usque, Salis Tartari fixissimi cum Spiritu Vini philosophico; at nisi Aceto destillato utere, (quod quidem est mysticus etiam quasi Vini Spiritus) nunquam conficies Sal fluens ad Ignem, Cerae instar, in Spiritu Vini rectificato dissolubile, ac in Modum Talci splendens & foliatum: qui tamen apud eos ejus sunt Characteres.

Sed quid in Sterquilinio Gemmas quæram, cum apud illustrem Boerhaavium in Chemia sua, Modus præparandi & Virtutes hujus Salis apertissimè traduntur: subijciam verò & ipse, quod multo minùs volatilis est quàm vulgò æstimatur: imò eousque Igni resistit, donec omne ferè Acidum evaporetur tandem, Sale solùm alcalino fixo manente. —— Ad lenem autem Ignem
liqua-

liquatus pulchriores & splendidiores (argenteas quasi) exhibet Laminas; diminuta tamen aliquantulum medicata Virtute; nempe inde ad igneam Alkali Naturam accedit propius, quod tamen mox corrigitur Acidi vegetabilis pauxillo affuso.

Ad omnes Viscerum Obstructiones, & lentos nimium Humores, hoc Sal mirandæ planè Virtutis esse probavi millies: nam id utique assidue per Annos fere viginti exhibui feliciter. Nec tantum ad hæc valet maximè Sal hoc nobilissimum, sed & vel ipsum Lixivium ex Sale Tartari fixo & Aceto acri confectum detergit, resolvit & aperit potenter: etiam ipsi Veteres, ut * Caius Plinius refert, "Cineres Sarmentorum ex Aceto biberunt ad Vitia Splenis." — Profectò Lixivium ex Sale Tartari & Aceto penetrantius est multo, quàm ex eodem cum Succo Limonum, ob † *Mucilaginis* Copiam, quæ Limonibus inest. — Sed ex Aceto acerrimo & Sale Cornu Cervi *volatili* conficitur Lixivium longè penetrantius, in Febre lenta, ac intermittenti rebeli, pluribus etiam in Morbis, summæ certè Virtutis. — Hic porro dicam in Transcursu, quod Acetum Sali volatili animali, propter Oleum nempe combustum foetidissimo, affusum, cumque eo digestum & destillatum dein, omnem prorsus Fœtorem delet, imò gratissimum conciliat Odorem. Hoc novit olim immensæ Eruditionis, & pro Ævo quo vixit, stupendus planè Vir, Rogerus Bacon, dum Spiritum Capillorum rancidum Aceto depurat; nec minùs fortè Lullius

* Vid. Libri xxiii. Proœm.

† — infra Tractat. de Morbo Colicæ, &c.

Lullius in Præparatione Salis Harmoniac. Vegetabilis. Vid. Testament. novissimum.

Acetum utique plurimi æstimarunt Veteres :
 “ Nam quamvis refrigerandi Vim habet, habet
 “ tamen & dissipandi ; hæc Il Celsus ; ideo-
 “ quæ † Plinius dixit optimè , “ Vini Vitium
 “ (Acetum scilicet) transit in Remedia. “ — Sed
 de hoc fortè plus satis.

DISSERTATIO de Febris lentis Nervosis.

Febris lentæ Mentio passim vel apud Celsum
 occurrit ; Febris utique *nervosa* minùs latine sonat : quoniam verò ea Voce, in isto Sensu, Medici recentiores utuntur sæpissimè, istam retinui ; nam ut Geometræ, Musici, Grammatici etiam, more quodam loquuntur suo, quidni & Medicis liceat ? Veniam certè dabit, vel maximus dicendi Magister, * Tullius. — De Verbo tamen parùm sollicitus, de Re magis laboro : nam cùm hæc Februm Species longè frequentior nuperis Annis (apud nos saltem) quàm alia quælibet grassata sit, Operæ Pretium duxi super hac pauca differere.

Lenta adeò & *nervosa* Febris lentò quodam invadit Gressu, at firmo nimis : hac quippe correpti

Il Lib. v. cap. 27.

† Vid. Lib. xxiii. sub Finem.

* Cicer. Lib. iii. de Finibus, sub Initium.

repti de levi vagoque Horrore, incerto quodam & errante Calore intercurrente subinde; de Lassitudine porro Membrisque quasi fatigatis queruntur quidem, dum obambulant interim, oscitantes tamen & torpidi. Accedunt mox Præcordiorum Oppressio, Nausea, Gravedo Capitis, astricta Tempora, aut Vertigo quædam. Pulsus equidem frequens est semper, at debilis plerumque, ac inordinatus, Calor autem haud insignis excitatur unquam; at sæpe, dum Volæ Manuum uruntur, extrema frigescunt; dum Caput ardet, algent Pedes. Obrepat indies Malum, jamque loqui, aut moveri, piget, ac, vel inopinantes Lecto affixi, vix quo se habent modo exponere valent, aut Sopore nimio detenti, aut Vigiliis mirè anxiis & fere perpetuis. Nihil poscunt interea prorsus, ne vel Potum aliquem. Jam Tendinum Subsultus adest, tremunt Manus, tremunt Lingua, quæ, Muco subalbido obducta, haud multum fere inarescit, nisi media solum in Parte, ubi fusca est valde & arida. Tandem & aliena murmurant subinde & desipientia, furens tamen abest Insania. Tenuem plerumque reddunt Urinam, vapidi instar Vini, aut Cerevisiæ luridam, aliquando limpidam, haud rarò etiam subnigram, subinde paulo crassiolem, inspersa quasi Farina. Breves, inæquales & parum constantes habent Sudores, sæpe frigidulos & glutinosos, sæpe profusos maximè: &, paulo ante Mortem, non rarò gelidos cum Pulsu exili admodum & formicante. Stragula contrectant interim, & inanes quasdam Imaginesprehendere tentant. Jamque Vox Faucibus hærens, Ungues Digitique lividi, Facies cadaverosa, perpetua fere

ac frigida Suspiria, certissimam instare Mortem denunciant.

En hujus Febris dira Facies! quam nervosam ideo nominarunt, quod Nervos potissimum afficere videatur; lentam verò, quod ad Diem vicissimum primum, & ultra sæpe, perduret.

Pestifera semper est, ubi *Aphthæ* nigræ, *Petechiæ* fuscae, lividae, atræ, aut Vibices quasi, apparent; præsertim si accedit Alvus cita, plumbea, nigra, colliquans, aut Sudores oleosi. — Ubi Pustulis, Papulis, aut Maculis, cutim deturpantibus, Febris lenta stipatur, contagiosa est ut plurimum: cum verò *Exanthemata* mali sunt Moris, vulgò audit maligna. Papulæ, rubræ, floridæ, copiosæ, aut plurimæ Pustulæ *miliares* turgidæ, Statu Morbi erumpentes, bona præsagiunt: præcipuè si accedunt Sputa liberalia continua, aut multæ crassæ subsidentes Urinæ. Juvat & tunc Temporis sæpe lenis *Diarrhæa*, blandus persæpe juvat, per omnia Membra diffusus, æqualis tepidusque Sudor: salutaris nonnunquam erumpit Parotis: profunt non raro *Aphthæ* albidæ, benignæ. Convalescentes frequentissimè surdescunt, ac sæpe habent Apostemata in Meatu Aurium salutifera.

Ex Observatione Medicorum, cum Veterum, tum recentiorum, constat sanè, quod putridæ lentæque Febres grassantur maximè, cum humida nimis crassaque Aeris Temperies perstat diu: idque potissimum, si concurrat etiam Calor insolitus. — Quam pluvia fuit, quàm squalida Tempestas, nuperis Annis nemo non norit; & totum Annum 1734. & 1735. inter perpetuas Pluvias & continua quasi Diluvia contrivimus: nec lætis nos solitisque Radiis lustravit Sol æsti-

vus, nec purgavit Aerem hyemale Gelu; depluit Æstate tota, depluit & Hyeme, dum Aer interim, mutata quasi prorsus Natura Rerum, fuit mirè quidem tepidus, at humidus maximè. Hinc lentæ & nervosæ Febres, ac remittentes & intermittentes, fuere frequentissimæ: hinc porrò Loca uliginosa infestant semper. Atque illi præcipuè his corripuntur, qui aut Natura, aut Casu, sunt imbecilliores aut ex Mœrore magno Vim Animi fractam habent, aut qui pravo & crudo utuntur Victu, quales in Carceribus sæpè videmus, vel qui Cucumeres & Melones ingurgitare solent. Omnes autem hæ Causæ Vim Fibrarum enervant, Lentorem inferunt Humoribus, & Perspirationem inhibent maximè.

Atqui Lentor iste longè differre videtur à Glutine Sanguinis inflammati, quod nimio Motu Humorū & valida Fibrarum Vi producitur: hoc quippe Crassamento Sanguinis inhæret, eumque detractum quasi Coriò obtegit; iste verò Lymphæ inest maximè. — Confer Cruorem Pleuriticorum, Rheumaticorum, aut Febre ardente laborantium, cum illorum Sanguine, qui Febre lenta nervosa correpti sunt, maximum utique videbis Discrimen. — Hic dum emitteitur lividus apparet, iste rutilans, hic frigescens parum Crassamenti habet, multum verò Serum obscurum & sæpe turbidum; iste Crassamentum plurimum coriaceum, Serum verò minimum.

Maximam sanè Differentiam Apoplexiam inter sanguineam & pituitosam rectissimè ponunt Medici: haud minor utique videtur inter Febrem inflammatoriam & lentam nervosam. — Prior semper habet Circuitum Sanguinis rapidum valde & fortem, magnum hinc Attritum, ac
vehe-

vehementem inde Calorem, Urinam quoque impensè rubram, unde Sanguis tandem condensatur maximè; ab aucto namque Humorum Motu & valida Vasculorum Oscillatione Globuli rubri, sanguinei, (præcipuæ Partes Sanguinis Calorem foventes) Numero ac Densitate augentur, ob summum Momentum, quo compinguntur Laticis vitalis Principia. — Hæc quoque accidit subitò robustissimis, & gravissimos sæpe infligit Dolores; eos verò aut jugulat citò, aut relinquit: porrò viget maximè in ficcis & serenis Tempestatibus.

In posteriore, Morbus lentè admodum invadit, Vis Solidorum debilitatur maximè, Pulsus adest languidus, etsi frequens, nec acris unquam oritur Calor consistens; si quis accidit, subito subinde Frigore excipitur: tenues plerumque & pallidæ Urinæ fractas Naturæ Vires & invalidam Humorum Agitationem monstrant. — In hoc adeò Statu, propter Defectum Motus idonei Fluidorum, ac Solidorum Inertiam, Globuli Sanguinis rubri dissolvuntur ex facili. — Ita non dolent hæc Febre correpti, ut torpidi quasi & insensiles jaceant, ne vel acriora *Epispastica* sentientes. — Rarò spargitur hic Morbus, nisi per humidam atque tepidam *Atmosphæræ* Constitutionem, raròque corripiuntur robusti & alacres:

Sed juvat hæc agitare paulo altiùs, ut videamus quid in Febribus Natura faciat, aut ferat; idque Exemplo Febris intermittens regularis, cujus Causa haud Dubio Sanguinis est nimia *Visciditas*; quæ ingruente Paroxysmo in Vasculis capillaribus hæret, atque Horrorem, Rigorem, Artuum Pallorem & Unguium Livorem producit: omnia sanè Signa haud dubia obstructi Sanguinis!

guinis! — Jam si Viribus pollet idoneis Natura, Febre ipsa utitur ad Remedium: nam si valida Vis insit Fibris, & non nimia adsit Tenacitas Humorum, accenditur protinus Febris, qua vehementer agitantur brevique comminuuntur crassi Humores, & sic apti redduntur ad permeandum minimos Vasculorum Ramusculos; ita mox omnis expeditur Obstructio, ac consequente Sudore, brevis saltem sequitur Integritas. — Atqui ubi vehemens Vasorum Impetus maximo propellit Momento viscidos admodum, & ægrè cedentes Humores, tantus oritur Attritus atque Calor, ut ardens sæpe, ac continua, excitetur Febris, aut Inflammationes graves: præcipuè ubi magna quoque adsit Acrimonia, aut præposterè exhibentur Medicamenta stimulantia, quæ Sanguinis Effervescentiam jam nimiam incitant. — E contra ubi Vis Vitæ, quacunque de Causa, justo infirmior, haud satis validè protrudit Liquida, hæret usque ad extrema Vasorum impactus Lentor, qui auctus indies Circuitum tandem Sanguinis perdit omnino: nam qui à Febre intermittente pereunt, fere semper moriuntur dum Rigores & Horrores urgent; ab Impotentia scilicet Cordis & Vasorum superandi Resistentiam morbidæ Lentoris. His Sanguinem mittere perinde est ac si trucidentur, illis necessarium omnino. — Intelligitur hinc faciliè, cur Febres sæpe Typum mutant, omnesque fere, diu durantes, Naturam tandem induunt Febris *nervosæ*; nimirum infirmato valde Fibrarum *Elatere*, & conspissatis nimium Humoribus.

Ponamus jam Lentorem residere solum in *serosis* Arteriis, quæ purissimam Seræ Partem, sub Nomine Lymphæ, aut Succi *nervosi*, fecer-

nere debet: debilitata concurrente *Systasi* Fibra-
rum oritur Febris, dicta, lenta, nervosa. Dum
enim in plurimis minimisque his Tubulis inhæ-
rescit obstruens Lentor, plus tenuissimi Laticis
per patentés reliquos urgetur: (nam si omnes
omniñò obstructi sint, Mors instaret protinùs)
inæquales hinc incertique Pulsus, Calores, Sudo-
res, sequuntur. Porro quo diutius in *Arteriolis*
his contortu plicatis (si mavis Glandulis) mo-
rantur lenti Humores, eo acriores fiant necesse
est, donec in Liquamen quasi saniosum abeunt:
quod dum tandem absorbet Sanguis, totam id
demum ejus contaminat Massam. Per multa sic
nascitur Acrimonia, ob Debilitatem tamen Fi-
brarum, Nervorumque Torporem, haud rapidus
excitatur Sanguinis Cursus, aut vehemens inde
Calor, Lentor tamen exin augetur indies.

Sic se forsan Res habet; cum ex recitatis
suprà Causis Fibrae Vasque Corporis infir-
mentur, Sanguinisque retardetur Motus, nec
subiguntur bene Humores, nec probè miscentur:
unde tandem producit Lentor, præcipuè in
Vasculis minimis, ubi tenuissimi fluere debent
Liquores. Nascitur hinc Obstructio in Arteriis
serosis, ultimisque Cerebri Arteriis, inde impe-
dita Lymphæ Secretio, ac quod pejus est, succi
nervosi Inopia: deficit hinc Officio nervosa Pro-
pago, at quæ non inde mala?

Qui secum reputat quanto sanè Molimine
Cerebrum effecit Natura, haud ibit Inficias Suc-
cum nervosum omniñò esse necessarium *OEcono-*
miae Animalis; quo sine profectò Nervi Vim
perdunt prorsus, & Musculi proinde ab his
pendentes: ut videre est potissimùm in Musculis
Motibus *involuntariis* inservientibus, ubi sive

Obstruantur, sive comprimantur, *Nervi parvi vagi & intercostalis*, sive in Cerebro horum Origines, resolvitur illicò omnis fermè Actio vitalis; ac ne vel acerrima meri Animi Contentio, seu ut dicitur *Volitio*, ad Motum hunc restituendum valet Hilum. — Requiritur ideò ad Motum muscularem corporeum hoc Medium; at seu animat, seu irrigat, Nervos, non nostri est hic dicere: id saltem apparet, quod dum ex Lege Naturæ in Nervos Motibus *involuntariis* ministrantes influat perpetim, Actio Cordis, Ventriculi, Intestinorum, &c. rectissimè peragitur, sive vult, sive non vult, Animus.

Quod verò in Febribus lentis *nervosis* insignis adest Obstructio Nervorum liquidò patet; quoniam omnes Corporis Sensus depravantur maximè, vix vident Oculis apertis, perditur Olfactus, perditur Auditus, vix etiam sapidissima gustant: torpent adeò Membra, ut parum admodùm sentiscant vel acerrima *Vesicatoria*, obstructo nimium Sensationis Medio. — Subluridus verò Cutis Color, frequentes Rigores, Torpores, extrema subfrigida, Ulcuscula pallida & desiccantia subito, etiamsi acribus irritata Stimulis, maximum Lentorem, ac impeditum Humorum Cursum, per minutissima Corporis Vascula denotant.

Prætereà cùm parcior fiat Secretio Liquidi nervosi, Actio Solidorum in contenta Fluida debilitatur, adeò ut hac quoque de Causa Lentor augeatur indies, unde major fit assiduè in Vasculis *serosis*, sive *lymphaticis*, Obstructio. Atqui parcius hinc refunditur Lympha diluens Cruori, qui crassior deinceps & acrior evadit, minùsque etiam aptus ad permeandum Vascula minima: Stagnat ideò in extremis *Arteriolis*, & Maculas nigras,

lividas, fuscas, sæpe & Vibices, extrà; intùs verò Gangrænas producit, aut, stagnando diutius, in putrem tandem abit Saniem.

Sufficiant, ac etiam supersint forsan, quæ de *nervosæ* Febris Natura dixi; id saltem apparet, quòd ut omnis fere Febris varii possunt esse Gradus, in Ratione scilicet composita Vis Solidorum, Status Humorù, & Acrimonix Sanguinis, sic quoque & hujus, de qua agitur, maximè: fortè ne quidem in duobus Hominibus omninò similes. Nulla igitur certa & stabilita medendi Regula determinari potest, (hic enim desideratur maximè Medici Ingenium, qui Ægrotis assideat) quæ verò in Genere profit, paucis absolvam.

Si qua unquam in Febribus hujuscemodi mitigandus est Sanguis, id quidem ineunte solùm Morbo, & parca utique Manu, agendum est: ardente namque Febre laborantes facilius multo sedecim Sanguinis Uncias amittunt quàm his correpti Selibram. — Ægri Vires & Pulsus Modum indicant. — Tutiùs longè detrahitur Cucurbitulis scarificatis, meliùsque multo hoc Modo levatur Caput, ac vel ipsa plerumque Pectoris Oppressio; nec si repetatur officit, quod de Venæ Sectione haud semper dicendum est: imò sæpe, vel in ipso Morbi Statu, ubi aut Delirium, aut Coma, graviter urgeat, necessarium est prorsùs.

Pone Aurem utramque, effuso Cruore, *Vesicatorium* acre applicetur, præsertim urgente Capitis Dolore, aut Vertigine. — Post paucas dein Horas exhibeatur lene *Emeticum*, quo & pituitosa Ventriculi Saburra, ac biliosa Colluvies, ejiciatur: hoc quoque efficitur, ut universum Vasculorum *Systema* agitetur validè & concutiat, atque

atque inde expellatur inhærens Lëntor. — Ideò autem, Horis aliquot ante Vomitum, *Vesicatoria* admoveo, ut, exteriora Capitis ac Cervices irritando, plus Sanguinis per externas Carotides eliciatur, minùsque adigatur Lëntoris ad intima Cerebri Vascula Actione Vomitionis. — Quid possunt *Epispastica* pone Aures ad Cerebrum levandum videmus quotidie, præcipuè in Puerulis, Distentione Nervorum aut Comate laborantibus, ubi scilicet Ulcuscula desudantia pone Aures desiccantur subito; his enim Vesicantia applicata Humores extrahunt iterum, Morbumque discutunt protinus.

Si Alvus post Vomitum non responderet, leni injecto *Enemate* ducenda est, idque etiam in posterum tertio quoque Die: ubi enim indurata Stercora in Intestinis hærent, *OEconomiam* animalem mille Modis turbant; maximè si his infarciatur Rectum, imam premunt *Aortam*, & liberum Sanguinis Descensum per *Iliacas* Arterias impediunt, unde plus justo ad Cerebrum ruit. Adde quod *Enemata* è Lacte saccharato potissimùm, Tepore emolliente ima Viscera foveant, & plus Sanguinis alliciunt eodem, unde Urinam quoque optimè movent.

Nunquam quidem non juvant *Epispastica*, per totum Morbi Decursum, ita ut desiccantibus priùs applicatis admoveantur alia: his enim Vasculorum Oscillatio incitatur, subtilissimo etiam Sale lentos incidunt Humores, eosque tandem exprimunt. Vellem, semper ut ingruente Febre, præsertim ubi Caput graviter petit, applicetur derafo Occipiti *Vesicatorium*: nam eodem fere Modo, quo pone Aures agit, nec tamen ita asperos excitat Dolores, dum ad Delirium præcaven-

cavendum interim facit maximè. — Sanè ita non cruciant in hoc Morbo *Epispastica*, ut, gravem ob Stuporem, vix sentiantur: imò quo magis inflammantur, ac dolent, eo plerumque major Spes Salutis effulget.

Quod ab extrà Vesicantibus molitum est, id intùs quoque Medicamentis idoneis tentandum est. Profunt maximè Attenuantia dicta, & quæ blandè torpidos excitant Nervorum Ramusculos; laudo potissimùm Cinnabar & lenia *Alexipharmaca*, *Cephalica*, qualia sunt Lap. Contrayerv. Confect. Raleigh. Sal. Succin. — C. C. Sp. Lavend. C. Spir. volat. oleos. & Camphora præcipuè, quæ & ipsa quasi Sal quoddam, *volatile* oleosum est: ex Salibus enim penetrantissimis, subtilissimo Sulphure involutis, constans minutissima Corporis Vascula permeat crassamque digerit Lympham, ac lentos dissolvit Humores: salutiferos hoc Modo excitat Sudores, ac (Galbano, aut Silphio adjecto) Somnum sæpe vel Opio feliciùs conciliat, eoque potentiùs Deliria fugat.

Nihil sanè utilius est, in hac Febre, quàm lenes movere Sudores per totum Corpus; hoc Modo enim brevi discutitur Morbus, aut paulo pòst in remittentem, aut intermittentem, mutatur. Debet autem per omnia Membra æqualiter diffundi tepidus Sudor; five enim brevis est admodùm, aut frigidus, aut circa Caput tantùm & Cervices, mali Morbi Signum est: per Sudores autem mox inhorrescere pestiferum est, blandus autem & æqualis Sudor Spiritus recreat.

Sed ubi *Epispastica*, ac Attenuantia, adhibentur,

tur, diluendum est affatim Potione tenuissima, miti, at detergente leniter; Sero Lactis nempe Canariensi, aut Xeresano, dilutiore, Decoct. Lusitanic. — Eryngii, Infusione Salvix, &c. ut crassiores nimirum eluantur Sales, ac debitus subministratur Sanguini Latex, qui aliter, perpetua liquidissimi Exhalatione, in merum penè Gluten brevi abiret. — At rarò admodum convenit Aqua pura, frigida, quam tantoperè suadent nonnulli: haud multò facilius namque cum Sanguine miscetur, quàm cum Aqua Oleum, nisi mediante Saccharo, aut Sale aliquo *essentiali* Plantarum. Vidi aliquoties & Febre ardente, imò & *nervosa* etiam Febre, laborantes, meram Aquam perpotantes frigidam, qui mox per Urinas eam reddidere limpida omninò, & nullo fere Modo mutatam ——— nã magno suo cum Damno.

Septimo, nono, vel undecimo, Febris Die, nonnunquam & decimo quarto, Papulæ rubræ, aut Pustulæ *miliares*, aliave *Exanthemata*, erumpunt sæpe, morbumque levant apprimè; præcipue si florida hæc sunt, ac illæ vividæ & turgidæ. — Quam maximè tunc cavendum est à Frigore, & lenia subinde porrigenda sunt *Cardiaca*, quæ Naturam adjuvent ad lentos acresque Humores exterminandos, qui, in ultimis *Arteriis* cutaneis hærentes, Pustulas has formant. *Exanthemata* fusca, livida, nigra, pestiferum Morbum indicant, Sanguinemque corruptum maximè, ac in Saniem fere conversum: in hoc Statu profectò Sanguis ita dissolvitur, ut Alvi Dejectiones sanguinolentæ sint, ac saniosæ, sæpissimè; imò Cruor è Venis emissus vix, ac
ne

ne vix quidem, in Coagulum abit, notante doctissimo Listero.

In Casu tam deplorando mox confugiendum est ad *Alexipharma*ca astringentia, acida, qualia sint China Chinæ cum Radice Serpentariæ Virginianæ, Elixir vitrioli Mynsichti, Tinctura Rosarum, Vinum rubrum ustulatum (ut dicitur) &c. hæc enim ad conservandam Vim Fibrarum & *Crasin* Sanguinis apta sunt maximè. — Valet plurimum ad Gangrænas sistendas Cortex Peruvianus, ut nuperis inventum est Experimentis, eumque ad Humorum Putredinem arcendam cum *Alexipharmacis* & Acidis conjunctum utilissimum esse certò comperi. — Vix fortè in tali Casu nobile magis datur Ἀλεξήριον, quàm Vinum austerum cum Aromaticis coctum: tutius enim & efficacius Vires erigit, quàm Spiritus Vini ardentes, quantumvis *Pharmacis* aromaticis imbuti, & Nomine Aquarum *cardiacarum* nobilitati.

Jusculis interim tenuioribus, *Panatellis*, *Gelatinis* de Sago, Cornu Cervi, &c. nutriendus est Ager, sæpe quidem, at paulatim, in tanto nimirum Periculo vix ulla alia Spes est, quàm ut, Impetum Morbi trahendo, aliquis effugiet, porrigaturque in id Tempus, quod Curationi Locum præstet.

In Statu Morbi porrò, aut paulo pòst, *Aphthæ* non rarò imas Fauces & Os totum occupant; pessimæ utique si nigræ, neque Periculo vacant si supra Modum albidæ! Modò ex imo Gutture ascendere videntur, modò per totum Canalem alimentarium descendunt, ac Singultum, *Diarrhæam*, aut *Dysenteriam*, excitant: quicquid est difficillimam sane *Crisin* plerumque denunciant, potissimum si *Dysenteria* & Singultus accidunt.

Melius

Melius est longè cùm *Salivatio* copiosa oritur ; sæpe profectò hoc modo solvitur Febris, Lentore morboſo nempe per Glandulas Salivofas exant-lato. — Ubi *Aphthæ* oriuntur, creberrimè gargarizandum est emollientibus & detergentibus, ex Ficu, Mulſo, Decocto Raparum, &c. dan-dum verò interdum est Rhabarbarum, maximè ſi Alvus cita & torminoſa urget, adjecto aſtringen-te aliquo aromatico cum abſorbentibus. Poſt omnem autem Gargarizationem in Ore contineat paululùm, & mox deglutiat lentè, tenuem è Se-minibus Pſyllii & Cydoniorum *Mucilaginem*, Sy-rupo Mororum aut Rubi Idæi admixto : fovet hæc optimè, ac ſanat Ulcuſcula.

Haud rarò Pituita tenax admodum totas adeò opplet Fauces, ut Strangulationem penè minitetur : hic utique nihil magis opportunum eſt, quàm levi *Emetico* Vomitus ſolicitare le-niter, idque ſanè quocunque Tempore Morbi. Mirum eſt quantum Levamen hoc affert Egro-tis, quàm immenſa Viſ glutinoſæ Colluviæ, Al-bumen Ovorum referentis, ac sæpe vel eo multo craſſioris, ejicitur : imo mox sæpe *Aphthæ*, Coma, Nauſea, Singultus, Linguae terrifica Ni-grities, faciunt, ut obſervavit olim diligentifſimus *Sydenhamius*; quod quoque Ego vidi mul-toties.

Nec minus utilis eſt lenis Alvi Purgatio ſub Morbi Finem, interpoſitis ſubinde *Cardiacis* & *Paregoricis*; hæc enim evacuat putridam Mor-bidamque Colluviem, per Arterias *meſeraicas* in Intestina depoſitam, *Criſinque* Naturæ, utcunque imperfectam, promovet : imò facit sæpe, ut Febris, quæ huc uſque nullum certum ſervabat Ordinem, remittentis planè, aut intermittentis, Typum

Typum induat , Locumque præbeat Medicamentis idoneis. — Atqui ita non *Diarrhœam* , aut *Dysenteriam* , quas tantoperè timent nonnulli , inducit , ut hoc Modo præcaveantur optimè. Fœda namque Eluvies , diutiùs in Visceribus restitendo , magis fit acris , magisque , assiduè , & eorum Tunicas extimulat maximè ; imò eas corrodit tandem ; ac vel funestam parit *Diarrhœam* , vel *Dysenteriam* , horrendam : partim insuper per Venas Lacteas resorpta diarras iterum Turbas in Sanguine movet . Ut his ergò occurram Malis , Mihi in Usu est frequentem , ac modicam , Rhabarbari Dosis exhibere , alternis saltem Diebus : nimium intereà Alvi Motum (si Opus est) astringentibus Aromaticis , atque *Anodynis* , rapprimere solco .

1870
The first of the year was a very
successful one, and the business
was very good. The second of the
year was also very good, and the
business was very good. The third
of the year was also very good,
and the business was very good.
The fourth of the year was also
very good, and the business was
very good. The fifth of the year
was also very good, and the
business was very good. The sixth
of the year was also very good,
and the business was very good.
The seventh of the year was also
very good, and the business was
very good. The eighth of the year
was also very good, and the
business was very good. The ninth
of the year was also very good,
and the business was very good.
The tenth of the year was also
very good, and the business was
very good. The eleventh of the
year was also very good, and the
business was very good. The
twelfth of the year was also very
good, and the business was very
good.

OPUSCULUM

DE

MORBO COLICO

DAMNOSIORUM,

eoque maximè Epidemico,

Anno MDCCXXIV.

O

PRÆ

MISSISSIPPI

MISSISSIPPI

MISSISSIPPI

MISSISSIPPI

MISSISSIPPI

PRÆSTANTISSIMO VIRO,
JACOBO JURIN, M. D.

Collegii Medicorum LONDINENSIS

E T

REGIÆ SOCIETATIS
Socio,

JOANNES HUXHAM, M. D.
S. P. D.

TUO potissimum Hortatu, Vir clarissime!
Opus suscepi meteorologicum, quod jam
perfeci: Tibi adeò debetur, si quid inde sit
Utilitatis Publico. — Officia certè in Me plura
contulisti olim, quorum Ego semper memor,
hoc Tibi Opusculum, grati Animi Monimen-
tum, dedico.

Valeas diu multumque

ID. NOVEMB.
MDCCXXXVIII.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
CHICAGO, ILL.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
CHICAGO, ILL.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
CHICAGO, ILL.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
CHICAGO, ILL.

D E

MORBO COLICO

DAMNONIORUM, &c.

INEUNTE Autumno, Anno MDCCXXIV.
Damnonios undique afflixit Morbus maximè
Epidemicus, inter Popellum præcipuè sæviens,
& in Hos, quibus minùs lauta fuerat Ratio vi-
vendi. Hujus & Historiam & Medicinam per-
scribere haud erit forsan prorsùs inutile; quoniam
etsi non ita vehementer & multo minùs popula-
tim, tamen omni fere Autumno hanc Regionem
plùs, minùsve, infestat.

Exorsus est hic Morbus ab Angore Ventriculi
summo cum Dolore in *Epigastrio* vehemente,
Pulsu debili & inæquali, Sudore frigidiusculo:
Lingua interim Muco erat obducta subviridi,
aut fusco, Halitus autem foetidissimus. Subse-
cutus est Vomitus enormis, ut plurimùm Bilis
viridissimæ, nonnunquam atræ, magna semper
Pituitæ, quam maximè acidæ ac valde tenacis,
comitante Copia: imò Colluvies, rejecta Vomitu,
sæpe adeò acris erat, ut, Gulam Faucesque ex-
coriando, foret inde sanguinolenta, ac Dolorem
inter deglutendum excitaret. Hisce per Diem
unam, alteramve, persistentibus, accessit Alvus
adstricta admodùm, nec *Catharticis*, *Spasmodicis*,

nec acerrimis Clysteribus respondens: his quippe sine Flatu aut Stercore rejectis, illis Vomitu.

Imminuta tunc paululùm Vomitione descendebat Dolor, at Umbilici Regionem atrocissimè torquebat, Lumbos Spinamque Dorsi crudeliter; ita ut Paroxysmo *nephritico* Ægrum laborare crederes, eoque magis cum & jam etiam urgeret Urinæ suppressio, at perpetua mingendi Cupiditas imò vexabat sæpissimè molesti cujusdam Ponderis in *Perinao* Sensus, velut incumbentis Calculi. ——— Talem in Colicis Urinæ difficultatem jamdudum notavit Aretæus Cappadox, Capit. de Colicis: Νεφροὶ καὶ Κύστις συμπαθεῖα Πόνω καὶ Ισχυρίῃ τετέοισι ἄλλα αὐτ' ἄλλων. Sic Hippocrates Περιήρροισι τραγυχειώδεις, & νεφρικοὶ, ἄλλα τετέοισιν αὐτ' ἄλλων ἄλλα, Epidemic. Lib. I. Sect. II.

Urina verò erat Lixiviæ instar, quæ mucosa, rubra, non rarò subviridia, deponebat permagna Quantitate. Abdomen plerumque durissimum & maximè tensum Ægrotos, ne rumperetur scilicet, anxios sollicitavit: erant è contra quibus, *Spasmo* maximè contractus, vix ullam Sui Formam reliquisset Venter: hoc autem rarius. Sæpe Dolor fixus, vehemens, urens in dextro *Hypochondrio*, ubi etiam & Tumor & Durities. In *Epigastrii* Regione magna sæpe & molesta Pulsatio. Quandoque Alvus vel proprio irritata Onere (quod rarò admodùm) vel Medicamento fuit, durissima *Σκυβάλλα* ex viridi nigra, globosa, parva Ovium Stercora referentia, reddidit; post duas dein, tresve, Dejectiones, virida, vel nigra, nonnunquam Cruore mista, Tenesmum excitantia permolestum: at Alvus substitit protinùs, quæ post Horas aliquot Arte iterùm irritata tales

tales rursum Globulos, læves, durissimos, de-
jiciebat.

Hæc fuit prima Morbi Facies; at nec dum
desæviit Tragœdia, nec hic Finis Malorum:
quamvis enim cessaverint paululum dira Ventris
Tormenta, relicta verò Cutis Teneritudine sum-
ma, Tactus fere impatientis, jam tamen auge-
tur Dolor per totam Spinam summos Humeros
adusque immaniter excrucians, inter Omoplatas
potissimum; brevique inde Brachia invadens
Juncturis præcipuè defixus hærebat, Motumque
destruebat Manuum prorsus. — Nec Femo-
ribus, nec Cruribus, contigit Sors multo melior;
utpote quæ torqueret Cruciatus acerrimus, me-
diis quasi Ossibus inhærens, Lue veluti venerea
affectis: rarissimè autem Artuum vel Rubor, vel
Tumor, ullus.

Dum ab Intestinis ad Membra Exitum sibi
pararet morbida Materia, Pulsus vibrabat for-
tior, atque febricitabant leviter Egroti. Non
nulli etiam, hoc Morbi Statu, delirabant, cujus
constans fere Indicium fuit Urina aliquanto lim-
pida; & (quod notatu dignum) si per totum
Morbi Decursum Urinam pallidam sine Sedi-
mento reddidissent, hos subito corripuit vel
Distentio Nervorum, vel Delirium, aut Ma-
nuum Paralysis: nunc cum, nunc sine, Dolo-
re.

Cum jam Morbus occupaverat Artus, Sudor
multus foetidus, acidum spirans, Dolores leni-
vit; &, si quis Dolor Ventris etjamnum perman-
ferit, eo diffuente evanuit. Aliqui Sudore lon-
go, maximo, digesti Motum Usunque Manuum
amittere penitus; Tactu solum manente: Dolo-
ris miserum solamen Paralysis! vix ullum autem
memini, hoc Morbo laborantem, Pedibus paral-

yticè captum. — Aliquando cum Sudore benigno plurimæ eruperunt Pustulæ rubræ, prurientes, ac sæpe molestissimè urentes, æque per totum fere Corpus; quo nihil auspiciatius: nam his erumpentibus & Dolor *rheumaticus* & colicus se mox subduxere. — Hic fuit equidem optimus Morbi Exitus; at frequentius longè colicum Dolorem excipiens *Rheumatismus*, *Rheumatismum* Viscerum Tormenta, alterna Vice, miseròs diu mactabant, Morbo nunc ad Artus, nunc in Intestina translatò.

Interdum Cruciatu per Dies aliquot cessantes æquè vehementer recrudescebant; præsertim ex levissimo Frigore suscepto, vel *Cerevisia*, vel Vino Pomorum hausto. Icterus nonnunquam erumpens Colicem hanc pro Tempore solvit, quo recedente mox redibant Dolores. — In uno & altero Casu verus permanens Icterus hunc Morbum absolvit prorsus, manente tantùm quadam Artuum Molestia.

Tametsi Dolores colici *rheumaticos* sæpius præcederent: frequenter autem Artus primùm adoriëbatur Morbus, dein, *Metastasi* facta, Stomachum & Intestina, more descripto. Cauponem quendam novi robustum miro planè Modo correptum, cujus Brachia Manusque resoluta vix ullum Motum, ne vel levissimum Pondus movendi Potentiam, retinebant; nullo tamen præcedente Morbi Symptomate, nec per Diem unum, alterumve, insequente ullo, nisi quod solito fuerat languidior: paulò pòst autem Vomitus Ventrisque Dolor consequebantur, tandem etiam Membra paralytica Angor *rheumaticus* torfit.

Aliqui,

Aliqui, at perpauci, diù multumque hoc Morbo afflicti, Insultibus demùm epilepticis correpti, Fato succubuerunt: sed, ut vera dicam, seu Morbi Frequentiam, seu Durationem, seu Vehementiam denique, respicio, miror valdè tam paucas Hosti huic diro occubuisse Victimæ.

Crudelissimè sæviit hic Morbus fremente Aquilone, quod & de Variolis, tunc Temporis, grassantibus observavi.

Quibus fusiolem dederat Alvum Natura longè minus ab hoc *Epidemico* passi sunt, quàm quibus astrictam: hinc fortè Ratio petenda est cur Pueros (quos cita plerumque Alvus exercet) haud æque violenter ac Adultos excruciauit.

Perduravit Colica hæc *epidemica* ab Autumno ad Ver sequens; Vere autem vigente sensim abiit.

En hujus brevem, sed accuratam, Morbi Historiam: qui usque adeò inter Vulgum grassatus est, ut Anno MDCCXXIV. omnes fere Plebeculæ Familias invaserit. Quid quòd in una eademque Domo quinque vel sex ex hoc Morbo decumbentes numeravi sæpissimè; atque meherculè vix credo Colicum Morbum tam *epidemicum* extitisse antehac unquam: nisi fortè quem Paulus Ægineta Lib. iii. Cap. 43. sub Finem memorat: qui & nostro, quod ad quædam saltem Symptomata, haud fuit longè absimilis.—Hic ideò istius Descriptionem ex Paulo proponam: “ Ἀρξαμένου μὲν τοῦ Πάθους ἀπὸ τῶν κατὰ
 “ τὴν Ἰταλίαν Χωρίων καὶ ἐν ἄλλοις δὲ πολλοῖς τῆς τῶν
 “ Ῥωμαίων Πολιτείας, &c. i. e. quùm Morbus
 “ quidem ille cœpisset (Colica scilicet ab acribus
 “ & vellicantibus Humoribus) à finitimis Italiæ
 “ Regio-

“ Regionibus ; & alia pleraque Loca Romani
 “ Imperii , instar pestiferæ cujusdam Contagio-
 “ nis peragrasset ; unde non paucis quidem in
 “ Morbum Comitialem , aliis verò in Membro-
 “ rum Resolutionem , superstitè tamen & incolu-
 “ mi Sensu ; nonnullis autem in utrumque delap-
 “ sis : magna Pars eorum , qui ex hac Ægrimonia
 “ in Epilepsiam conciderant , Vitam cum Morte
 “ commutabant ; quorum verò Morbus in Pa-
 “ ralyfin transierat plerique evaserunt , proinde
 “ atque in Crisi , Translatione Causæ . ”

An fortè Morbus hic *epidemicus* à peculiari quadam Aëris *Diathefi* Ortum aliqua ex Parte duxerit haud scio ; quandoquidem Cœlo sicco , vel humido , flantibus Austris , Boreave flante , æquè frequens sævierit . — Tempestate quidem sicca & rigida , furente Cæcia , vel Aquilone , Tormina fuisse atrociora notavi : hoc verò accidebat forsan propter diminutam *Perspirationem* , & Alvum redditam magis compressam ; ad divini Senis Effatum , αἱ καὶ Ἡμέρην κατασάπες ῥόγμοι τὰς κοιλίας ἐνθαίνον . Aphorism. xvii. Sect. iii. Edit. Hollerii . — Quomodocumque autem hoc sit , vix credo ullum esse , qui hunc Morbum inter contagiosos recensebit : nisi & idem ille omnem Morbum vulgarem dixerit esse contagiosum ; quod neque Vis Vocis fert , neque Norma loquendi . — Nascuntur sanè Morbi *epidemi*ci à communi aliqua Causa , *Atmosphæræ* putà Corruptione , Cibo , vel Potu noxio : sæpe tamen minimè ab ullo *Miasmate* Morbum ab Ægro hoc illi Sano inferente .

Fuit equidem , ni fallor longè , Causa hujus Morbi manifesta maximè ; tanta scilicet , tamque incredibilis Pomorum Copia isto Anno abundans ,

dans, quanta vix unquam visa post Hominum Memoriam, nostræ saltem ubique Regionis. Pomi nimium onustæ Ramos propendentes, Fructu fere ad Fracturam usque gravatos, carpenti, Pondusque auferenti, quasi porrexere. Pretio vel vilissimo tot emisisses Poma, quorum Succo expresso etiam implevisset Culeum, Saccosque refertos vel ipso colligendi Labore habuisset aliquis. Coloni plures, impiè ingrati, benignissimo NUMINI, quasi prodigo, obmurmurantes Vim Pomorum immensam Porcis objecerunt. — Sed & hoc etiam Porcorum Genus malè tulit Pomorum Ingluviem: contabuerunt enim omnes & periire plures. — Aliqui magis fortè pii, etiamsi haud satis sobrii, Vini pomosi totas exhausèrunt Amphoras; imò quosdam, vel Mercede conductos, ad bibendum invitarunt, ne perirent nempe Dei Dona, & novo iterum, iterumque novo, replebant Cados. Grata forsan temulento Baccho Libamina, at summo Deo Hominum Patri minimè probanda! — Certum est tunc Temporis undique comparata Vasa, & ex omnigeno fabricata Ligno, vix, ac ne vix quidem suffecisse ad enormem Pomacei Quantitatem continendam.

Cum ergò Horti tantum ubique Pomis exuberaverint, Victum fere omnem Popello supeditaverunt. Poma variis Modis cocta & præparata omni fuere Cibo, ex his Vinum (Mustum utique rectius dicerem) omni Potui: hoc enim *Cerevisia*, etiam tenui, vilius, vel ipsa Aqua non multo carius, utraque longe gratius, læta Plebs hausit affatim futuri nescia Periculi.

Diuturnum & continuum Cibi Potusque pomosi Usus dicam, an Abusus? Causam fuisse huius Morbi nullus dubito; quia Neminem vidi eo correptum, qui se his abstinuerat: nec de meliore Nota Homines, opiparè viventes, attigit; utpote qui viliora (uti mos est) contemnentes rarò hæc degustabant; vel, si id quidem fecerant, plurima Carne & Aromate vescentes, & Vina generosa potantes assiduè, crudis noxiisque Pomorum Qualitatibus occurrebant brevi.

Longa certè fuit Observatione notatum, quòd abundantibus Pomis Morbi torminosi plurimos infestant: adeò ut his in Oris sint quasi & *endemi* & *epidemi* omni fere Autumno; &, ut olim cecinit Horatius, sentiunt. — *pomifero grave Tempus Anno*, Lib. iii. Od. xxiii. Bene memini Anno MDCCXXII. eo etiam maximè pomifero, Morbum Colicum & *Rheumatismum* plurimùm sæviisse, at huic, modò descripto, sive Vehementiam reputo, sive Numerum, illo laborantem, minimè comparandum. Hoc idem ipsum Annis MDCCXXVIII. & MDCCXXX. Pomorum etiam maximè feracibus, observavi: fuit autem notatu dignum, *Diarrhæam* tunc longè magis increbuisse, quàm Anno MDCCXXIV. quæ Colicem ac *Rheumatismum* levavit plurimùm; acri nempe acidoque Pomorum Succo nec diu in Intestinis, nec in Sanguine, restitante, sed per Alvum protinùs ejecto. Anno autem MDCCXXXIV. Pomis quoque uberrimo, rarior fuit *Diarrhæa*, at Colica sævior longè, cui frequens successit Brachiorum Paralysis.

Illud interrogari me posse ab aliquo, scio; unde fit, cur Succus Pomorum, uno Anno, adstrictam cum atroce Dolore, alio autem, vix aliquo

aliquo insigni Tormine comitante, Alvim valdè solutam creat. Cui certè vix habeo quod respondeam; at ille mihi explicet velim, cur hoc citiùs longè, quam illo Anno, Poma vel Generis ejusdem, &, quod ad omnia, quantum Sensu saltem dignoscere potest, similia putrescunt: quod tamen sæpius observatur. — Hoc tantum, quod omnibus forsan satis notum est, monebo; Poma quo mitiora, eo certiùs Alvim solvere, ideoque quo magis humida fuerit & calida Tempestas, eò Poma & omnes Fructus Autumni esse mitiora, & ad Putrefactionem, & ad Alvim solvendam, magis apta: quod Observatio Tempestatum confirmat abundè.

Jam verò sequitur, ut Musti pomosi Naturam paucis exponam. — Humor ex Pomis (vel & Uvis) recens expressus Sale *essentiali* acido, & valde crasso, sive *Tartaro*, abundat, plurimis porrò terrestribus Particulis, multo, sed impuro, Sulphure. — Quanto acerbior Fructus, tanto crassior & copiosior Sal *essentialis*, ut in Vino Mosellanico & *Pomatium* nostro manifestum est; hoc ad Fundum demittente *Tartarum*, mucosa Fæce gravatum maximè, illo ad Dolii Latera Salis ejusdem *tartarei*, sive *essentialis*, plurimum seponente. Nec certè longè differt Vinum Rhenanum à *Pomatium* generoso, nisi quòd hoc multo plus *Mucilaginis* habeat; quippe quorum Salia nativa videntur maximè congenera, etiam *Microscopio* conspecta ejusdem sunt planè Figuræ: atqui utriusque Salia nonnisi post longum Tempus comminuuntur ita, ac subiguntur, ut Liquor pomosus ad Potum aptus reddatur, aut salutaris. — Imo *Pomatium* ex Pomis agrestibus & acerbis expressum, vix nisi secundo, vel & tertio demum

demum Anno, aut Potioni gratum, aut salubre tandem evadit.

Utravis horum mustea si bibis affatim, Doloribus colicis & *rheumaticis* certo certius vexabere; nec Arthritidi obnoxii hæcce hauriunt impune, quippe quos protinus corripit Paroxysmus. Nec graviores Poenas luunt bibaces Germani, ad Ripas Rheni & Mosæ Incolæ, Se Vino *tartareo* ingurgitantes, quàm Nostrates *Pomaceum* avidè perpotantes: ibi enim & hic Arthritidis Morbus est *endemicus* & maximè communis; neque tot uspiam, etiam inter Plebeculam, Podagra laborant, quot in Damnonia Provincia, ob *Pomaceum* notissima. Ac credere fas est, Morbi hujus Frequentiæ Causam fuisse multum & continuum Vinorum Usus, *Tartaro* maximè abundantium, qualia sunt Vina Mosellanica, Gallica, & *Pomacea* nostra: ex quo enim horum invaluit Usus, longè magis quàm antè increbuit Arthritidis. Vinum Burdegalense, præsentis Ævi Delicias! haud magni fecit Ætas elapsa; & decuplo Plus *Pomacei* nunc factum & epotum est, quàm Annis abhinc triginta.

Si quis verò dubitat fortè, an Multo *pomaceo* tanta Vis insit *Tartari*, experiatur ipse, Modo ab Angelo Sala optimè descripto (*Mucilaginem* nempe à Succo abstrahendo) quanta Copia Salis *essentialis* ab eo colligi potest: inveniet utique permultum. *Pomaceum*, more Vini Rhenani, *Tartarum* ad Latera Cadorem haud equidem sponit; hoc autem ejus Defectus minimè Argumentum est, cum nec vel ipsum Vinum Rhenanum, nisi postquam mucosam & terrestrem Fæcem Fundo demiserit, ad Vasis Latera *Tartarum* rejicere possit. ——— Pari Ratione Vina
Hispa-

Hispanica nullum Cadis *Tartarum* dant, ob nimiam scilicet oleosam & tenacem Colluviem, qua irretitur. Nec ulla Arte separari potest Sal Citrii, sive Limonis, ab Humore suo expresso, Sale tamen acido, si quis alius Succus vegetabilis, maximè scatente; utpote qui permulta *Mucilaginis* Quantitate implicatus: quod & laudatus Sala in *Tartarologia* sua dudum annotavit, & ipse experiundo verissimum esse didici. —

At *Pomaceo* novello plurimum inesse *Mucilaginis*, Argumento est Lentor iste, quem contrahit, Olei instar, si vel nec debite fermentatur, nec saturatur satis Sale actuosò, *Mucilaginem* sulphuream attenuante: hujus etenim Defectu, *Pomaceum* ex mitioribus Pomis, intra Anni Spatium in Liquorem viscidum & pendulum quasi certissimè convertitur. Porro fere semper observamus, quod, dum Mustum pomosum in Cupis ad despumandum asservatur, Pelliculæ tenaces formantur, quas Coria putrefacta esse crederes: similes etiam Doliorum Lateribus adhærescunt.

Videamus jam breviter, quid Mali nostris infert Corporibus Succu Pomorum crudi, nec fermentati probè, nec defæcati, Ingurgitatio: De Musto differentem audiamus Hippocratem, Lib. ii. de Vict. Ration. Γλεῦκος φουσᾶ, ἢ ὑπάγει, ἢ ἐκταράσσει Ζέον ἐν τῇ Κοιλίῃ, ἢ διαχωρεῖ. φουσᾶ μὲν, ὅτι θερμαίνει, ὑπάγει δὲ ἐκ τοῦ Σώματος ὅτε κατὰίρει, ταραράσσει δὲ Ζέον ἐν τῇ Κοιλίῃ ἢ διαχωρεῖ. — Succus Fructuum ὡραίων citò fermentat, inter fermentandum Aer Musto permistus dilatatur maximè, ut vix Doliis firmissimis coerceri possit. Si quis ergo Vinum musteum hauserit avidius, in Ventrículo & Intestinis fermentet vehementer necesse

ter necesse est; hæc dein Flatu distendat valde, torqueat, excruciet; Ope Caloris namque Fermentatio & Aeris Rarefactio augetur maximè: at Mustum fermentans vix continent roburnea Vasa, quid non inde Malorum Intestina hocce referta passura esse credamus? Nec mirum utique hæc consideranti, si Historia medica funestissimos Eventus, Intestina nimirum ab indomabili Gas, sive Flatu, disrupta denarrat.

Nec Ventriculo & Intestinis solum nocet fermentans Mustum, quatenus Aere furibundo turgidum; habet insuper stimulandi & abstergendi Vim summam: nam vix aliquid Musto magis smeeticum datur, fere Cuticulam ejus abrasit, qui Musto Manus abluit. Cuique Anatomia vel leviter imbuta notissimum est, Intestina Muco quodam blandissimo oblita esse, quem (non hic solum, sed alibi) ad fallendam Ingestorum Acrimoniam providens secrevit Natura: hunc autem abstergit penitus nimius Succus saponaceus Usus, qualem maximè præstant Fructus *ωπαίου*. Hinc Vomitus. Cholera, *Diarrhæa*, *Dysenteria*, ex horum Ingluvie: deterso enim Viscerum Muco, Munimine quasi Tunice nervosæ, ea quidem minimæ Acrimonie impatiens, nedum Salium crassiorum, quibus abundant tales Fructus, & horum Aculeis lancinata undique, cruciatur admodum. Atroci adeo Dolore percita Intestina, Motu eorum *peristaltico* plurimum adaucto, Hostem infensum valde expellere omni enituntur Ope. Sequitur dehinc Vomitibus enormis & Alvus citissima; at fausto ut plurimum Omne Inimico aufugienti patent Portæ: incarcerato autem fermentante Humore, Interanea tam validè distendit, ut nec se contrahere, nec Motu *peristaltico*

acres

acres & furibundos Humores depellere queant: Vesicæ urinariæ ad Modum, nimia distentæ Urina, quæ se exonerandi omnem Vim perdidit. Horrendus hinc oritur Dolor, deinde Intestinorum Inflammationes, quas citò vel Gangræna, vel Disruptio, excipit, ni promptum adhibeatur Remedium.

Cum autem, vel à Facultate Pomorum astringente (utimur namque ad conficiendum optimum *Pomacei* Genus maximè acerbis & austeris, ideoque in Regione nostra Horti talibus potissimum abundant) vel à Stomachi, ac Intestinorum, Robore nativo eorum, qui *Pomaceum* perpotant novellum, acciderit, ut nec concitetur Vomitus, nec perturbetur Alvus, Mala tamen persæpe sequuntur atrocia. Hujus enim longa & frequente Potatione tanta Vis *Tartari* indomiti ingeritur Sanguini, ut non solum Sanguis ipse inde reddatur acris valdè, sed & ab impuro Fonte omnes ab eo secreti Humores. Hinc Loco perdulcis & lubricantis Muci, per Glandulas *Haversianas* percolati, mordax quasi Coagulum: Dolor hinc Artuum oritur pungens, ac Motus Impotentia. ——— Loco blandissimi Liquoris, Nervos irrigantis, Latex corrodens: hinc Nervorum Distentiones, hinc Insultus epileptici. Sanguine porrò tanta Salium Copia saturato, Corpuscula salina in mutuos Amplexus ruunt, & majores formant Massulas, quàm quæ per Arterias *lymphaticas*, vix utique per sanguineas *Capillares*, perfluere possunt: hinc nascuntur Obstructiones variæ, atque Propaginis nervosæ Vellicatio summa.

Tandem etiam & vel ipsa Bilis, Balsamum istud πολύχρυσον Corporis, corrumpitur, & ab Acido pomoso superabundante domatur, quæ vel ipsa debet esse Acidi Domitrix: pluribus siquidem constat Experimentis, quòd Bilis, si nimio cum Acido, vel vegetabili, vel minerali, commiscetur, Viribus spoliatur, iners reddatur prorsus, & in Coagulum fere abeat. — Fe-
 rax hæc Causa Malorum! stagnante enim in Acinis Ductibusque Jecinoris inspissata Bile, Tu-
 mor, vel Induratio, Hepatis subsequitur, unde Circulatio & Secretio per magnum hoc Viscus impeditur maxime. Quanta dehinc oritura sint Mala perspiciet facile, qui Arteriarum Mesentericarum & Cæliacæ Distributionem, atque, ex harum Ramusculis, Venæ Portæ Cursum etiam, perpendit probe: at cum hæc describere longum esset, missa faciam, breviterque tantum considerabo Bilem, quatenus Acido contaminatam, & in Poris biliaris & Vesica fellea nimium diu stagnantem.

Jam itaque in Hepate subsistente Bile, nulla fit ejus in Duodenum Excretio, unde nec Chyli Lentor, nec Aciditas attenuatur satis, vel subigitur probe. Chylus autem glutinosus per Vasa Lactea Sanguinem intrans Lentorem ejus adauget, jampridem, ab acido & austero Pomorum Succo, nimis crassi: hinc Secretiones omnes, quæ Lege Naturæ, fluidiores esse debuerunt, factæ sunt justo crassiores; multa etiam hinc Mala! Cæterum Intestina; proprio Bilis Stimulo privata, Fæces tardissime deponunt, unde Alvus fit astricta admodum. — Certè tum squalidus ille luridusque Color omnium ex hoc Morbo laborantium, tum crassa eorum & crocea Urina, Indicia erant

erant manifesta satis, Bilem nec debito Modo secretam fuisse, nec in Intestina excretam.

Quamquam Bilis ab Acido coacta in Cysti fellea, ac in Ductibus hepaticis, iners velut & torpida per Spatium aliquod hæreat, latet tamen Anguis in Herba. Si quis enim Corporis Humor, vel blandissimus, extra Aream *Circulationis* effusus, Calori Corporis humani exponatur diu, & Motu Partium vicinarum agitetur; tenuior indies & acrior factus in acerrimam & Vasa omnia corrodentem Saniem mutabitur tandem. Nonne pulchram sæpe Mammam ex stagnante solo dulcissimo Lacte depascitur Ulcus horrendum? Si hæc Humori suavissimo, annon eadem, imo & vel graviora longè eventura sunt Bili, etiam in Statu naturali omnium acerrimo? cui & jam insuper plurimum Salis acidi adjicitur; qui, quamquam fortè Bilis *alcalinam* Putredinem temperet paululum, Vi tamen Corporis vitali exagitatus assidue, Acrimoniam demùm exauget maximè.

Bilis nisi ab effuso Acido haud viridescit, & quo fortiora admiscentur Acida, eo intensior oritur Viriditas, prope ad Nigritiem accedens, ac Coagulatio fortior, ut Colore & Consistentia propius absit Mistura à Fuligine affuso Atramento: fit hoc clarius si cum Felle humano, quod magis forsan *alcalinum* est, quàm de alio quovis Animale Bilis, instituat Experimentum. — Hoc certè mihi videtur esse Bilis atræ & æruginosæ Origo longè frequentissima: falluntur utique, qui has Bilis Species in primis solùm Viis formatas esse credunt, cum qui in Extispiciis humanis versantur, in Vesica fellea, & ipsis *Poris*

biliariis, tum atram, tum porraceam, offendant
sæpiùs.

Huic Ratiocinationi adstipulatur Experientia, qua sine vana omnis *Theoria*, bella sit utcunque. Obstupui sæpe videns Bilem æruginosam, ac, vel ipsa acriorem longè, atram, Vomitione rejectam, Metalla ipsa corrodentem, & in Pavimentum, haud aliter quam effuso Spiritu vitrioli, bullientem: quinimò tam acerbè acidam, ut Dentibus cum Horrore summo Stuporem incusserit, Faucesque ipsas excoriaverit. Nonne hæc maximæ Aciditatis Argumenta? vix herclè majora facit ipse Vitrioli Spiritus. Apud Galenum ideò, aliosque, Bilis atræ Characteres (qui & porraceæ itidem conveniunt) sunt τὸ δερμα, τὸ οἷον & τὸ διαβρωτικόν. Curavi olim Nauclerum quendam honestum, à Virginia reducem, qui torminosa Alvo primùm, gravissimis dein Nervorum Distentionibus & Delirio correptus, plurimum Bilis viridissimæ, subinde aterrimæ, ac quam maximè acidæ, evomuit. Huic inter Convulsiones, dum Cochleare argenteum in Ore, ne Linguam scilicet demorderet, intruderent astantes, Momento quasi Temporis Colore planè atro infectum retraherent, ac si in Spiritu Nitri intinctum fuisset. — Hic autem Homo, ut hoc obiter notem, Succo Limonum acerbissimo captus valdè, eum in omni fere Potu hauserat abundè: nec possum fanè quin addam, Me sæpius Hos Bile atra, aut porracea, afflictos esse notavisse, qui frequenter prius ex Ventriculo, ob corrodens & valde pungens Acidum, laboraverant. — Jamque in Memoriam redit, quòd Annis abhinc quindecim, à generoso quodam Juvene, Acetariis atque Pomaceo impensè dedito,

dedito, & id propter colicis & *rheumaticis* Doloribus frequentissimè vexato, Sanguinem detra-
ctum attonitus viderim, cujus Serum, Succus in-
star è Porris expressi, erat viridissimum: vide
porro Observationem nostram secundam *Act. Philosophic. No. 382.*

Haud equidem ignoro, optimum *Sydenhamium*,
Bilem porraceam ex Sola Spirituum *'Αραξία* Or-
tum ducere affirmasse: quod si verum erat, tunc
in omni graviore Animi *Pathemate*, vel Spiritu-
um à quocunque Causa vehemente Agitatione,
Bilis porraceæ Generatio sequeretur, quod tamen
plerumque falsum est. Animi *Pathemata* pro-
fectò Bilem movent & exprimunt (idcirco Phrasi
aptissima dicitur, Bilem illi commotam esse, qui
Ira incensus est) ac si Bilis, enormi Spirituum
Motu expressa, acido alicui Humori in Visceri-
bus occurrit, fit illicò viridis; quæ persæpe in
magnis Animi Perturbationibus evomitur. Non-
ne autem hunc Hominem, jam, ex vehemente
Animi Motu, viridem evomentem Bilem vidi-
mus, qui paulo post fortè, à graviore Commo-
tione flavam omninò vomebat? Nonne Ille, in
perturbato Mari navigans, hodie Bilem viridis-
simam rejicit, qui postridie tamen croceam pror-
sus ejectionis est; & è contrà? Bilis utique ex-
tra Corpus, ab Agitatione vel fortissima, haud
viridescit, nec nisi admisto Acido, vix intra ita-
que. — Quod sentio dicam; Spirituum Agita-
tio vehemens, siue graviora Animi *Pathemata*,
Concoctionem lædunt maximè, atque sic *Chylus*
in Stomacho acescit, cui profluens admista Bilis
evadit viridis; dumque Stomachus est infirmus,
quicquid intus assumitur haud probè digeritur.

unde diu in Intestinis & Ventriculo Pituita acida dominari potest.

Bilis igitur, seu viridis, seu atra, in Vesicula fellea & in Ductibus hepaticis congesta diu, & Corporis Calore fota, tandemque liquescens, vel ab extremis Venæ Cavæ Ramusculis absorpta in Massam rapitur sanguineam, vel per Ductum *Choledochum* in Intestina effunditur. At cum utraque jam facta sit summè acris, Sanguine confusa, mira excitat mala: nempe Genus omne nervosum irritando Dolores, Anxietates, Spasmos, infert. Vascula pariter rodit teneriora, &, in Cerebrum translata, illi est perquàm insensa. — Intestinis verò aliena maximè enormes concitat Vomitus, atque horrenda Tormina.

Bilis autem atra, acida, acris sit utcunque, nequaquam tam funesta est humanæ Fabricæ, quàm Bilis atra *alcalina*: Acidum enim fortissimum haud æquè potenter Vasa, Partesque Corporis erodit, ac Lixivium fortissimum *Alcalinum*, quod dicto citius Substantias animales dissolvit penitus. Imò verò Bilis putrescens, ni ab Acido mitigetur Virus, in Saniem acerrimam, omnia corrodentem, mox abit. De hac adeò tantùm Bile intelligendus est Hippocrates, Sensu absoluto, in Aphorism. 22. 23. 24. Sect. iv. & Coac. Prænotion. 74. Lib. i. Edit. Duret. itemque ab Hippocrate Celsus, Lib. ii. cap. viii. “Tormina ab atra Bile orsa mortifera.” Est enim *gangrænosa* Sanies Icterus, vel *Hepatitis*, male judicatam consequens. Diros hujus interdum notavi Effectus, quondam præcipuè in Matrona quadam, Spiritibus vinosis addicta maximè, quæ & inde in icterum nigrum inciderat: illa namque paulo ante Mortem vomuit multa,

multa, atra, foetidissima, brevique post multo cum Sanguine, ἀτὼ καὶ κάτω rejecto, (exesis nempe Vasculis sanguineis) reddidit Animam. — Atque meherclè ob Acrimoniam putrefactæ Bilis, quæ omnia Vasa destruit confestim, accidit, quod *Hamorrhagia* Ictericis Symptoma fere semper funestum est.

Est & alia Bilis atræ (dictæ) Species, priore longè, longèque mitior, quæ Recrementum quasi sanguineum est: de hac posteriore ita Galenus, in Commentar. ad Aphorism. Hippocratis 53. Lib. vi. Μεννῆσαι γὰρ χρὴ τῶν περὶ τῆς μελαίνης χολῆς, &c. i. e. “Meminisse enim oportet eorum, quæ in aliis Scriptis nostris de atra Bile definita sunt; nempe quod quædam ex flava Bile superassata fiat, quæ omnino est maximè perniciofa; alia vero, ut ita dicam, ex Cæno & Fæce Sanguinis, quæ quidem crassiore quam illa est Substantia, sed multum à Qualitatis Malignitate recedit.” — Idem vero rectiùs hanc vocat *Χυμὸν μελαγχολικόν*.

Has idcirco Bilis atræ Differentias protuli, ne quis, ejus Species malè confundens, me de Bile mitiore, seu potius Succo *melancholico*, ea denarrasse existimaret, quæ de Bile atra, acida, solummodò vera sunt.

Tanta, tamque gravia, Hominibus accidunt mala, ex immodico & perlongo Fructuum ὠρεῶν Usu, eorumque Succo, nec fermentato probè, nec bene defæcato; Pomorumque præfertim, quæ non solum Succum habent acidum valde, sed & austerum insuper. — Hunc autem longa, ac debita, Fermentatio Potum reddit jucundum sanè & salutarem. Perpetuo enim & intestino Fermentationis Motu Sales tartarei

crassiores comminuuntur maximè, & subtilissimæ tandem facti, ad permeanda vel minima Corporis Vascula apti redduntur. — Cum vero Particulæ alicujus Momentum, in aliud impingentis, à Quantitate & Velocitate conjunctim oriatur, minima Corpuscula levissimo Impetu feruntur, ni moveantur ocissimè: Sales ergo, valde subtiles facti, leviter tantùm irritant Nervos, eosque titillant potius quàm lacerant. — Præter hæc crudum musti Oleum attenuatur maximè, Salibusque tartareis intimè conjunctum, iis Vaginulas quasi sulphureas præbet: ita tandem Pomorum Tartarum fit veluti Sal quoddam volatile oleosum; & Liquor pomosus gratus valde Potus & satis salubris.

Vix utique datur ad *alcalinam* Acrimoniam præstantius Remedium: Nihil magis, aut efficax, aut jucundum, Nautis *scorbuticis*; nam fœdis eorum Ulceribus brevi medetur, ac Putredinem Gingivarum fœtidissimam delet prorsus: plurimos certè vidi, à Navigatione longa teterissimis obsitos Ulcusculis, & Lue *scorbutica* tantum non confectos, solo Usu Pomorum, mox restitutos. — Ac nullus dubito, quin generosum *Pomaceum* foret saluberrimus Potus ad Indias navigantibus: imò plures jam satis experti sunt salutes hujus Effectus. — Hoc habeo etiam addendum, quod, ex quo, apud omnes fere Nostrates, tanto fuit in Usu, evanuit pene & tetra Scabies & horrida Lepra, quæ Oras has maritimas olim infestaverunt maximè, Cornubiam potissimum.

Res nunc & Ordo postulant medendi Methodum;
Quod

Quod ad Sanguinis Missionem attinet, utcumque ea sit necessaria prorsus in Colica (uti dicitur) biliosa; ac Jure merito, apud *Sydenhamium*, aliosque, primum obtinet Locum, ubi Dolor vehemens, pulsus fortis & citatior, atque Ardor febriculosus, hanc postulabunt, (ne scilicet gravis Inflammatio Viscerum accederet:) in hoc tamen, quem jam descripsimus, Morbo, adeo nil prodest, ut etiam plerumque noceat. Debilis enim tardusque Pulsus, & Spiritus graviter oppressi, *Symptomata* in hoc Morbo perpetua, Sanguinis Dispendium vix tolerant, nedum requirunt. — Et vel ipse Sydenhamius, contra quod in Colica biliosa præceperat, ubi Morbus colicus Fructibus *horariis*, nimis avidè ingestis, Originem debuerat, non nisi post sumpsum *Emeticum* & *Anodyna* Venam secari jussit. At certè vix video, cui Bono Sanguis tunc emittendus sit, nisi nimia ejus Quantitas, Velocitas, aut Calor, Venæ Sectionem ante omnia postulaverint: quandoquidem, nisi Sanguine misso, in Corpore *plethorico*, non levi cum Periculo moveatur Vomitus.

Fateor equidem, me antequam Morbi Naturam perspexeram penitus, quibusdam Sanguinis Missionem imperasse, ad Dolorem nempe atrocissimum eveniendum: at Effectus fuit Opinione longè minor; nam omnes penè in gravem Animi Delirium inciderunt. Quid quoque hoc efficere potuit in Artuum Dorsique Doloře experiebar, et Successu utique haud meliore, quinimò infausto ut plurimum Eventu: quibus enim Sanguis larga manu detractus fuit, omnes fere, *paralytico* Affectu correpti, Vim prorsus Motumque Manuum perdiderunt, nec Usus earum, nisi

nisi post longum Tempus, recuperaverunt tandem³ ac quod dolendum certè, aliqui hoc Tempus ad-
usque Resolutione Manuum laborant. Ex hoc
profectò Errore, vel levissimum Accidens fuit
diu durans Tumor Pedum hydropicus. ———

Paucis igitur; Si fortè Venæ Sectio, propter
Sanguinis nempe Multitudinem, est præci-
pienda, debet id fieri incipiente Morbo, &
priusquam *Narcotica* administrantur: nam non
in hoc solùm, sed & in omni fere Morbo,
perpetuum est, quod Ægri facilius longe Mis-
sionem Sanguinis ferunt ante, quàm post Opii
Usum.

Quamvis Venæ Sectio huic Morbo rarissimè
conveniebat, Medicina ramen vomitoria fuit
semper utilis, in Principio utique pernecessaria:
sive enim *Anodyna* dederis, sive *Cathartica*, aut
Vomitum rejecta protinùs, aut Pituca tenacissima
implicata, neutiquam vel Dolorem lenirent, vel
moverent Alvum, si ea præsertim in Forma soli-
da exhibuisses. ——— Memini profectò me
consultum fuisse à Pharmacopola quodam Gal-
lico, pro Uxore cujusdam Pictoris, cui dede-
rat saltem (partitis autem Vicibus) Pilul. ex
Duobus ℥ij. quibus & adjecerat etiam Calomel.
℥ss, eaque omnia incluserat Potione larga In-
fusus purgantis fortioris; quid inde? Vomuit
equidem, parcius autem, at ne vel minimè re-
spondit Alvus. Ego verò *Emeticum* propino
statim, haustaque dein, pro more, affatim In-
fusione *Salviæ* & *Florum Chamæmeli* immen-
sam planè ejecit Quantitatem Muci quam maxi-
mè viscida, cum ipsissimis Pilulis, nullo fere
modò mutatis, quamquam plures ante Horas
deglutitæ fuerant.

Hic jam obiter venit notandus Error eorum, qui *Cathartica* resinosa exhibent, nec cum Sale aliquo solvente, nec Ovi Vitello, commista; quæ faciant ut Resina sit in Visceribus dissolubilis: Si quis enim sinceram, aut Jalapii, aut Scammonei, Resinam alicui porrigit, pituitosis & aquosis Humoribus in primis Viis abundanti, haud magis Alvum movebit, quam si meras ministrabat Quisquilias, & hujus Actionem ita non juvat (quod Vulgus tamen solet) jusculi avenacei larga Potatio, ut eam prorsus impediât. — Plantas idèò resinosas, optimè præparatas, porrexit alma Natura Sale nempe proprio solvente divites, quem certè, dum Resinam conficit male feriatus Chemicus, perdit omninò.

Sed è Diverticulo in Viam. — Imprimis itaque, hoc Morbo laboranti, ad hunc Modum præscripsimus.

℞ Rad. Ipecacuanh. ℥i. vel ℥iſs. Sal. Absynth. ℥ſs. coq. ex Aq. font. ℥iv. ad ℥ij. dein coletur Decoctum, cui adde Aq. Flor. Chamæ. Comp. Syrup. è Spin. Cerv. ana ℥ſs. m. f. Potio emetica. — Ad Vomitum promovendum hauriat affatim Pulli gallinacei Decoctum, vel, quod magis probo, Infusum Salviæ & Flor. Chamæ.

Emeticum hoc nostrum, præ omnibus, quæ probavi unquam operando videtur lenissimum, at detergendo potens satis & Effectu certissimum; citò enim Vomitum ciebit, nec longa in Intestinis Mora Tormina creabit: (quod, Ipecacuanh. in Pulvere assumpta, sæpissimè evenit) huic, dum violentius volo, *Tartari emetici* Grana aliquot, aut Cochleare unum, alterumve, Vini benedicti adjicio.

Vomi-

Vomitus hoc Modo provocandus est alternis Diebus, vel ad quartam nonnunquam Vicem : cum etenim maxima Copia Pituitæ tenacissimæ obruitur Stomachus, cum magna Vis corruptæ Bilis eum opprimit, quis Medicinæ Profectus expectandus est, nisi hæc expurgantur penitus? Quod rectius longè sursum, quàm deorsum, faciendum est : licet enim ponatur ea ejici posse per inferiora, nonne tamen longè commodius per vicinum Os evomenda sunt, quàm per longum Intestinorum iter deturbanda? Quinetiam, dum per Intestina depellitur putrida Ventriculi Colluvies, Pars istius tenuior ab Osculis Venarum Lactearum resorpta, Sanguinem inquinabit, dum Pars crassior, in Plicis Viscerum hærens, atrociam excitabit Tormina: atqui si omnia expurgari potuerant, inter descendendum tamen Tunicam Intestinorum nervosam crueiarent maximè. Constat igitur ineptum esse velle per Alvum purgare Stomachi Colluviem.

Nec solùm ad hunc Morbum proficit Vomiti-
tio, quatenus perpurgat Ventriculum, sed & inter vomendum Partes Stomacho proximiores concutiuntur & vellicantur maximè : quicquid ita Humoris in Hepate, vel Pancreate, stagnaverit exprimitur, ac Vomitu proinde ejicitur. — Cum autem stagnando corrumpatur omnis Corporis Humor, atque inde Acritudinem contrahat assiduè; si per Alvum excernendus foret, tum Intestina torquendo, tum Vasa Lactea subeundo, plurima produceret Mala. Vomitione ergo optimè exantlatur Bilis, sive porracea, sive atra, utraque in hoc Morbo frequentissima. — Quinetiam sæpe certè notavi, ex peracta Vomitione, vel ipsos Artuum & Humerorum Dolores cessasse,

cessasse, pro Tempore saltem; ad divini Senis Effatum, Lib. ii. Prædictorum, quod sic reddit Celsus noster, Lib. ii. cap. 8. “Humerorum Dolores, qui ad Scapulas, vel Manus, tendunt, Vomitu atræ Bilis solvuntur.”

Cum jam Vomitus conquieverit, quod exhibitis *Paregoricis* citò efficitur, danda sunt propinè Medicamenta per Alvum purgantia; iisque rectissimè addenda sunt *Anodyna*: siquidem obstitinata Alvus & Dolor Ventrìs gravissimus sunt in hocce Morbo *Symptomata* perpetua.——Ideò ubi colicus Dolor sævit admodum, *Opiata* Purgantibus adjici debent: nempe ut Dolor reddatur tolerabilis, ut Intestinorum Relaxatio deinde sequatur, atque ut eorum Motus peristalticus fiat constans & regularis, nec interruptus, nec perversus.——Dolor omnis agit ut Stimulus, vel rectius Stimulus sensum Doloris excitat: Stimulus autem omnis ad Contractiones concitat Fibras, easque in *Spasmos*, si sit vehemens, adigit. Cum itaque Dolor colicus atrocissimè urget, Intestina in quibusdam Locis Convulsionibus afficiuntur, & Fascia quasi constringuntur, adeò ut, nisi Tormento sopito, nec Alvus nec Flatus infra transmitti possit: hac adeò de Causa, Dolor colicus vehemens secum plerumque habet Comittem Alvum valde astrictam. Rectissimè ergò in omni Colica graviore *Anodyna* purgantibus adjiciuntur; nec certè hoc novum est, experientissimus enim Riverius in Capit. de Dolo- re colico præscripsit Aloes ʒi. Scammonei gr. vi. quibus Laudani Opiati adjunxit Grana duo: imò in Observatione prima Centur. 2^{dæ} iisdem admiscet Grana quinque Laudani.——At cum id se facere ex Auctoritate Hippocratis opinatur,

mea

mea quidem sententia fallitur; nam Vox *Μηκωνίς*, in Loco à Riverio citato, non Succum somniferum Papaveris (nisi fortè τῆς ἀφρώδεος sive spumæ mei Dioscoridis, quod vehementer satis purgat) significat, sed Πέπλον, sive Πέπλιον*, Genus scilicet Medicamenti Alvum purgans: hoc idem etiam *Μηκωνιον* significat apud Hippocratem sæpissimè (nisi quando Epithetum ὑπνωτικόν adjicitur, ut Lib. ii. de Morb. Mulierum, p. 670. Edition. Foesii) ita quoque *Μηκωνίς*, sive *Μηκωνίτις*, à Galeno explicatur in Exegesi Vocum Hippocraticarum, *Μηκωνιον ἢ Πέπλον καλέμενον ὃν καὶ Μηκωνίτην ὀνομάζει.*

Sed ad Rem. — Vomitu peractò, Ego uti soleo sequentibus R̄ Phil. Coch. min. ℥i. vel ʒss. Calomelan. ℥ss. Laudan. solid. gr. i. Ol. Caryoph. gutt. i. m. f. Pilul. vel R̄ Rad. Jalap. ℥i. vel ʒss. Spec. Diamb. gr. viij. Calomel. ℥ss. Syrup. de Spin. Cerv. q. s. m. f. Bolus. — Pilulæ autem non ita facilè rejiciantur — Post duas dein, tresve, Horas Senæ Infusionem, vel Mannæ Solutionem, atque id Genus Medicamenta, præcipio; quibus & interdum adjicio Oleum Amygdalinum, aut Olivarum; nisi ubi Stomacho Oleum valdè alienum est. Horum Dosis & augeo & repeto, pro Ratione *Symptomatum*: Hisce verò pacatur Dolor, relaxantur Intestina, ad Dejectiones stimulantur leniter, & oleosis lubrica redduntur. At si ne sic quidem Alvus respondet, totum Abdomen foveri jubeo Fomento emolliente, idque potissimùm ubi Venter tensus est admodùm & durus, vel *Spasmo* maximè

* Πέμλος ἢ Πέπλιον ἐλλυτάτω μὲν τὴν Ἰδίαν ἀλλήλων ἢ τὸ καθαράι. Ruf. Ephes.

maximè contractus. Hoc blando Vapore Abdominis Integumenta penetrat, ac Intestina ipsa demulcet, rigidas hoc emollit Fibras, easque nimis tensas relaxat. Mirandum planè Successum sæpe notavi ex Applicatione Fetus hujusmodi. R. Rad. Althææ, Sem. Lini — Fœnugræc. ana ℥iij. Flor. Chamæmel. M. iij. Capit. Papav. alb. ℥iv. coq. ex Aq. font. & Lact. dulc. ana P. æqual. — At Effectus longe feliciores expectandi sunt, si Æger in Semicupium demittatur ex iisdem paratum. Mihi, hæc asserenti, facilem dabit Assensum quisquis felicissimos Balnei emollientis in Doloribus nephriticis Effectus observavit. — Haud rarò profectò vidi sævissimum Paroxysmum *nephriticum* solo Balnei Usu derepentè solutum, cum nec prælonga Sanguinis Missio, nec Laudani Doses, eaque haud mediocres, vel profecissent Hilum. Imò per multis didici Experimentis, nihil ad Dolorem sedandum, ad Calculum per Ureterem demittendum, æquè conducere ac Balneum tepidum & emolliens.

Accidit autem sæpissimè, quod Fæces alvinæ in hac Colices Specie, valdè indurantur, & in Valvulis Coli hærentes, Flatibus & Stercori Repagula sunt, adeò ut, dum omnia ibi sistuntur, nihil ultrà transmitti possit: hac sola de Causa sæpissimè oriuntur gravissimi Dolores, ubi præsertim Intestina Purgantibus irritantur. Quamobrem si post Horas aliquot, ab assumpto *Cathartico*, Alvus nihil reddit, olcosum & emollientem Clysterem injici præcipio, quo & Intestina reddantur lubrica & Stercora molliora: dein (si opus erit) Alvus acriore *Clysmate* duci potest.

Si quis alius Morbus, hic profectò, de quo jam agitur, frequentem *Catharsin* Alvumque diu solutam requirit: Medicamenta ergò leniter purgantia per Dies aliquot continuos exhibenda sunt; inter quæ laudo potissimum Rhabarbarum, Pilul. Russi, Tinctur. Sacr. quibus subinde adjungi debent Calomelanos Grana aliquot. Terebinth. etiam Veneta, aut Cypria, Ovi Vitello subacta & Aquæ alicui *Cardiacæ* admista, Alvum purgat commodè, & plurimum facit ad *rheumaticos* Dolores, Colicen comitantes. Interea tamen *Anodyna* quædam liberali Manu porrigenda sunt; neque enim aliter sævissimos compescere Dolores, neque iisdem occurrere potes, recursuris alioquin promptissimè, nisi repetita Dosi Lacrymæ Papaveris Tormenta reprimas. — Quod tamen ad Opii Dosin attinet, nihil certi statui potest, cum ipsissima Dosis alterum soporet maximè, alteri det contrà dulce furere.

Longam hanc & frequentem *Catharsin*, ut ut nova videatur, necessariam esse comprobavit Experientia: Alvus enim aliter mox fieret astricta valde, & gravissima Tormina certo certius succederent, ob acres scilicet Humores in Intestina perpetuò influentes.

Non solùm ad hunc Morbum profligandum primas Vias perpurgare necesse est, diluenda est insuper Sanguinis Acrimonia salina: nam ex polluto Fonte haud puri diffuunt Rivuli. Diluentia ergò propinanda sunt abundè, inter quæ ἀριστον μὲν ὕδωρ; neque enim aliud datur Salium Solvens, neque magis purum & incorruptum aliquid. — At ex omnibus Aquis laudo maximè Aquam Pyrmontensem, aut Spada-

Spadanam : hæc siquidem , Principio prædita *Chalybeato* , non tantum Sales dissolvit optimè , sed & *Crasin* Sanguinis firmat , ac Fibrarum Tonum roborat.

Cum per hæc Sanguis fit dilutus apprimè , omni Ope evocandus est Sudor. Nil verò ad hoc idoneum magis expertus sum quam Camphoram , ac divinum illud miserorum Solamen, Laudanum : his assumptis ad Sudores eliciendos largiter calideque hauriri debet vel *Salviæ* , vel *Rorismarini*, Infusio , aut , quod Stomacho forsan arrideat magis , Serum Lactis vinosum.

Qui Consensum intestina inter & Cutim , qui foetidos acresque Sudores , vel Cuticulam ipsam erodentes , observaverat ; haud ita multum obstuperet , videndo tum colicos Dolores , tum *rheumaticos* , post Sudationem penitus fere sublato , pro Tempore saltem. — Istud certè fuit Naturæ Vestigia premere , cui Medicus , ejus Minister , prudenter obsecundare debet : frequenter enim Sudores , sponte erumpentes , hanc Ægritudinem allevabant admodum. — Hæc apprimè convenit Baglivi Aphorismus Capit. de Colica : “ Colica habitualis & endemicica , à Vino acido præsertim oriunda , solis sanatur Sudoriferis ; Vesperis tamen interposito anodyno Remedio . ” — Atqui miror ipsummet Baglivum , in eadem etiam Sectione , Usus Opii in Colica improbasse : sive enim Sudores moveat , sive non , in vehemente Colica pernecessarium est , ac longè longèque antefereudum Pulveris Foliorum Ficus sylvestris , utcunque sit in Terra (quod permagni est haud dubio) non in Muro nata , & licèt cautè (quod

præcipit) Folii Ulmi admixta. — Sed *quandoque bonus dormitat Homerus.* — Sudores equidem non sunt Paralyseos Causa, sed Effectus: cum enim Materię morbidę *Metastasis* in Genus nervosum facta est, vel Resolutione, vel Convulsione, afficiantur Nervi necesse est. Relaxatis idē Nervis subcutaneis, per patula nimis & hiantia Cutis Emisleria diffiunt Humores (quod in moribundis etiam eandem ob Causam observatur:) quid quod & Sudores diu post ortam Paralyfin durant. — Mihi certē videtur Corpus reticulare Malpighii (si mavis Ruyschii) eum ob Finem effectum fuisse, ut foret quasi Sphincter universalis Ductibus Sudoriferis, per sua Foramina emissis; dumque constringitur fortius (quod Cute Aeri frigido exposita accidit) tota Cutis, Pustulis quasi aspera corrugatur, & Cuticulę anserinę instar evadit; dum verō relaxatur nimium, profluunt Sudores. Sed hæc hætenus contra Doctrinam Baglivi.

Post Sudationem Diluentia, præ cæteris autem, Aqua quædam ferruginea, si ea non est, quàm purissima, iterum præscribenda sunt, diuque epotanda; ut corruptę nimirum nova puraque Materia admisceatur, ut debitus fervetur Sanguinis Fluor, & ejus corrigatur Acrimonia. Nec verō intereā omittenda sunt, quę & imbecillum Stomachum juvant & Viscera confirmant: sic tamen ut subinde assumi debeant Rhabarbarum & Tinctura Sacra, (quę & ipsa Intestina corroborandi Facultatem habent, eaque expurgant commodē) ne in illis scilicet coeant acres aliqui Humores. — Idcirco Pulveres (utī dicuntur) testacei ad hunc Morbum proficiunt, quod acres absorbeant Humores;

res; at nisi Salem Absynthii, aut Tartari fixum admisceas iisdem; ac Rheum barbarum, vel ἐκκροτική quædam subinde exhibes; eorum usus non diu continuandus est: ne in Canali Intestinorum, diu morando, in lapideam penè abirent Duritiem. Quod sanè plus semel observavi, in Puerulo præsertim Aurificis cujusdam, cui, ob *Testacea* plurima exhibita, Alvi Fæces in tantum erant induratae, ut exsiccatam Gypsum planè referrent, illasque ex Ano, ope Instrumenti, necesse esset extrahere. — Hoc de *Testaceis* exhibendis Præceptum, nisi ubi cita Alvus aliquos exercet, perpetuum esse debet. Tutiùs ideò, imò & efficacius longè, ad acidos corrigendos Humores datur Aqua Calcis vivæ tenuissima, maximè idoneis imbuta *Stomachicis*, quæ & Acidum in primis Viis, ac in Sanguine debet.

Quæ ad Dolores *rheumaticos*, expugnandos, cum Morbus Artus invaserit, utilissima probavi, fuere Cinnabarina, Gummi Guaiaci, Tinctura Antimonii, Potiones è Terebinthina, aut è Balsamo Copaybæ, quæ quoque ad paralyticas Affectiones plurimum possunt. Sed ante omnia fere, minuta Calomelanos Dosis, repetita subinde; quod, si octava, vel decima, Vice sublimetur, nobilissimum ad plures Morbos evadit Remedium: idque, ad Grana duo, triave, scilicet, præscripsit eruditissimus noster *Musgravius*, ὁ μακροβίος, Asclepiadeæ Familix, dum viveret, egregium Decus & Ornamentum. — Calomelano frequenter adjicio Camphoræ pauxillum, quæ, ex Particulis longè subtilissimis constans, angustissimos Corporis Canaliculos penetrando, Pennasque quasi Mercurio addendo,

Vires ejus intendit maximè . Quinetiam eadem Camphora corrodentem *Mercurialium* Præparationum Qualitatem delenit , earumque Spicula obtundit : quod probè jamdudum novit *Bateus* , eandem , in Præparatione Mercurii præcipitati grisei , Turpetho minerali addendo . Utilissimas quoque *Mercurii alkalizati* Dotes probavi nuper , addo & tutissimas .

Porro ad crudelissimos *Rheumatismi* Cruciatu , eosque diu permanentes inter Scapulas præcipuè , nihil magis prodesse novi quam *Vesicatoria* superimposita ; quæ ad Paralyfin etiam præcavendam , eamque , si jam facta fuerit , profligandam , maximè faciunt . Membra autem resoluta , totaque Spina Dorsi , à summis Cervicibus Os Coccygis adusque , Galbaneto Paracelsi (quod apud Cratonem , vel Riverium vide) aut quod , me Judice , melius est , Balsamo Galbaneto Hartmanni perfricanda sunt , adjecta quoque Camphora : habet id utique Vim penetrandi & aperiendi maximam . Estque hoc insuper utile Remedium , ubi Abdomen vehementer extensum est , aut Spasmo maximè contractum : totus autem Venter eo inungi debet post Fomentationem idoneam . At notandum ! melius longa & clausa Digestione , quàm Destillatione , (quod vulgò faciunt) præparatur : destillatum siquidem magis *causticum* est , & nonnunquam , si sit tenebrior , præsertim , erodit Cutim . At si Umbilicus exoriatur , difficillimè utique sanatur , ac discruciat maximè : quod quoque caveri certè debet , cum Emplastra de Galbano , vel *hysterica* dicta , medio Abdomini admoveantur : Umbilicum nempe obtegendo involuto Serico .

Cum

Cum Dolores colici & rheumatici cessaverint paululum, tum demum uti Cibo pleniorē oportet, sed neque inflante, neque valido, ne Viscera adhuc imbecilla lædantur. Conveniunt potissimum *Gelatina* de Sago, è Cornu Cervi rasō, seu, quæ facilius paratur, de Pedibus vitulinis, Ova forbilia, *Panatellæ*, atque id Genus alia, quæ per totum etiam Morbi Decursum, parcius assumpta, ad Vires reficiendas utilia sunt. — Potui vero nihil dari debet præterquam Aqua pura, aut *chalybeata*, Vini albi generosi pauxillo subinde adjectio; nam siue quid flatulentum, siue acidum est, id huic Morbo affectis alienum est maximè: facile enim redire consuevit ex levissimo Diætæ Errore. — Porro ad *Crasin* Sanguinis restituendam, & confirmanda Viscera, *Chalybeata* quædam *Stomachica* idonea sunt maximè: Infusione sequente utor sæpissimè. ℞ Radic. Gentian — Galangana ℥ss. — Zedoar. — Calam. aromat. Cort. extern. Aurant. Hispalens. sicc. ana ℥iiss. Caryoph. Indic. ℥ii. Chalyb. cum Tartaro ppt. ℥iii. hisce affunde Vini alb. Olyssiponensis ℔iiss. Aq. Absint. Comp. ℔iss. † Infusio clausa per Dies saltem duodecim, in Vase Vitreo, id sæpius agitando. — Ubi Viscera infirma sunt, & pituitosa Colluvies redundat, maximè conducit hocce Medicamentum, minimè tamen alienum est Stomacho. — Semina Cardui, in Tinctura amara Chalybeata *Lovverii*, ingratum admodum Lentorem fundunt; neque aliquid Gentianæ, præter Nomen, est in Aqua Gentianæ, composita, quam recipit Infusio *Lovveriana*.

Ultimum in hoc Morbo Auxilium Equitatio. est: neque enim ulla Res Viscera magis & Intestina confirmat. Ea siquidem, vario admodum;

ac frequentissimo Corporis Succussu, totum Abdomen concutit leniter: quicquid adeò Intestinis hæreat, Pressu & Agitatione continua depellit; quicquid Lentoris in Vascularis sanguineis retardetur exprimit, Circuitum Sanguinis per Vasa mesenterica & Venæ Portæ Ramulos promovet maximè, ubi Sanguinis Cursus tardissimus est. Sanguinem itaque partim Vi Morbi, partim longa ibi Mora, concretum fere perpetua velut Conquassatione dissolvit. Obstructiones adeò Glandularum Hepatis, Pancreatis, Mesenterii, Intestinorum: expedit; porrò Actionem Splenis, Jecinori inservientis multum adjuvat. Plurimis denique constat Experimentis: *Perspirationem* maximè augeri Equitatione; ita noxios Humores in aliam Partem avertendo, ac per Cutim eliminando, non in hoc solùm, sed & in omni fere Morbo *chronico* prodest. Profectò quos vix operosa Medicina servavit, sola utique Equitatio restituit penitùs; cùm igitur Equo insidere valet Ægrotus, eò gaudeat quotidie, *Viresque acquirat eundo*.

Hæc quæ conscripsi modò de Ratione mendi Morbo colico Damnoniorum, haud malè fortasse accommodari possunt Colice Pictonum dictæ, Indias Occidentales infestanti sæpissimè; quæ ex eadem fere Causa pendens, nimio næmpe Usu acerbissimi Limonum Succu, Curam forsan haud absimilem poscit.

INDEX

RERUM & AUCTORUM,

*In quo numeri intra Parathesin opusculum
de Morbo colico pomacco respiciunt.*

A

	Pag.		Pag.
A CETI Vires.	146.	Aqua. Calcis ad acidos Hu-	
	147.	mores	(35)
Acoſta, Joſ.	vii	Aquæ frigidaꝝ uſus in } 158	
Actio Aeris. vid.		Febribus damnatur }	
Aeris.		Aretæus, Cappadox.	65. 66.
Aduſtio Sanguinis. vid. San-			(6)
guinis.		Argestes. Ventus.	xxvi
Ægineta (Paulus).	(9)	Aristoteles	xxvi. xxvii
Aer calidus.	iv.	Artuum dolores rheuma-	
———— & humidus	xvii.	tici Vomitu ſolvuntur }	28.
	40.	Aſclepiades.	xxii.
———— ſiccus.	xix	Aſthmatis medela varia	26
———— frigidus	iv. vi	Atmoſphæræ Pondera varia	
———— & humidus.	xii		viii
———— ſiccus	xi	———— Preſſura, }	
———— gravis & elatiſticus	iii.	Antagoni- }	viii
	vii	ſta Cordis }	
———— humidus pervadit cutim.	19	———— Motum }	
———— levis	iii. vii	Sanguinis }	viii
Aeris Actio in Pulmones	ii.	promovet }	
	vi	Augustus Cæſar, & Divus	5
———— Effectus in Corpora no-		Aulus Gellius, vid. Gellius.	
ſtra	ii	Aurelianus, Cælius	xxii. 19
Africus Ventus	xxvii	Aurora borealis anomala	119
Angina epidemica	56	———— inſolita	13
Aphthæ	159	———— magna	27.
			134

I N D E X:

	Pag.
Aurora borealis maxima	12.
-----mira	134
-----rubra vel fan-	124
-----guinea	138
Autumnales Morbi. vid.	
Morbi.	
Autumnus maxime morbo-	
fus	xxiii

B

B Acon (Rogerius)	146
Baglivi (Georgius)	52,
	63. (33)
Ballonius (Gul.)	52
Balnei emollientis in	
Colica & Nephri-	
tide Ufus	} (31)
Balneum frigidum ad inter-	
mittentes	25
Barometri maxima depressio	
	162
Bateus (Georgius)	(36)
Bilis atra & æruginosa unde	
	(19)
----- quos	
maximè infestat	} (26)
-----atræ & æruginosæ	
Acrimonia summa	} ibid.
----- Species variæ	
	(22. 23)
Boars (immensi Maris fluctus)	
	18
Boerhaave (Hermanus)	iv.
	67. 145
Boyle (Robertus)	xviii

C

C Adaverum putrefactio	
citissima	106
Cælius Aurelianus. vid. Au-	
relianus.	

	Pag.
Calomel	(35)
Camphora	157. (36)
Carneades Academicus	24
Cathartica cum Anodynis	(29)
-----ad Febrem se-	
cundariam Va-	
riolatum	} 37
-----ad finem Fe-	
bris lentæ	
nervosæ	} 161
-----frecuen-	
tia ad	
Colicem	} (22. 32)
necessa-	
ria	
Caurus, vel Corus, ventus	
	xxvi
Cellus (A. Corn.)	xii. xxi.
	xxiii. 2. 19. 20. 24. 64.
	66. 147 (22. 29. 20.)
Cheyne (Georg.)	21
Cicero (M. Tull.)	147
Circius, ventus	5
Coeli mira facies. vid. Aur-	
bor. rubr.	
Colices Differentia	51. 52
-----epidemicæ Causa	(11)
Descriptio	
	5. &c.
Comte (Lud. le)	xvi
Condensatio sanguinis. vid.	
Sanguinis.	
Congelatio unde	xiv
Constitutio Aeris ad	
Contagium aptissima	} 40
-----ad Pustulas	
aptiss.	116
Cordis Antagonista	viii
Corpus humanum	ἐκπύουον 29
	ἐκπύουον xiii
-----reticulare Malpighii	
	(34)
Cortex	

I N D E X.

	Pap.		Pag.
Cortex Peruvianus	21. 109	Febris anginosa	92
Corus. vid. Caurus.		—— catarrhalis	38. 80
Cucurbitulæ utiles in Pleuride	64	—— hyemalis catarrhalis	127
Cyrillus (Nic.)	40	—————— epidemica unde	de 138. 139
D		—— intermittens	Origo 20
D elirium in Colica	(7)	—— lenta nervosa	139
Dilutio in Colica necessaria	(32)	—— maligna contagiosa	147
Dioscorides (Ped.)	(30)		104
Duretus (Lud.)	52	—— putrida epidemica	33
E		Formula Vomendi	(27)
E meticorum in Colicis		Fotus emollientis in Colica	
Necessitas	(26)	Ufus	(30. 31)
———— Utilitas	21	Freind (Job.)	37
Epispastica proficua in Febribus nervosis	156	Frigoris Gradus, quo	xvi
Equitatio laudatur	(38)	Glacies producitur	
Essentia Antimonii	140	—— suscepti Causa	xiii
Eurus, Ventus	xxvi	G	
Exhalationes Terræ Gelu sistuntur	17	G ALBANET. Hartmanni	(36)
Excretio liberalis in		—— Paracelsi	(36)
Peripneumonici Vææ	52	Galenus (Claud.)	xiii. xx.
Sectione non eget			(23. 30)
F		Gellius (Aul.)	xxvi, xxvii. 24
F ahrenheit (Dan. Gabr.)	xiv	Gelu	xiv
Favorinus	xxvi. xxvii	Glacies non ab eodem	
Febrem inter ardentem		constanter Frigoris	xvi
& lentam nervosam	152	gradu	
Differentia		Globuli Sanguinis rubri	22
Febres intermitentes	10	Globus igneus in Aere dissipatus	139
—— lentæ quando & unde		H	
	117. 149	H æmorrhagia in Ictero	
Febriacula catarrhalis	9. 38	pestifera	142. 143
	136	Hales (Steph.)	viii. xviii. 19
		Harris (Gualt.)	76
		Hel-	

I N D E X:

	Pag.
Helvetius (Joh. Claud. Hadrian.)	iv
Hippocrates i. ii. xii. xiii.	xx. 33. 52. 63. 64. 66.
(6. 10. 15. 22. 29.)	
Hoffman (Frid.)	xv
Hornberg (D.)	xvi
Horatius, Flaccus (Q.)	xxvii.
	24. (12)

I

I cterorum Morborum	
Diversitas	142. 143
Ictero Remedium optimum	144
Infusio amara Martiata	(37)
Instrumentorum ad	
Observationes meteorologicas Situs	xxvi
Iris Lunaris	135
Jurin (Jac.)	xxv. 22

K

K EILL (Jac.)	xiii. 19
----------------------	----------

L

L IBS, Ventus	xxvi
Lucretius, Carus (T.)	xx. 3
Lullius (Raym.)	145. 147
Lumen boreale. vid. Aurora bor.	

M

M Aris Aestus maximus unde	17
Martialis (M. Val.)	xxix
Mayovv (Joh.)	xiii
Mead (Ric.)	37

Pag.

Maximus quid	(30)
Mercurialia Medicamenta	21
Mercurii Depressio maxima	101. 102
Methodus Alvum purgandi in Colica	(34. 35)
Molyneux (Gul.)	xxvi
Morbi autumnales	xix
Musgravius (Gul.)	(35)
Multi (pomosi) Natura	(13)
———— plurima Mucilago	(13. 15)
———— maxima	Vis
———— Tartari	(14)
———— Qualitas noxia	(15)
———— saponacea	(16)

N

N Evuton (Isaacus)	xvi
Nitrum aereum	xvi
Notæ, quæ in Opere passim occurrunt, explicantur	xxix
Nubecula mira coruscans	27

O

O Vidius, Naso (Publ.)	xxvii
-------------------------------	-------

P

P Aralysis in Colica poma- cea saepe	(7)
Pecora Morbis epidemicis saepe corripiuntur priusquam	3. 4
Homines	
Peripneumonia valde epidemica	56
Per-	

I N D E X

	Pag.
Perſius, Flaccus (Aulus)	xxv.
Perſpiratio quibus auge- tur, & quæ inde com- moda	ix
Pertuſſis Puerorum	75
Petechiæ unde	106
— fufcæ	105
Phthiſici plures mortui	84
Pleuripneumonia	66
Pleuritis valde epidemica	56
Pleuritidis & Peripneumo- niæ Differentia	65
Plinius (Caius)	xxvi. 146. 147
Plymuthi Situs	xxvii
Poma nunc Aluum?	
— ſolvunt, nunc	(12. 13)
— astringunt	
Pomatii defæcatio (23. 24)	
Pomatium ad Scorbutum optimum	(24)
Procella permagna & longa	38
Prophylactica methodus in Autumno	xxiii
— per Tem.	
— peſtates	22, 23
— humidæ	
— frigidas	vii
Pueri rariùs Colica po- macea corripuntur	(9)
Pulv. teſtaceorum lon- gus Uſus improba- tur.	(35)
Puſtulæ erumpentes Colicam ſolvunt	(8)

R

R	Eſpiratione (de) pauca	ii
	Rhenani Vini & Pomatii Comparatio	(14)

	pag.
Rheumatici Dolores	(7)
— fere ſèper aſcendunt	
Colicæ pomacea.	
— quibus	
— Remediis	
— proſi- gantur	140. (31)
Riolanus (Joh.)	66
Riverius (Laz)	(29)
Roris Origo	132
Rufus Ephesus	(30)
Ruris Laus	xviii

S

S	AL atmosphericus	xxiii
	— nitro-aereus	xiii
	Sala (Angelus)	(14. 15)
	Sanctorius (Sanctorius)	xxiii
	Sanguificatio fit in Pul- monibus maxime	iii
	Sanguinis Aduſtio quid?	xix
	— Circuitus per Pul- mones	viii
	— Condensatio in Pulmonibus	v
	— Globuli rubri	22
	— Serum viridiſſi- mum	(21)
	Saponaceorum Medicami- num Uſus	144
	Schema Ventorum. vid. Ven- torum.	
	Seneca (L. An.) (xxvi. xxvii.)	5
	Societas Edinburgenſis	xxv
	Spouts, immenſæ Co- lumne ſeu Cataractæ	18
	— Aquarum	
	Succus nervoſus Medium eſt Sensationis	154
	Sudores ſolvunt Colicen.	(7. 33)
	Sude	

I N D E X:

	Pag.		Pag.
Sudores non faciunt Paralyfin.	(34)	Venæ Sectio celebrari debet ante Opium Usum	(26)
Sydenham (Tho.) xxi. 33.		Ventorum Nomina	xxvi
75. 138. 140. 160. (21. 23)		—— Schema ex Plinio	xxvi

T

T artari maxima Vis inest Pomaceo	(14)
—— Terra foliata	144
Tempestas frigidissima	54
Tournefort (Joseph.) Pitton.	xvi
Tullius, vid. Cicero.	
Tussies frequentissimæ	8
—— Puerorum convulsivæ	75.
Tussis laboriosa cum Febre epidemica	30. 55

V

V ariolæ epidemicæ	37
—— malignæ	35. 36. 103
Varro (M. Ter.)	xxvi
Venæ Sectio non æquè	
convenit in omnibus	xxii
Tempestatibus	
—— non convenit plerumque in Colica po-	(25. 26.)
macea	

Ventriculi Colluvies Vomitione optimè purgatur	25. (28)
Vibices	105
Victus Ratio in variis Tempestatibus	xxiii
Virgilius, Maro (P.)	xvii
Vitruvius (M.)	xxvi
Vomendi methodus	23. (27)
Vomitio perutilis Colicis	(26)
Vomitionis utilitas plurima	24
Vomitus viridis unde	(21)
Urinæ Difficultas à Veribus observata in Colicis	(6)
—— pessimæ	105

VV

W aldschmidt (Joh. Jac.)	76
---------------------------------	----

Z

Z ENO	24
--------------	----

OBSERVATIONUM
DE AËRE
ET MORBIS EPIDEMICIS

VOLUMEN ALTERUM;

Ab Anni nimirum Initio MDCCXXXVIII.
ad Exitum usque MDCCXLVIII.

AUCTORE

JOANNE HUXHAM, M.D.R.S.S.

Δεῖ δὲ καταμανθάνειν ἡ Κατάστασις τῶν Ὁρέων ἀκριβῶς, καὶ τῶν
Νούσων ἐκείνη. Hippocr. de Dieb. judicator. Initio, item,
Lib. 3. Epidem. Sect. 3.

EDITIO PRIMA VENETA

Juxta ultimam LONDINENSEM.



VENETIIS, MDCCCLXIV.

Apud LAURENTIUM BASILIUM.

Superiorum Permissu, ac Privilegiis.

OBSEKVATIONUM

D. E. R.

ET M. D. C. C. C.

ANNO DOMINI

M. D. C. C. C.

OBSEKVATIONUM

ANNO DOMINI

M. D. C. C. C.

OBSEKVATIONUM

ANNO DOMINI

M. D. C. C. C.

OBSEKVATIONUM

P R Æ F A T I O .

Perfeci tandem Observationum de Aere & Morbis Epidemicis Volumen alterum (ab Initio scilicet Anni 1738. ad Exitum usque 1748) in quo quidem eodem usus sum Ordine, atque Notis, in priore descriptis *.

Quàm fuerunt plena Laboris hæcce Opera solus ille norit, qui talia conscripserit — Lubentiùs autem secundùm hoc Opus suscepi, quòd & prius Publico bene acceptum perceperim, & mihi porrò, id meditati, haud inutile — Dum enim Cœli atque Aeris Mutationes notarem diligenter, variosque Morbos has consequentes, eorum sanè Causam, ac Naturam, multò meliùs dignoscebam; quales enim Tempestates, tales etiam sunt Morborum Constitutiones, sicut notavit olim Hippocrates †, & fida dudum docuit Experientia — Multus ideò est divinus Senex in præcipiendo diligentem Aeris atque Tempestatis Observationem, optima quinetiam dedit Exemplaria, præcipuè in Libro primo & tertio Epidemicorum.

Hujus etiam Laboris aliud mihi fuit Incitamentum, quoniam scilicet Observationes hujusmodi,

A 2

modi,

* Porro in Volumine 2. notavi, quolibet Mense, Diem novæ, necnon plenæ, Lunæ — Hic obiter monebo, quod tota Pluviæ Quantitas Anni 1737. (Vol. 1.) fuit tantum Dig. Dec.

Dig. Dec.

27. 364. non, ut falso imprimitur, 36. 706. † Lib. de Humorib. Sect. 7.

modi, quæ per longam Annorum Seriem, uno eodemque Loco factæ sunt, meliùs longè istius Regionis *Atmosphæ* Constitutionem, Morbos vulgares, eorum Successiones, Relationes, imò & curandi Rationem, ostendunt, quàm si per unum solummodò, alterumve Annum detur Historia: monet ideò rectissimè clarissimus *Ramazini*, “ Nil foret in Artè medica utilius, “ quàm succedentes sibi ad invicem Constitu- “ tiones conferre, ut recta medendi Methodus “ institui posset, quoties eadem Tempora, ac “ iidem Morbi, recurrerent * “ — Paulò etiam ultrà processit expertissimus *Hoffman*, hortando nimirùm ardentè “ Omnes & singulos Medico- “ rum cordatiores, quibus Curæ Cordique Sa- “ lus Hominum est, ut in annotandis Morbo- “ rum Historiis, si epidemii Morbi grassantur, “ & diligentissimi & accuratissimi sint; & quif- “ que in suo Loco Temporum & Tempestatum “ præcedentium, & præsentium, Constitutio- “ nem, item in Barometro Mercurii Motum, “ ac Gradum Caloris ex Thermometro, simul “ adjiciant, integrasque & plenas Historias cum “ Methodo curandi & Eventu exhibeant †. “

Nostram profectò ad Vitam sustentandam om-
nium maximè necessarius est Aer, cæteris utiquè
per plures Horas carere possumus, hoc ne vel
Tempore quàm brevissimo — An igitur purus sit,
vel impurus, summi procul Dubio est Momenti,
ejus.

* Constitut. epidemic. urban. 1691. ipso Initio. † *Erid. Hoffman. Medicin. rational. Systemat. Edit. Francofurt. 4. 9. Vol. 1738. Patholog. general. Part. 3. Cap. 7. P. 430. Tom. 2º.*

ejusque adeò bonas, necnon pravas Qualitates *, probe perdiscere debet Medicus. — Aeris autem Nomine hic volo Terræ *Atmospharam*, non merum, uti dicitur, Elementum; quæ cum ex variis admodum Rebus componatur, variis etiam Modis officere nobis, ac proficere, potest — Diversæ ergo hujus Constitutiones, tum ad Sanitatem tuendam, tum ad Morbos depellendos, assidue sunt observandæ.

Res erit Exemplo clarior — Sicca valdè & frigida Tempestas, perflante diu Borea, aut Aquilone, Corporis Habitum constringit, Fibras roborat, Vascula arctiora & fortiora facit, Humores etiam magis densos; porrò Globulos sanguineos accumulatur, & compingit validè; *Celsi* Verbis, totum Corpus spissat, & mobilius atque expeditius reddit; ideòque, ex *Hippocratis* † Opinione, omnium Ventorum Aquilo est saluberrimus — At si diutiùs talis perstat Tempestas, solida fiunt stricta perquam, & elastica nimis, Fluida verùm crassa valdè & glutinosa, imò ad Vascula minutissima permeanda multò minùs idonea; namque non tantùm Humoribus inducit Lentorem, ad Inflammationes aptum, sed & ita quoque condensat rubros Sanguinis Globulos, ut difficillimè per ultimos Arteriarum Ramusculos promoveantur: duros nempe plus æquo, & haud facillè Formam rotundam in oblongam mutant ad Transitum scilicet faciliorem; cum & jam etiam ipsæ *Arteriolæ* à Frigore coarctantur & Distentioni resistent plurimùm. — Hinc Obstructiones;

A 3

hinc

* Haud pauca de his dixi in Prolegomen. ad Vol. I. de Aere, &c. † Lib. de Morbo Sacro, Sect. 15. Edit. Vander Linden Lugdun. Batav. 2. Vol. 8. 1665.

Hinc Inflammationes, Pleuritides, Peripneumoniae, Anginae, Rheumatismi, Morbi denique, qui à crasso, viscido, ac inflammato Sanguine pendent, praevalida Vi Cordis & Arteriarum adacti: quò magis etenim arctantur à Frigore Vasa, quò magis *Atmosphæra* comprimuntur Pondere, eò velocius, cæteris paribus, moventur contenti Humores, unde Frictio major, ac proinde Calor; quæ tandem Sanguinem incrassant & condensant maximè — Certa hæc sunt omnia & constantia, Sanguis enim, tali perdurante Aeris Constitutione, densus est admodum, atque glutinosus plerumque, vel si è Sanissimis emittitur, multò magis ubi Febris accedat.

Verùm enimverò nec protinùs oritur morbidus hic Lentor, nec in omnibus, fit namque gradatim, cum diu nimirum regnaverit aquilonia & sicca Tempestas, neque enim interest quales Dies sint, sed & quales etiam antè præcesserint. — Atqui laxis nimium & pituitosis Hominibus adeò non nocet hæcce Constitutio, ut vel sit apprime utilis, firmos hos magis, ac vegetos, efficiendo; una sic Natura, Præceptore optimo notante*, ad Hyemem, alia ad Æstatem, benè aut malè se habet. — Hinc insuper esse videtur quòd una Febris *epidemica* fortibus est funesta & robustis, parcitque imbecillis, alia verò, sub humido tepidoque Cœlo nata, in hos teneros maxime sævit. — Ex magnis igitur *Atmosphæra* Mutationibus vel mutatur maximè Morbus popularis, vel supprimitur prorsus; quòd persæpè videmus.

Ad Mala autem siccae & frigidae Tempestatis præ-

* Hippocrat. Aphorism. 2. Sect. 3.

præcavenda (imò & tollenda) utendum est multa, diluente, emolliente, tepida Potione, Vi-
ctuque molli & relaxante, neque unquam antè
progredi quis debet quàm tepidum aliquem Po-
tum assumpserit, sive Pedibus, sive Equo, eun-
dum est contra Ventos aquilonares; at si inhor-
rescat aliquis, indè, ac febricitet, mittendus est
actutum Sanguis, potissimum si Thoracis, aut
Lateris, Dolor impetat; idque sanè mox repeti
debet si Febris invalescat—Hoc utiquè perpe-
tuum est quòd Sanguis nunquam tutius, aut fe-
licius, in Morbis acutis mittitur, quàm frigidas
inter & siccas Aeris Constitutiones, altius per-
stante *Barometro*: nec in Pleuriticis solùm &
Peripneumonicis consentaneum hoc est, sed in
aliis plurimis, utpotè *Variolis*, *Morbillis*, *Rheu-
matismo*, *Colica*, &c.—imò in ipsis Febribus in-
termittentibus, quotidianis putà, ac tertianis,
opportuna tunc sæpe est Venæ Sectio, per Initia
saltem, ex facili aliter in continuas ardentes, aut
inflammatorias, haud rarè mutantur.

E contrario, humida tepidaque *Atmosphæra*
Κατάσχοι Fibras relaxat nimium, Vim Vasorum
enervat, Sanguinem debito solutiorem, pituito-
sum, inertem facit, totumque Corpus hebes, hu-
midum, languidum, Febribus lentis, putridis,
intermittentibus longis, obnoxium—Hic ergo
contraria prorsus Diæta, atque Medicina, est ad-
hibenda; quæ solidas Corporis Partes firmare,
quæ Fluidorum *Crasin* conservare, quæ validè
compingere Globulos sanguineos possint, indi-
cantur; Potus nempè subausterus, frigidus, ge-
nerosus, Viætus valentior, desiccans, astringens,
Balneum frigidum, ejusque Generis alia.—Ad
hujus autem Constitutionis Febres parùm utiquè

confert Sanguinis Detractio, quinimò nocet admodum, si sit effusior, oriuntur namque ab imminuta Cordis & Arteriarum Potentia, à laxa nimium Sanguinis Textura, & lentefcente Lympha; tendit hinc ad *Stasin* atque Putredinem Liquidum Vitale, unde Febres intermittentes, lentæ, putridæ, malignæ, hujus Tempestatis semper sunt Soboles; in quibus quidem curandis, quæ Vires foveant desiderantur, quæ minuant neutiquàm — Sæpissimè etiam, dum talia permanent Tempora, quotidianæ, ac tertianæ, in longas continuas putridas Febres degenerare solent, haud levi cum Ægrotantium Periculo, quas si tandem effugiant, in Icterus, atque Hydropem, incidunt plerumque. — Nunquam profectò citius, neque felicius, restituantur Ægrotantes, quàm sudo effulgentè Cœlo, altrèque in *Baroscopio* stante *Mercurio*; hoc ego observavi constanter, idemque olim notavit percelebris *Frid. Hoffmannus*, in Medicina faciunda diutissimè versatus, lentissimè contrà convalescunt, dum nubilus perflat ac pluviosus Auster.

Cæterum & haud parum insalubris est gelidus humidusque *Atmosphæra* Status, multis quippè Modis obest, præcipuè frigidos insinuando in Corpus Humores, atque *Perspirationem* inhibendo plurimum* — bene tunc nobis cingendum est Vestibus, luculento etiam Foco, debitoque Vitæ Regimine, ab algidis Vaporibus, quantum possibile, cavendum est; omnibus denique Modis *Perspiratio* est promovenda, inter quos frequens
totius

* Vel paucae subitaneæ Nubes sub fervido Cœlo *Perspirationem* impediunt plurimum. Vid. Observat. accuratissimæ *Job. Lining*, M. D. *Philosoph. Transact.* N. 470.

totius Corporis Frictio ad Ignem confert plurimum, necnon Exercitatio quotidiana *, eaque etiam paulò fortior.

Semper aded pugnare debemus contra peculiarem Aeris Intemperiem.

Eluceant magis forsan, quæ dixi suprâ, si Morbos *endemicos* perpendamus; horum namque Pars longè major haud Dubio nascitur à singulari cujusque Loci, ubi infestant, *Atmosphæra* Depravatione; in Locis videlicet cavis, palustribus, uliginosis, grassantur semper Febres lentæ, putridæ, intermittentes, irregulares, quæ nullis ferè cedunt Remediis, nisi mutato prorsùs & Loco & Aere, ibi quoniam *Atmosphæra* humidis perpetuò & noxiis abundat Vaporibus, qui Vim *Fibrarum* debilitant, *Perspirationem* supprimunt, corrumpunt Humores — ideoque si quis Advena, udus in his Locis, crassoque versatur Aere, per Dies vel paucissimos, certò ferè certius ægrotabit — si retentum namque *Perspirabile* nec per Alvum, nec per Urinam, neque per ipsos Cutis Meatus, intra perbreve Tempus expellitur, Febris † mox creat plùs minùsve; eòque fit gravior, quò major fuerit retenti Quantitas, quò acrior Qualitas ejusdem ‡. — Æstate igitur, vel Autumno, magno dum Calore aciores multò facti sint Humores, intercepta *Perspiratio* maxime nocet.

A 5

Con-

* Quantum promovet Perspirationem. Vid. elegantissima Experimenta *Georgii Rye*, Armigeri, in *Medicina Statica Hybernica*; ad Calcem Libri Doctiss. Doct. *Rogers* de Morbis epidemicis.

† *Sanctorii* Aphorism. 11. Lib. 1.

‡ ————— 46. ibid. — 35. Sect. 2.

Contrà qui Montès habitant aridos, Aquilonem spectantes, Febribus *inflammatoriis*, Pleuritide, Peripneumonia, Angina, affliguntur plurimùm: Has utiquè in Locis editioribus frigidis, Septentrioni expositis, crebrò notavi esse perfrequentes, cum per Valles autem rarus fuerit admodùm aliquis Pectoris Morbus—Quid quod & interdum vidi Febrem *Catarrhalem epidemicam*, *Pleuro peripneumoniæ* Naturam induisse per Loca montosa & algida, dum in humilioribus ad lentam proximè (seu *nervosam* ut dicitur) Febrem accessit—Hinc equidem haud obscura videtur Ratio, cur uno, eodemque, regnante Morbo populari, variis in Locis, diversus celebratur Modus medendi.

Sed & hìc quoque Ratio Ventorum habenda est plurimùm, *Atmosphæram* quippe maximè mutant: Boreas nimirùm ficcā, frigidā, ac ponderosā, facit; Auster verò humidā, levem, atque tepidā: magnā adeò Vim habent Loca reddendi salubria vel insalubria, & diverso planè Modo afficiuntur Incolæ, hoc perflante, vel illo, Vento—Qui frigidis ergo læduntur & siccis, humectare, ac tepida subinde Potione fovere, Corpora debent, qui humidis, ficcare; semperque peculiari Aeris Inclementiæ Victu, Regimine, atque Medicina, obstandum est—Neque hoc solum, sed & noxios adversus Ventos, quantum fieri potest, muniendum est, Ædificia scilicet extruendo sic, ut quàm minimè sint objecta Flatibus perniciosiss—Pestilentiae quondam, Corcyraë grassanti, occurrebat *M. T. Varro*, occlusis Fenestris Austrum spectantibus, aliis ad Arctum apertis*
—Ma-

* *Varro* Lib. I. Cap. 4. inter Scriptores de Re rustica, ex Edition. *Gesneri*, *Lipsiæ*, 1735. 2. Vol. 4.

—Magna sanè fuit Præscorum Diligentia in Ædificiis condendis & Oppidis, ut prospera foret Incolarum Valetudo; Viscera etiam Animalium, iis in Locis pascentium, ubi Ædes ponere statuebant, sedulò perscrutabantur, an nempe sana essent, vel insana; atque ita prospiciebant futuræ Habitantium Saluti, omnibus Modis quærentes Salubritatem* —Nunc verò Dierum, in Ædificationibus, plerumque plaris æstimatur Lucrum atque Mercimonium, quàm Salubritas —de quibusdam herclè, ut de Mitylene olim *Vitruvius*†, verè dicendùm est, “Auster cum
 “ fiat Homines ægrotant, cum Corus, tussunt,
 “ cum Septentrio, restituuntur in Sanitatem, sed
 “ in Angiportis & Plateis non possunt consistere
 “ propter Vehementem Frigoris” —Haud pauca Ædificia quidem in Convallibus paludosis ita malè locata sunt, ut nunquam non Morbis infecta sint; quorum Possessoribus utiquè Consilium commendo laudati *Varronis*‡, “ea vendant quot
 “ Assibus possint, aut, si nequeant, relinquunt.”

Sed hæc obiter; qui vult plura de Situ Locorum, adeat magni *Hippocratis* Librum de *Aere, Aquis, & Locis*; porrò Librum secundum de *Dietâ*, ubi etiam de diversorum Ventorum Natura —perplurima certè in his lectu sunt dignissima.

Quamquam aliquæ Febres *epidemicæ* à Contagione ducant Originem, oriuntur attamen plures ab Intemperie Aeris manifesta, neque enim probabilis magis videtur communis Morbi Causa, quàm

* *Vitruv.* Edit. *Philandri*, 4. Lib. 1. Cap. 4.

† ————— id. Lib. 1. Cap. 6.

‡ *Varro* de Re rustica, Lib. 1. Cap. 12.

quàm ipse Aer omnibus communis—Per humi-
das equidem tepidasque *Atmosphæra* Constitutio-
nes, permanentes diu, Febres lentæ, putridæ,
malignæ, semper grassantur, sicuti observavit
tota Medicorum Schola ab ultima Antiquitate ad
hoc usque Tempus; nec profectò cessant tales
nisi omninò mutata Aeris Temperatura, quod
etiam persæpe supprimit brevè ipsas contagiosas:
—imò ipsæ Pestilentia ut plurimùm occurrit sic-
cum Frigus hybernus; frequenter autem nimis,
sub humido calidoque Cœlo, Vim maximam
accipit.—Atque Ego quoque novi sæpiùs Fe-
bres putridas, malignas, per æstuosam ac nebu-
losam *Atmosphæram*, tum Vi, tum Numero, au-
ctas maximè, mox tamen sicco flante Borea ge-
lidoque, extinctas penitus—Imò ipsæ Procellæ
sæpe juvant admodum morbida dissipando *Mias-
mata*: haud minùs corrumpitur stagnans Aer,
quàm Aqua stagnans, quæ citò, nisi movetur su-
bindè, putrescit.

Quidam insuper Morbi singulis Anni Tem-
pestatibus respondent, Pleuritides nempe, Peri-
pneumoniæ, Anginæ, tertianæ Febres, Tempori
verno, Autumno autem quartanæ, putridæ, ma-
lignæ, Cholera, *Dysenteria*; quod nimirum so-
lita, istis Temporibus, Aeris Dispositio his pro-
ducendis Morbis, aut illis, faveat—Atqui si in-
tempestivè se habuerint Tempestates, Morbi proin-
dè variabuntur maximè ita ut isti, qui Autum-
no sunt proprii, per calidum humidumque Ver
dominari possint, per Autumnum verò frigidum
Febres Veri magis peculiare, utpotè Pleuritides,
Peripneumoniæ *, &c.—Sed plerumque in Fe-
bribus

* Hippocrat. Lib. de Humor. Sect. 7.

bribus autumnalibus, qualescunque sint, Humores longè magis ad Putrescentiam tendunt ob prægressum Æstatis Calorem, nec adedò largum admittunt Sanguinis Dispendium. — Suppressa, ex suscepto Frigore, *Perspiratio Vere Febres inflammatorias*, Autumno putridas plerumque, aut malignas, generat* — imò si, per Autumnum instant Alvi Fluxus, multò magis acres sunt, ac biliosi, quàm Tempore verno, ut satis superque Medicis notum est — Æstatis siquidem Ardor *Perspirationem* auget maximè, Corporis humidissima diffilat, Sales Oleaque animalia exasperat, undè nascitur sensim magna Sanguinis Acrimonia; quæ ad Autumnum usque increscit, nisi diluentibus idoneis, atque demulcentibus, temperatur quotidie.

Sed audi de his Rebus Coum Oraculum †, Naturæ Interpretem: — “ Omnium Generum
 “ Morbi profectò omnibus Temporibus fiunt,
 “ quidam verò in quibusdam magis gignuntur,
 “ & exacerbantur, *Aphor. 19. Sect. 3.* — Quæ
 “ lia Tempora (ὥραι) tales Morborum Consti-
 “ tutiones — Tempora tempestitiva, & bene ordi-
 “ nata, Morbos regulares (εὐσαθείας) & judicatu
 “ faciles faciunt. *Lib. de Humorib. Sect. 7. &*
 “ *Aphorism. 8. Sect. 3.* — Atqui, prout variaverit
 “ Tempus, similes, aut dissimiles erunt Morbi,
 “ qui

* *Sanctor. Aphor. 35. Sect. 2.* † Citavi plerumque *Hippocratem* ex Editione *Lindeni*, non quòd hanc valdè probo (nam *Foesianam* huic longè ante fero) sed quia *Textum Hippocraticum* in varias distribuit Sectiones; quo faciliùs inveniuntur Loca citata.

“ qui in hoc oriuntur , Lib. 1. de Humor. Sect.
 “ 7. — Conversiones Temporum * (Anni) maxi-
 “ mè patiunt Morbos , & in ipsis Temporibus
 “ magnæ Mutationes, Frigoris putà , aut Calo-
 “ ris; & sic de cæteris, *Aphorism.* 1. Sect. 3. Lib.
 “ de Humorib. Sect. 8. — Constitutiones Hominum
 “ aliæ ad Æstatem, aliæ ad Hyemem, benè aut
 “ malè se habent, Morbi porrò ad Tempora ,
 “ *Aphor.* 2. 3. Sect. 3. Lib. de Humor. Sect. 8.
 “ — In Anno autem aliquando Hyems maximè
 “ prævalet, aliquando Ver, modò Æstas, modò
 “ Autumnus, Lib. de Natur. Homin. Sect. 16.
 “ — Hyeme Pituita in Homine augetur, ibid.
 “ Sect. 12. — Vere Pituita magis dominatur, at
 “ Sanguis increfcit, ibid. Sect. 13. — Æstate San-
 “ guis adhuc viget, sed & Bilis exaltatur; per
 “ Æstatem etiam, ac Autumnum, Bile Corpus
 “ abundat; Autumno autem atra Bilis plurima
 “ est & fortiffima, Sanguis verò parciffimus,
 “ ibid. Sect. 14.

Quicunque Morbi Hyeme augescunt, Æstate
 cessant, qui per Æstatem increfcunt, desinunt
 Hyeme, Lib. 3. *Epidemic.* Sect. 3. & de Natur.
 Hominis, Sect. 17. — Sin autem diu productam
 Hyemem insequitur Ver perfrigidum, hyberni
 fiunt Morbi, Tusses, Peripneumonix, Anginæ:
 — quinimò si Ver processerit More Autumni
 Morbum regium producit, licèt propriè fit Mor-
 bus autumnalis, Lib. de Humor. Sect. 7. — Siqui-
 dem verò hæc, vel illa, Anni Constitutio dura-
 verit diutiùs, Morbi huic congruentes diutiùs
 quo-

quoque permanebunt, atque eò erunt fortiores, quò magis prævaluerit & perduraverit Tempestas peculiaris; etiam & communissimi grassabuntur, & perlongo Tempore perstabunt, *Aphorif. 7. Sect. 3. Lib. de Humor. Sect. 9.* — Ex Anni Constitutionibus Siccitates (*Αὐχμοί*) sunt pluviosis salubriores, ac minùs lethales, *Aphor. 15. Sect. 3.* — Etsi per magnas Siccitates Febres acutæ, *ibid. Aphor. 7.* — Sed in valdè pluviosis Febres longæ, putridæ, Alvi Fluxiones, Anginæ, Apoplexiæ, *ibid. Aphor. 16.* — Austri Caput gravant, Corpus dissolvunt, & humidum, languidum, hebes faciunt* — Aquilo Tussim movet, Fauces exasperat, Ventrem astringit, Horrores excitat, item Dolores Lateris & Pectoris, attamen Corpus compactum, firmum, agile reddit, & benè coloratum, *ibid. Ap. 5. 17.* — & *Lib. de Humor. Sect. 8.* — Aquilo enim omnium Ventorum est maximè siccus, atque idè saluberrimus; Auster verò quoad omnia huic contrarius, *Lib. de Morbo Sacro. Sect. 15.* — Si Hyems sit moderata, nec valdè mitis, nec valdè frigida, Vere porrò, ac Æstate, tempestiva decidat Pluvia, Annum esse saluberrimum consentaneum est *Lib. de Aere Aquis & Locis, Sect. 25.* — At si sicca sit Hyems, atque aquilonia, Ver autem pluviosum, & australe, erit Æstas Febribus abundans; nam Æstu mox accedente, non potest fieri quin acutissimæ Febres perplurimos invadant, præcipuè pituitoscs,

* Νότος καρηβαρὺς, idè aptissimè hunc plumbeum vocat *Horatius, Lib. 2. Satyr. 6.*

Ios, Dysenteriae verum Mulieres & Viros humidiores, ibid. — Atqui si circa Caniculæ Exortum accedunt Pluviae, frigidique Aquilones*, Spes Cessationis est, necnon Autumnus salubris, ibid. Sect. 26. — Si quando Æstatem pluviosam, atque austrinam, similis sequitur Autumnus, plurimos Morbos excitat Hyems — Siccæ autem Æstati, Boreaue perflatae, pluvius, & australis, succedens Autumnus, Hyeme producit Capitis Dolores, Cerebri Corruptiones†, Gravedines, Raudedines, Tusles, imò & Tabem, ibid. Sect. 28. — Quòd si aquilonius sit Autumnus & siccus, neque Pluviae sub Cane, nec vel sub Arcturo, decidunt, confert equidem pituitosis, humidis, ac Mulieribus; biliosis verò nocentissimum est, quod humidissima Corporis dissipat, crassissima autem & acerrima relinquit, ibid. Sect. 29. — Medicus ideò sic Morbis occurrere debet, ut respiciat semper cum Hominum Constitutiones, tum etiam varias Tempestatum Mutationes, contraria nempe contrariis curando; oportet igitur laxa nimis constringere, solvere stricta, Lib. de Natur. Hominis Sect. 17. 18.

Nec tantum reverà diversos diversarum Tempestatum Morbos descripsit optimè divinus Senex, sed optimum quoque Regimen, atque Medicinam, ad hos præcavendos, ac curandos, præscripsit, præcipuè in Lib. de Salubri Victus Ratione, necnon per Initia Lib. 3. de Dieta — Sed ista
jam

* Καί χειμών ἄοι Ἐγίσται.

† Σφακέλους τοῦ Εγκεφάλου.

Iam nunc perscribere longum est — Hæc pauca verò passim ex Scriptis *Hippocraticis* excerpti, & paulò forsan transtuli liberiùs, cum eotamen (ni fallor maximè) ut Sensum semper Auctoris tradiderim fideliter — Sed propiùs ad Fontes accedite, Medici Tyrones, atque haurite affatim, percipietis indè quàm sagax, quàm admirabilis fuit Priscorum Diligentia — videbitis utiquè non minùs ingeniosam fuisse antiquitùs Observationem, quàm nunc Rationem; ut pulchrè de Veteribus olim dixit *Caius Plinius*, *Histor. Natural. Lib. 18. Capit. 29.*

At enim si quis fortasse hiis objiciat, quòd Observationes ab *Hippocrate*, suaque Schola per Græciam factæ, ad Nostrates pertinet parùm; sciat ille velim, similem esse ubiquè Hominum Naturam, sicco nempè Frigore semper & constringuntur Corporis humani Solida, & condensantur Fluida, hæc porrò utraque humidus Calor solvit semper; nusquam non minuit *Perspirationem* uda frigidaque Tempestas, hanc nusquam non promovet tepida Serenitas: adeòque magnæ Aeris Mutationes, quòd ad Calorem, aut Frigus, Siccitatem, aut Humiditatem, magnos pariter ubiquè Terrarum fortiuntur Effectus — Nec profectò multùm differre videntur; facta diligenter Comparatione, Observationes *Hippocraticæ* ab illis, quæ captæ fuerunt nuperis Annis, & in Locis à Græcia longè longèque remotis, inter etiam

et penitus toto divisos Orbe Britannos.

Sed diluit hanc Objectionem optimè clarissimus

mus *wintringhamus* in Prolegomenis ad Commentarium suum Nosologicum: — Subjiciam verò & ipse, quòd etiamsi Græciæ Regiones Cælo magis clemente gaudeant quàm Insula nostra, haud levibus tamen Aeris Mutationibus subjectæ sunt frequenter; imò in ipsis Constitutionibus, ab *Hippocrate* descriptis, leguntur subinde, Ὑδατὰ πολλὰ, Αὐχοί, Χεῖμῶνες μεγάλοι, Χιόνες μεγάλαι, Οὐρανὸς λαίλαπτός, ἐπινέφελοι, &c. quin ejusdem planè Generis Febres populares apud *Hippocratem* passim occurrunt, quibus & nostra quoquè *Britannia* plectitur subindè — *Epidemica* quippe Febris Effectus tantum est Causæ morbificæ, ista autem Causa plerumque peculiaris *Atmosphærae* Constitutio, adeòque hanc gignit aquilonia, illam austrina, ubicunque nimirum hæc, vel illa, diu duraverit.

In sequente (necnon in præcedente) Morborum *epidemicorum* Historia, non tantum Febres popularim grassantes exposui, sed & hos etiam Morbos, qui unà cum istis sparsim intercurrerant; eo scilicet Animo, ut singulorum indè Natura clariùs innotesceret; sequens in hoc utiquè magni Præceptoris Vestigia, qui in describendis Aeris & Morborum Constitutionibus hanc tenuit Rationem. — Sæpe quippe sæpiùs accidit, dum Pleuritides & Peripneumoniæ per siccam valdè & frigidam Tempestatem sæviunt, Anginæ quoque, Ophthalmiæ, Rheumatismi, Cruciatus Intestinarum, eodem etiam Tempore, multos infestant; atque ut plurimum haud minùs ab inflammato, ac viscido Sanguine pendent quàm ipsæ Pleuritides; nec minùs Sanguinis Missionem postulant; aliis quanquam Temporibus meliùs mul-

tò Pur-

tò Purgantibus discutiantur . — pone jam aut *Variolas* , aut *Morbillos* , tunc unà grassari , longè tum sanè liberius , cæteris paribus , Venæ Sectionem , his in Morbis , consulerem , quàm ubi non talis prævaluerit frigida *Atmosphære* Temperies , nec proindè tam viscida Sanguinis *Diathefis* .

Si noscimus equidem qualem Sanguinis *Crasin* hæc progignit , vel illa , *Atmosphære* Constitutio , satis benè conjectare possumus , quales indè Corporis Affectiones sint futuræ , qualiaque possint Remedia ; Morbi enim , ut monet *Hippocrates* , non derepentè Hominibus accedunt , sed paulatim sunt collecti , licèt erumpant iubitò ; — * Exempli Gratia ; robustis & exercitatis Homini- bus insitus est naturaliter Sanguis densus atque tenax , adventante jam arida , & aquilonia Tempestate , Fibræ vasaque magis adhuc constringuntur , magisque densa atque crassa redduntur Fluida , usque eò ut Sanguis tandem fiat valdè glutinosus ; his jam ita constitutis , mox oritur facillimè , ex Frigore suscepto , Labore nimio , Ingluvie , aut quolibet ferme , in Vita , Errore , Lentor inflammans , qui infixus nunc Pulmoni Peripneumoniam , nunc Pleuræ Pleuritidem , nunc Intestinis colicam Inflammationem , generat .

Vides adeò , Lector amice , quantum ad Prophylaxin valeant Observationes meteorologicæ , quantumque etiam ad Morborum Curationes . —

His

* Lib. i. de Diæta Sect. 3.

His igitur frui modò , tandemque meliores ede . — Quatenùs nobis denegatur diu vivere , relinquamus aliquid , quo nos vixisse testemur *.

DE

ET

ANNO MDCCXXVIII.

* Vide Menf. Januar. 1718. Vol. primi.

Nox procellosa 2. w S w 4. Procella 5. p. m. S w 4. Fulgur, Tonitru, & Turbo vehem. tissimus 6. Hora sexta p. m. Procella 7. p. m. S w 4. gravis Procella 9. p. m. & tota ferè Nocte S w 4. Nix & Grando 11. Gelu 14. 15. N N w 1. Magna AB. 14. H. 10. p. m.

γ Altitud. maxim. 17. 30. 5. N 1. } media 29. $9\frac{12}{29}$
 ——— minim. 9. 29. 0. S VV 4x. }
 Dies frigid. 11. 66. N N VV 1. } media $54\frac{7}{29}$
 — tepid. 23. 48. Malacia. }

Febris *Catarrhalis* & *Rheumatismus* passim ; *Pleuritides* aliquæ , *Peripneumonia* notha * verò longè frequentior est ; Tussis creberrima ; gravis Arthritis torquet permultos . Febris lenta , *nervosa* frequens, quæ nonnunquam, rubris urentibus Pustulis, Die nempe nono, undecimo, aut decimo quarto, erumpentibus, solvi videtur, maximè si crassæ, subsidentes Urinæ concurrunt . Haud multum utique Boni sperandum est ab Eruptione Pustularum dum Urinæ crudæ prorsus & tenues perstant ; in ipsis etiam *Variolis* ac *Morbillis* pessimè significant : Ne vel ullus Sudor salutifer habendus est, dum aquosa fertur Urina .

Nova Luna 7°. FEBRUARIO. *Plena Luna* 23°.

Perstitit ad quintum Februarii Diem humidissimus *Atmosphææ* Status, tunc Boreas discussit Vapores rigido accedente Gelu : à decimo sexto ab Occidente plerumque Ventus, ac alia Rerum Facies.

Pluvia

* Vide quæ de *Peripneumonia* notha dixi, *Essay on Fevers*, p. 222.

Pluvia 8. ¹⁶ 17. ¹⁸ 20. ²² 24. 26. 27.
Dig. Dec.

= 0. 928.

Nix super Montes 14. nulla hic autem.

8 Altitud. maxim. 6. 30. 4. ENE 1. } media 29. $8\frac{4}{28}$
— minim. 18. 29. 0. S VV VV 3. }
Dies frigid. 13. 75. N E IX. }
— tepid. 1. 49. N VV b VV I. } media $58\frac{3}{28}$

Tussis & Angina inter Equos valdè frequentes, haud pauci suffocantur. — *Pleuritis*, aut *Peripneumonia*, multos corripit Homines, spuria tamen est ut plurimum; Tusse permultæ.

Tempestatas quidem haud insalubris est, at plures jam *Phthisi* tabescunt pulmonaria, cui dedit Originem malè judicata Febris *catarrhalis* * hic maximè sæviens ultimo Novembri & Decembri. Periclitantur admodum qui Asthmate olim, aut Tussicula sicca, laborabant, quorum in Pulmone nempe delituerant Tubercula; quæ, cum sint Impedimento trananti Sanguini, facilè inflammantur, ac in ulcera tandem degenerant; vel, negata, his in Locis obstructis, Sanguini Via, nimius ruit ad alias Pulmonum Partes, unde *Hæmoptoe* sequitur denique, aut Inflammatio, aut tabifica in *Bronchiorum* Cava Destillatio.

Non omnis utique Tabes pulmonaria ab Ulcere pendet (rarior enim est hic Casus quàm vulgò putatur) plures enim quotidie per longum Tempus immensam Muci falsi, dulcis, vel etiam planè insipidi, Copiam per Tussim rejiciunt,
B 2 cui

* Post nimias Destillationes Tabes, *Cels.* Lib. II. c. 7.

cui nec Foetor inest, nec purulenti aliquid, Glandulis nimirum cum Ductibus Asperæ Arteriæ relaxatis nimium. Hoc tamen sæpe, licet Ægros diutiùs trahens, haud lethale minùs fit quàm si vel ipsam Saniem expuissent. Haud absimilis interdum Laticis vitalis est Profusio *Diabete* laborantibus; simile quid sæpe *Diarrhœa* tabescentibus, ubi ne vel minimum Ulcus, ut incisus Cadaveribus patuit. Nuper trimulum incidi Pue: rulum pertinace admodum Alvi Fluxu peremptum: hujus Intestina peralba, tenuissima, sedula quasi arte deterfa inveni, minimè autem ulcerata.

Augetur semper hoc Malum ex levissimo suscepto Frigore, occlusis scilicet Cutis Spiraculis, maximum fit in Pulmones Influxum; haud aliter sanè quàm persæpe videmus retentum *Per-spirabile* per Nares depluere. Contra sicca frequenter urget Tussis, & spirandi Difficultas, obstructis adeò & induratis Pulmonum Glandulis, ut in lapideam penè abeant Duritiem*, dum *Bronchia* præ nimia Siccitate rigescant, Mucò naturali deficiente. Quis non videt quàm diversam prorsus Medicinam poscunt hæc duo Mala, utcunque in Praxi faciunda haud semper satis probè servatur Distinctio? Nec pauci sunt equidem, qui in omni ferè Tussi, sit sicca, sit humida, *Oleosa*, *Emollientia*, *Dulcia*, *Ecclegmata* porrigunt. Id quidem in priore rectè satis, modò *Incidentia* aliqua commista sint; secus longè ubi

* Haud ita pridem Juvenem generosum, tabidum, vidi Lapillos asperos extussientem, qui, Tracheam lacerantes, haud leve Sanguinis Sputum movebant.

ubi serosa Colluvies inundat Pulmonem; Relaxant enim nimis, Humoribus Lentorem inferunt, & Perspirationem impediunt; unde augetur vel ipse Morbus. Cibi insuper Appetentiam & Concoctionem pessundant, demumque Diarrhæam colliquantem inducunt. Rectius multo blandè moventia Sudores *, inter Scapulas Epispastica, ac lenia subinde Cathartica præcipienda sunt, interpositis crebrò Anodynis; maximè si sit tenuis admodum ac irritans Illuvies, hanc enim demulcent & incrassant, quo facilius longè per Sputa emolitur. Porro ad hoc Genus Valetudinis plurimum facit Decoctum Corticis Peruviani cum Ligno Guaiacino & Styrace, quod in altero Casu foret nocentissimum: Nec inutiles hic sunt Suffitus * desiccantes idonei, qui quidem in Destillationibus haud parum valent.

Ubi verò Tracheæ & Bronchiorum Glandulæ obstruuntur, nec satis oleosi Mucoris secernunt ad lubricandas eorum Membranas; atque, uti sæpe fit, Lacerti musculosi Asperæ Arteriæ † & Bronchiorum rigidi sunt, ac nimis contracti, ibi lenis, emolliens, tepida Potio, ejusque Vapor, hausta sæpissimè proficiunt maximè, oleosis, & relaxantibus subinde assumptis.

B 3

Nova

* Vide Bennet. Theatr. Tabidor. Sect. 28. 30. &c.

† Andr. Laurent. Hist. Anatomic. Lib. 9. c. 14. porro Jo. Bapt. Morgagni Adversar. Anatomic. Sect. 25.

Nova Luna 9°. *MARTIO*. *Pleno Luna* 24°.

Principio *Ventus borealis* afflavit, mox irru-
bat *Auster* madidus, à decimo autem ad deci-
mum sextum *Aquilo* siccam fecit *Atmosphæram*
& frigidiorē: Libs inde ut plurimū, *Pluvia*
sæpe cadente.

Pluvia 5. ^u8. 9. 11. ¹17. 18. 19.—22. ^u23. 24.
Dig. Dec.
^u28. ¹29. 30. *Grando* 1.—1. 730.

Levis Procella 8. p. m. S S w 4^r.—*gravis*
Procella 19. Mane S 4^r.

Altitud. maxim. 31. 30. 1. NN VV 1. } *media* 29. ²⁴/₃₀
——— *minim.* 8. 28. 8.
Dies frigid. 16. 62. NN E 1. } *media* 54⁶/₃₀
— *tepid.* 22. 46. S S VV 2.

Frequens Ophthalmia; *Tusses plurimæ* & a-
cres admodū, quæ utique *Exitio* sunt pluribus;
illis maximè, qui *Asthmate* vetere laboraverant,
aut quibus infelix *Exitus epidemicæ* *Febris hye-*
malis obstructum *Pulmonem*, & *Pectoris Op-*
pressionem intulerat; cita nempe *Phthisi* ab-
reptis.

Pleuritides & *Peripneumoniæ* frequentes; sæpe
etiam & *Latus* vehementer affectum est & *Pul-*
mo; *Morbū* vocant *Pleuripneumoniam**, in
quo, dum sævit *Lateris Dolor*, urget simul
Tussis & *Pectoris Gravitas*: Fit evidencior si
Sputa sanguinolenta exantlantur.

Jam

* Vid. *Librum Nostrum de Febris, &c. (Essay on Fe-*
vers) *Cap. de Peripneumon. &c. p. 199.*

Jam certè multa Sputa cocta, facilia, non multo Sanguine tincta, Morbum solvunt feliciter; sæpe tamen vel tenuis prorsus & acris Colluvies ejicitur, vel vana sunt omnino Naturæ Conamina, eludente nimirum pertenui & incocto Humore Vim Pulmonis: Pessimum certè ubi nihil excreatur, aut nil nisi crudum & spumofum*.

Nunc quoque in his Malis pulmoneis haud rarò erumpunt Pustulæ magnæ, urentes, imò etiam interdum dolentes valdè, circa Pectus, Scapulas, Cervices, quinto circiter aut septimo plerumque Die, quarum aliquæ plurimùm acerrimum fundunt *Ichorem* †: Felix hoc semper ferè & faustum fuit Ægrotis. — Diligenter utique in Morbis notandum est, quò Natura sua Sponte vergit; adeò cum Pustulas excitet, aut Furunculos in Humeris, aut Cruribus, per eas quoque Vias Arte tentandum est Morbum levare, admotis *Epispasticis*, *Cucurbitulis*, &c. — In omni itidem Naturæ Molimine, sive sit per Cutim, sive per Alvum, aut Urinæ Vias, aut libera Sputamina, invigilandum est Medico ut idonea & concurrentia adhibeat Auxilia.

Nova Luna 8º. APRILI. Plena Luna 23º.

Varius fuit Ventus variaque Tempestas hoc Mense, Imbre, ut solet, decidente frequenter: Exeunte Mense Eurus spiravit plerumque, isque frigidus valdè.

B 4

Pluvia

* Vid. Librum Nostrum de Febris, &c. (*Essay on Fevers*) Cap. de Peripneumon. &c. p. 199.

† Φύματα, Hippocrat.

Pluvia 1. 4.—6. 11. 12. 14. 15. 19. 21.

Dig. Dec.

22. 23. 24. 25. = 1. 110.

Glacies 20. 24. E N E 1. Levis AB. 5. H.
10. p. m. 10. w N w 2.

Altitud. maxim. 17. 30. 2. Eb N 1. } media 29. $6\frac{1}{3}$.
minim. 23. 28. 8. VV S VV 2. }
Dies frigid. 20. 56. E N E 1. } media $47\frac{1}{3}$.
— tepid. 13. 40. S VV 2. }

Plures *Ophthalmia* vexantur; Tusses plurimæ; haud pauci jam acri Tussi & *hectica* Febre consumpti pereunt. Id utique perpetuum est, quòd sæviente *epidemica* Tussi *Asthmatici* & pulmonarii pessimè se habent; novo nimirum accedente Malo veteri Morbo.

Qui *Phthisi* laborant periclitantur maximè in eunte Æstate, quoniam augescente indies Tempestatis Calore Sanguis expanditur, unde transit difficiliùs per obstructos Pulmones, hinc etiam augetur *hectica* Febris & Sudor colliquans. Tales ideò Ægrotantes hortor, ut se tunc Ruri recipiant, ubi Aura purior & frigidiuscula, lenis & accurata Diæta, forsan & missus paulatim Sanguis, si nimium ebullit, rapidum Morbi Cursum reprimere possunt.

Nova Luna 7°. MAIO. Plena Luna 22°.

Ventus australis, perpetuus ferè ad Diem vicesimum Mensis, Argentum vivum in *Barometro* suppressit, Aeremque fecit densum ac humidum: inde per tres Dies Boreas, postea Zephyrus.

Pluvia

Pluvia $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ 6. 9. 10. 12. $\frac{1}{13}$ $\frac{11}{14}$ $\frac{1}{15}$ $\frac{1}{17}$
 Dig. Dec.

18. 20. 21. — 24. 26. 27. 30. = 1. 544.

8 Altitud. maxim. 21. 29. 8. N E 1. } media 29. 4.
 ——— minim. 5. 19. 0. S S VV 1. }
 Dies frigid. 2. 54. S S E 2^x. } media 38 $\frac{8}{29}$
 — tepid. 21. 30. Malacia p. m. }

Tusses, Gravedines, & Ophthalmia humidæ frequentes: Quosdam Apoplexia, quosdam Paralysis corripit; Pleuritis & Peripneumonia multos præcipuè ineunte Mense: Febres intermittentes passim.

Nova Luna 6°. JUNIO. Plena Luna 20°.

Constans fuit ab Occidente Ventus per totum Junium, nunc ad Austrum, nunc ad Septentrionem flectens; inde Pluviæ satis & Frigoris; Aer interim factus est crassus valde & humidus.

Pluvia 2. 4. 7. 8. 10. $\frac{1}{11}$ $\frac{11}{12}$ $\frac{1}{13}$ $\frac{1}{14}$ $\frac{1}{15}$
 $\frac{111}{16}$ $\frac{11}{20}$ 22. — 24. Grando vehemens 12. 13.
 Dig. Dec.
 = 2. 398.

Circius admodum ferox 1. p. m. Procella 14. prima Nocte S w 4^x. — 20. Mane S w b S 4. Fulgura 11. Nocte.

8 Altitud. maxim. 30. 29. 9. N VV 1. } media 29. 4 $\frac{15}{28}$
 ——— minim. 16. 18. 9. S VV 2. }
 Dies frigid. 18. 42. VV N VV 1^x. } media 34 $\frac{15}{28}$
 — calid. 30. 24. Malacia p. m. }

Tusses

Tusses acres & implacabiles ferè sunt valdè frequentes, multæ quoque *Peripneumoniæ*, & veræ & nothæ; crebri, atque fortes interdum, *Impetus apoplectici*.

Qui Capite magno sunt & breviorè Collo facti, multoque abundantes Sanguine, ex facili in *Apoplexiam* incidunt, quacunque de Causa nimium caleſcant Humores. — His Curæ fit ideò præcedente Vere, ac invalescente Calore, & Sanguinem mittere, & leni, & parco Victu, præcavere Morbum; maximè si Vertigo incidit, si Capitis Dolor, aut Tinnitus Aurium, aut falsi ac subiti Splendores; hæc, ni caveantur maturè, certa sunt sæpe sæpius subitanæ Mortis Prænuncia.

Nova Luna 5°. JULIO. Plena Luna 19°.

Magna jam Cœli facta est Mutatio, fuit enim hic Mensis & siccus & calidus valdè, flante plerumque ab Oriente, vel Septentrione, Vento, qui *Barometrum* crexit, ac discussit Vapores.

Dig. Dec.

Pluvia 11. 12. 14. 19. 20. 21. 23. 28. = 0. 590.

Fulgur & Tonitru 20. primo Mane, Dies valdè fervidi 4. 17.

8	Altitud. maxim. 3. 29. 8. E 1.	} media 29. 6 $\frac{5}{28}$
—	minim. 19. 29. 2. S VV 2.	
Dies frigid.	31. 33. N. 1.	} media 24 $\frac{4}{28}$
— fervid.	4. 17. Malacia.	

Graves Capitis Morbi adhuc passim, & Tusses plurimæ; *Colica* biliosa frequens; Sudores maximè profusi omnes ferè debilitant valdè. Perplures jam Mulieres largissima patiuntur Menstrua sum.

mo

1738)

de Morbis Epidemicis.

II

mo cum Virium Languore ; an fuso Sanguine ;
an rarefacto duntaxat ?

Nova Luna 4°. AUGUSTO. Plena Luna 18°.

Redit pluvia Tempestas, quæ porro pro An-
ni Tempore est admodum frigida, unde Messis
infelix : Corus subinde flavit, Libs sæpe, non-
nunquam Vultur, interdum Aquilo.

Pluvia $\frac{1}{3}$. 5. 7. $\frac{11}{8}$. $\frac{11}{9}$. $\frac{1}{10}$. 12. 14. 17. — $\frac{1}{22}$.
Dig. Dec.

$\frac{111}{23}$. $\frac{1}{24}$. 25. 27. 28. = 2. 210.

Grando 10. Levis Procella & Fulgura 7. Nocte
S b w 4^x.

8 Altitud. maxim. 29. 29. 9. N 1. } media 29. $6\frac{4}{30}$
— minim. 8. 29. 2. S V V b S 3. }
Dies frigid. 27. 39. N N E 1^x. } media 32. $\frac{6}{30}$
— calid. 9. 27. S V V b V V 2. }

Cholera, & Morbus colicus passim: Anginæ,
& Febres putridæ hand paucæ. *Variolæ* jam fre-
quentes à miseris *Saltzburgensibus*, Patria expul-
sis, huc advectæ.

Jure merito inter Morbos maximè contagio-
sos ponuntur *Variolæ*, adeò ut vel unus Puerulus
hisce correptus, fortè longè latèque sæpissimè
Luem dispergit: Atqui nisi etiam unà conspiret,
Contagium fovens, Aeris Constitutio, sæpe vel
intra unum, alterumve Domicilium, in ipsis
quasi Incunabulis, extinguitur Morbus. — Hoc
utique vel in ipsa Peste quandoque notatur,
quam Hyems frigida coercet *.

Nova

* *Hodges de Peste per Initia.*

Nova Luna 2°. SEPTEMBRI. Plena Luna 16°.

Pluvia ferè perpetua ad medium usque Septembrem, Africo subinde fremente, Vulturno interdum; à decimo octavo autem Ventus Orientem inter & Septentrionem perflabat.

Pluvia 1. $\frac{1}{3}$. $\frac{11}{5}$. $\frac{111}{6}$. $\frac{11}{7}$. $\frac{11}{8}$. $\frac{11}{9}$. $\frac{11}{10}$. $\frac{111}{11}$. $\frac{11}{14}$. $\frac{11}{16}$.
Dig. Dec.
 $\frac{11}{18}$. $\frac{11}{27}$. $\frac{11}{28}$. = 2. 912.

Procella 10. p. m. S w b w 4

Altitud. maxim. 30. 30. 6. E b N 1. } media 29. $6\frac{20}{29}$
minim. 10. 29. 3. }
Dies frigid. 29. 48. E N E 1. } media 39 $\frac{22}{29}$
— tepid. 1. 32. S V V 3x. }

Multæ *Kariola*, *Morbilli* & *Tormina* frequentia; *Febris Catarrhalis* Pueros infestat: Mensis verò fuit parum morbosus.

Nova Luna 2°. OCTOBRI. Plena Luna 16°.

Ineunte & exeunte Mense Ventus ab Oriente prævaluit, intermedio autem Tempore fuit varius admodum, sæpe turbidus Auster perfremuit, labente *Baroscopio*, & Pluvia ruente; à vicefimo tertio tamen nulla prorsus.

Pluvia 2. $\frac{11}{3}$. $\frac{1}{4}$. $\frac{111}{5}$. $\frac{11}{6}$. $\frac{11}{7}$. $\frac{11}{10}$. $\frac{11}{11}$. $\frac{11}{12}$. $\frac{11}{15}$. $\frac{1}{18}$.
Dig. Dec.
 $\frac{111}{20}$. 22. 23. = 3. 330.

Procella 13. w S w 4^r. — 20. p. m. necnon insequente Nocte S 4.

Maxima

1738) & Morbis Epidemicis.

13

Maxima Procella 23. Nocte S 4^x. Maximæ
Pruinæ 16. 17.

AB. 21. H. 10. N w b N 1.—24. H. 9. w
N w 1.—25. N N w 1.—27. H. 9. w b N 1.

8 Altitud. maxim. 16. 30. 4. E N E 1. } media 29. 4²⁴/₃
——— minim. 6. 28. 7. S V V b S 3^x. }
Dies frigid. 22. 55. N N V V 1. } media 45²/₃
— tepid. 5. 40. S V V b V V 2^x. }

Variolæ & Morbilli sparsim, Ophthalmiæ, Rheu-
matismi, & Morbi colici frequentes: Febres len-
tæ nervosæ passim.

Nova Luna 31^o. ultimo NOVEMBRI Plena Luna 15^o.
Nova Luna 30^o.

Parca admodum Pluvia ante Diem decimum
septimum decidit, dum vel Subsolanus spiravit,
vel Ventus borealis, surgente Barometro; post
irruit nimbosus Auster, multaque Pluvia; quod
Atmosphæram humidavit plurimum, quæ fuit
ante sicca satis & tenuis.

Pluvia 8. ¹¹¹17. 18. ²19. 20. ¹23. 24. ¹¹25. ²26. ¹29.
Dig. Dec.

¹30. Grando gravis 27. primo Mane = 1. 874.

Procella 19. à Diluculo ad seram Vesperam
S w 4.

——— 20. p. m. w S w 4^x. — vehemens 25.
p. m. S 4^x.

Maximus Halo circa Lunam 10. 11. prima
Nocte E S E 2.

8 Altitud. maxim. 9. 30. 3. E N E 1. } media 29. 7²³/₃₀
——— minim. 25. 28. 8. S 4^x. }
Dies frigid. 9. 66. rigidum Gelu. } media 53¹/₃
— tepid. 20. 47. S V V 3^x. }

Plen-

Pleuritides, Peripneumoniae, & Ophthalmiae frequentes, præcipue Mensis Initio: Multi *Rheumatismo* laborant, aliqui lenta Febre. Tusses, Anginæ, Coryzæ, Gravedines undique. *Variolæ* adhuc, *Morbilli epidemici*.

Plena Luna 15°. DECEMBRI. Nova Luna 29°.

Per Initia Mensis Aer tepidus & humidus, Libs ferè perpetuus & pluviosus; ab undecimo ad vicesimum quartum Boreas perflavit, qui & *Barometrum* ad Altitudinem enormem evexit, & frigidam fecit *Atmosphæram* & paulò sicciorem: Ventus erat postea varius, frigidus, & pluvius.

Pluvia $\frac{1}{1}$. 2. 3.—5. $\frac{1}{6}$. 7.—9. 12. $\frac{11}{20}$. $\frac{11}{25}$.
26.—30. $\frac{11}{31}$. Grando cum Fulgure & Tonitru
Dig. Dec.
7. Nix 21. Nocte. = 2. 404.

⌘ Altitud. maxim. 14. 30. 7. NNE 1. } media 29. $8\frac{23}{31}$
— minim. 3. 29. 1. S VV 2. }
Dies frigid. 24. 72. ENE. valdè rigidum Gelu. } media $57\frac{17}{31}$
— tepid. 2. 47. VV S VV 2. }

*Ophthalmiæ**, *Rheumatismi*, ac *Morbilli* plurimi adhuc, *Variolæ* passim: Multi Vertigine corripuntur. Anginæ, pleuriticæ & *peripneumoniæ* Febres valdè frequentes; haud paucae lentæ nervosæ; longè plures tamen acutæ ab acri & inflammante Viscido; quod, dum ad varias trans-

* Per frigidas & humidas Aeris Constitutiones diu durantes *Ophthalmias* esse per frequentes observavit *Frid. Hoffman*, Medic. ration. Tom. 4. Part. 1. Cap. de Inflam. Oculor.

1739) *De Morbis Epidemicis.* 15
 transfertur Partes, varios producit Morbos, *Pleur-*
ritidem puta, *Peripneumoniam*, *Anginam*, *Oph-*
thalmiam, &c. prout nempe in hac, vel illa Parte
 consistat obstruens Lentor. Nec mirum ideò
 quòd *Ophthalmiam* in *Anginam* interdum muta-
 tam videmus, *Anginam* in *Peripneumoniam*. — Τῶν
 ὀδυνέων ἢ ἐν πλευρίσι, ἢ ἐν σήθεσι, ἢ ἐν τοῖσιν ἄλλοι-
 σιν μέρεσιν ἢν μέγα διαφέρωσι, καταμαθιτέον.

Hippoc. Aphor. Sect. 6.

Tota Pluviæ Quantitas, quæ Ann. MDCCXXXIII.
 Dig. Dec.
 decidit, fuit = 24.004.

Plena Luna 13°. JANUARIO. *Nova Luna* 28°.

Per Anni Initia Pluviæ multum & procellæ,
 cadit hinc *Barometer*, paulò tamen post, elucen-
 te Sudo, resurgit, dum Corus intervenit; mox
 autem Libs nubilus; brevique iterum Corus;
 variante sic persæpe Vento variat quoque Cœli
 Facies: atqui per totum Mensem Aer fuit val-
 dè crassus & longè humidus, ac plerumque te-
 pidior solito.

Pluvia ^{II} 1. ^{III} 2. ^{III} 3. ^{III} 4. 5. ^{III} 6. 10. — 13. ^I 19. 20. 21.
^{II} 23. ^{II} 24. 25. 26. 28. 29. 31. Grando 1. 5. 25.
 Dig. Dec.

Nix. 2. = 3. 962.

Procella 3. Nocte & tota Die 4. w S w 4.
 — 6. Nocte w S w 4.
 — 24. S w 4. — 29. Nocte S S E 4. Ful-
 gur & Tonitru 4. 25.

☿ Altitud. maxim 11.30.3. VVN VV I. } media 29.7.
 ——— minim. 4.2.7. VVS VV 4.
 Dies frigid. 2. 65. N VV IX. } media 54 ¹⁶/₂₉
 — tepid. 31. 50. S VV 3^x. }

Morbilli Epidemici, Variolæ sparsim & Ruri & in Oppido: Plures acerbo admodum & pertinaci *Rheumatismo* laborant, multos vehemens & diu durans *Arthritis* excruciat. *Peripneumonia* & vera & spuria passim: Tussis *convulsiva* inter Pueros frequens; acerrimè quidem sæpe post *Morbillos* sævit, vix utique compescenda nisi Missione Sanguinis tollatur *Diatheſis phlogistica*, ac Colluvies acris lenibus expurgetur, miti nempe Vomitione, & blanda *Catharsi*, servata interim molli, diluente, accurata Diæta: pessimus sanè Nutricularum Mos est Carnem mox & Piscem post *Morbillos* Porrigere, hinc enim sæpiſſimè Febris *Peripneumonica* inſequitur.

Plures gravi Angina cum acuto Aurium Dolo-
 re capti sunt, cui non rarò *Parotis* accessit sæpe
 in interiore Aure, aut Faucibus Abscessus, imò
 nonnunquam *Phrenitis* & Strangulatio subita:
 Duos, tresve brevissimè abreptos novi, attonitos
 quasi & prorsus stupidos, quibus Vox primò mirè
 admodum stridula, mox omnino interclusa fuit:
 horum tamen unus faciliùs multò quam quis cre-
 deret oblata quæcunque deglutiebat. — Dirum
 hoc Symptoma quàm maxime semper timendum
 est, quòd Inflammationem Musculi *Arytenoidis*,
 & superiora Asperæ Arteriæ denotat; unde, oc-
 clusa penitus Rima *Glottidis*, Spiritus protinus
 eliditur: estque stridulus hic Clangor hujusce
 Inflammationis Signum *diagnosticum*. — In Mor-
 bo hoc pestifero opportuna *Bronchotomia* Ægrum
 inter-

interdum vindicat ab imminente Morte: Vana tamen est omninò, atque irritò celebratur Auso- dum Inflammatio Pulmònes etiam corripuit, uti funestum sæpe docuit Experimentum. Hujus Signa præcipua sunt Pectoris Oppressio, summa Anxietas, perpetua *Orthopnæa*, & suffocans quasi *Tussicula*. Ita tamen non pertimescenda est hæc Operatio, ut vix Vena faciliùs tundatur; modò idoneus sit Artifex. Quid quod memini, triginta abhinc Annis, Discipulum quendam Chirur- gum vesano Puellæ cujusdam Amore percitum, qui *Cartilaginem Thyroideam* ter, quaterve Scal- pello pertudit, adeò ut *Lucernam* extingueret illicò Flatus erumpens, dum officiosè consueret *Vulnuscule* Magister Chirurgus: quem monui, tandem advocatus, desisteret, potiùsque, Bra- chiis Juvenis *Lectulo* alligatis, prohiberet ne vio- lenta Manu Vitam impeteret rursùs: inde Em- plastro solùm adhærente, Vulnera probè conte- gente, ex facili sanatus est.

Si qua unquam & Cautela & Festinatione si- mul est Opus, in Angina quidem suffocante ne- cessarium est. Hoc tristi olim Exemplo persenssi in quodam Amico: erat hic sexagenarius ferè, agilis, rubicundus, & *Psychrolusia* gaudens ferè quotidie. — Mane, Die Saturni, frigidò usus est pro More Balneo, post Meridiem gravi Horrore correptus penè obriguit, paulòque post incaluit vehementer, mox accessit Ardor Faucium into- lerabilis, ac Dolor summus: Vesperi missus est Sanguis; media Nocte vocatus detrahi iterum *Æxvi*. jussi, Clysterem emollientem cum multo Sale marino injici, *Mannam*, *Cremorem Tartari*, *Nitrum* ex *Decocto laxante* exhiberi affatim, *Epi- spastica* largiora & acria Cervicibus admoveri.

* C

Mane,

Mane, die Solis, omnia pejora, adeò ut vel Liquidi, vel Solidi Deglutitio frèrè impossibilis, multò minus *Mannæ*, &c. satis ad Alvum solvendam. Hinc Humeris Cervicibusque affixis Cucurbitulis extractus est Sanguis ad 3x. Locisque scarificatis applicata Vesicantia, injectumque acrius *Enema*, sed ne sic quidem ullatenus levatum est Malum, imò jam Vox evasit stridula valdè, etiam & subinde intercisa prorsus; unde de *Bronchotomia* suggesti aliquid; id verò quasi esset Hominem jugulare non servare mussitabant adstantes: timidulus factus, junior tunc Medicus, destiti, ne Ægrotum occidisse viderer nisi servassem. Secta adeò rursus est Vena, ac repetitum *Enema*: Jam paulò facilior Deglutitio, multòque minùs Doloris, ast Vox argutissima,* subinde nulla; porrò *Dyspnœa* maxima, Anxietas summa, Pulsusque vacillans admodum, sæpe intermittens prorsus cum Sudore frigidulo. — Jam tandem mihi maximè pœnituit neglectæ *Bronchotomiæ*, satis superque percipiens Pulmones jam morbo esse obrutos penitus, facta *Metastasi* lethali. Dum deliberavi quid ultra faciendum erat, Vir bonus, inscius, Alvum egeffit,† mox Distentione nervorum correptus occidit; vix elapsis triginta & sex Horis à prima Morbi Insultura.

Est utique funesti plerumque Eventus dum augetur Spirandi Difficultas vanescente subito Angina, Fauciumque Tumore; idque notat ab

Hip-

* Οξύφωνή κλαυθμώδης, πονηρόν. Lib. 1. Prorrhet. Sect. 6.

† Οἱσι διὰ σφοδρότητα πνιγμοῦ, Κόπριον εξαπινῆς διαχωρεῖται θανάσιμον. Coac. Prænot. 7. Cap. de Angina ex Edit. Duret.

Hippocrate * *Celsus*, " Si Angina subito finita est, " in Pulmonem id Malum transit, idque sæpe " intra Diem septimum occidit. " — imò multò ante Diem septimum, si ruit Morbus ad Laryngem & Tracheæ Lacinias musculosas, primo scilicet, aut secundo, aut tertio Die; id ipsum quoque monente divino *Sene Lib. Prognostic.* necnon *Coac. Prænot. i. Sect. de Angina Edit. Dureti*: quinimò notante † *Aretæo* etiam eodem Die: nec mirum utiquè cum & præcludatur Spiritus, & Sanguinis per Pulmones Transitus. — Omni igitur Ope nitendum est ut ad extra Tumor vergat, admotis acribus Cataplasmatibus, imò acerrimo ad Collum antèrius applicato Vesicante; quod quidem, etsi haud usitatum, est tutum satis & valdè efficax Auxilium: Nec certè omninò spernendum est ‡ *Celsi* Consilium " incidere satis altis Plagis sub ipsis Maxillis, supra Collum, & in Palato circa Uvam, vel eas " Venas quæ sub Lingua sunt, ut per ea Vulnèra Morbus erumpat. " Atque hanc *Methodum* à *Cælio Aureliano* laudatam video, utcunque moliter plerumque *Methodici* tractabant Aegrotos. Venæ quidem sub Lingua in Angina sæpe secantur feliciter, ac si vehemens urget Morbus, Febrisque itidem, non satis Sanguinis fundunt: ideo à Brachio priùs debita Quantitas emitti debet, rectèque monet II. *Aretæus* ex largo Vulnere, & ad Animi ferè usque Deliquium, ut gravis Inflammatio nempe citiùs tollatur, ægrum aliter

C 2

brevi

* Lib. 2. Cap. 7. † Vide *Aret.* de Morb. acut. Lib. 1. Cap. 7. ubi accurata admodum habetur Anginæ Descriptio & Distinctio. ‡ Lib. 4. C. 4. II De Curatione Anginæ:

brevi suffocatura. Porro in graviore Casu suadet rem Cucurbitulas scarificatas Cervicibus apponendas atque summis Humeris (Occipitio, Palis, & Pectori etiam vult * *Calius Aurel.*) mox his ipsis Locis *Epispastica*. Nihil enim negligendum est in tanto Discrimine, ubi quàm brevissimo Tempore de Vita agitur, & ubi sæpissimè parùm valdè agendum est per Remedia Ore assumpta: Clysteres adeò laxantes, irritante quodam Sale adjecto, marino putà aut *Cathartico* communi, injiciendi sunt subinde — non quòd non Purgantia refrigerantia protinùs exhibenda sunt, si fieri potest, *Nitrosa* quoquè diluentia & *Emollientia* affatim, hausto interim Vapore tepido relaxante perpetim, Fauces etiam colluendo, ac fovendo, Liquore: Gargarisationes verò fortes & frequentes utiquè minimè laudo, quòd & Dolores augment & Inflammationem.

Est tamen quædam Anginæ Species ubi Gargarismata, imo & acriora, valent plurimùm, à Destillatione nempe falsa & pituitosa in Fauces & *Pharyngem*, quæ tument quidem plurimùm, at subalbidæ sunt & Mucò plurimo obductæ; atque Febris tantùm modica subest, Respiratio autem est satis difficilis & Deglutitio obstructa plurimùm. In tali equidem Casu non multa Sanguinis Missione Opus est, sed *Epispasticis* & *Catharticis*: Suadet etiam *Elaterium* *Aretæus*; habemus tamen mitiora multò, at efficacia satis. Sinapi interim ex Mulso & Aceto coctum & idoneum facit Gargarisma & perutilem Vaporem, quodque mirè elicit Colluviem. Attamen fugienda

* Lib. 3. C. 3.

gienda sunt omninò hæcce ubi magna subest Inflammatio, Ficus enim hîc & Nitri Decoctio ex Aqua & Lacte, melius multo est Gargarisma & tutius longè, etiam & haud inutilis Potio.

Sed hæc hæctenus de Angina; cujus quidem variæ cum sint Species* variam quoquè poscunt medendi Methodum. At ea sanè, quæ longis accedit Morbis, vel lentis Febribus, ubi nec Tumor est extrà, nec in Faucibus aliquid conspicuum, sed aridæ sunt quodammodò & pallidæ, Sanguinis Dispendium & Alvi Purgationem minimè fert, nedum indicat: *Cardiaca* contra idonea atque Victum instaurantem postulat, his enim solis si ullis, levatur Malum: Est tamen ut Plurimùm certus Exitii Nuncius.

Plena Luna 12°. FEBRUARIO. Nova Luna 26°.

Altam plerumque Stationem tenuit *Barometer* hoc Mense, etsi Libs sæpe furebat, Pluvia quoquè haud parca cadente; immensa tamen *Atmosphææ* Densitas Mercurium sustinuisse videtur; porrò Corus interfuit sæpe, Subsolanus interdum. Vix ullum Gelu hoc, aut elapso Mense: Aer crassissimus semper ac humidissimus.

	$\frac{11}{1}$		$\frac{1}{2}$		$\frac{1}{8}$		$\frac{11}{10}$				
Pluvia	1.	3.	5.	6.	— 8.	9.	10.	11.	13.	14.	
		$\frac{111}{1}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$							
17.	18.	19.	26.	27.	28.	— 2.	876.				

Dig. Déc.

Maximus Halo circa Lunam 5. H. 9. p. m.
Magna AB. 23. H. 7. p. m. E i.
C 3 8 Altitud.

* De his Vide *Celsum*, Lib. 4. C. 4. — Necnon *Arctæum* de Morb. acut. Lib. 1. C. 7.

8	Altitud. maxim.	23. 30. 3. E 1.	} media 29. $8\frac{7}{28}$
	minim.	19. 29. 4. S S VV 1.	
	Dies frigid.	6. 59. N VV b 1x.	} media 51. $\frac{18}{28}$
	— tepid.	27. 47. S VV b VV 3x.	

Ophthalmia, *Pleuritides* & *Peripneumonia* passim. Tumores Colli Fauciumque cum acerbissimo saepe Dentium Auriumque Dolore valde frequentes; Haud raro nascuntur in Meatu auriculari *Apostemata*, vel in Tonsillis, subinde *Parotides* diu dolentes, tandemque aliquando suppurantes.

Rheumatismus & *Arthritis* saevit maxime: *Variolae* plurimae.

Morbilli pustulosi, & maxime eminentes, admodum sunt *Epidemici*; at, nescio unde, magis funestos edunt Effectus quam vel merè maculosi; mox enim ab Initio vehemens invadit Tussis, & perpetua ferè Sternutamenta cum maxima ad Oculos Naresque Fluxione, protinus ardens accedit Febris cum Delirio plerumque, & per magna Praecordiorum Oppressione; quae fit etiam, Morbi Statu, multò violentior, adeò ut tunc Affectio saepissime evadat prorsus *Peripneumonica*. Hinc Stupor accedit, vel saevissimi Dolores Colici, saepe *Dysenteria*; Tussis autem usque ingravescit, unde haud raro expuitur Sanguis, rupto in Pulmone Vasculo, interdum etiam ex Naribus plurimus effunditur. — Sanguinis Missio *Colicam* aequè levat ac *Peripneumoniam*; pernecessaria est utiquè, sine qua quidem vix aliquid proficit, post autem *Cathartica* lenia Morbi Reliquias expurgant feliciter, modò parcus sit Victus & idoneus. Plures equidem Pueros hic Morbus opprimit, vehementi Pulmonum Inflammatione

tione, aut lenta Tabæ & importuna admodum Tussi consumptos. — Qui Artuum Lassitudinem* ac Dolorem graviter diuque plorabant, imminente Morbo, sævum admodum perpeffi sunt: quod in *Variolis* quoque sæpius notavi. An Humorū Acrimoniam indicat hoc *Symptoma*, an Globulos sanguineos in Vasculo, Sero Sanguinis duntaxat idoneo impactos?

Plena Luna 14°. *MARTIO*. *Nova Luna* 28°.

Et ineunte & exeunte Martio sublimis fuit *Barometer*, Ventus ab Oriente, aut Septentrione, per totum ferè Mensem, unde Sudum plerumque: atqui inter 14. & 25. subsidente Mercurio, Nix multa, Pluvia frequens & Grando, atque algida Tempestas: rigidum Gelu 18. 19. N. E. 1.

Pluvia 6. ^I14. 18. 21. 22. ^{III}23. 24. Nix 11. ^I15. ^I16. ^I18. 20. Grando 17. ^I22. = 1. 5 12. Dig. Dec.

Magna AB. 1. H. 10. p. m. N E 1. — magna variata AB. 15. H. 7. N. b w. 2^x. fuit tamen majore ex Parte Coloris Ferri igniti: hujus Radii lucidi vel à S. w & S E jaculati fuere: maxima rursus lucida versicolor AB. 50. H. 10. N. b w 1. Centrum Coronæ (ut dicitur) certissimè ad Plagam orientalem. Linæ meridionalis divergebat per Gradus ferè quindecim, totidemque saltem ab ipso *Zenith* ad Austrum declinabat.

8 Altitud. maxim. 30. 30 4. N b VV 1. } media 29. 7.
 ——— minim. 22. 29. 1. E S E 2. }
 C 4. Dies

* Ὁσυχόπος. Hippocrat.

Dies frigid. 16. 66. N b VV 2. }
 — tepid. 31. 46. N b VV 1. } media ss.

Morbilli adhuc *Epidemici*: *Variolæ*, *Ophthalmiæ*, *Pleuritides* & *Peripneumoniæ* plurimæ: non hîc tantum sæviunt omnes hi Morbi sed & undique *Tussiles convulsivæ*, vehementes, suffocantes, *Morbillos* sæpe & *Variolas* insequuntur, quæ magnam sanè edunt Stragem. — Cum 4^o. ab Eruptione *Morbillorum* Die probè desquamatur Cuticula, quasi Furfure crassiore aspersa, læta Spes effulget; at parva certè, ubi Pustulæ lividæ, aut luridæ fiunt. Tunc autem *Epispastica* haud parcè admovenda sunt, & Frictiones calidæ per totum Corpus mox adhibendæ; intereà Serum Lactis vinosum, tepidum, sorbillandum est affatim, paucis *Sp. C. C. Guttis*, si languet Pulsus, instillatis.

Coryzæ, *Raucedines*, *Faucium Collique Tumores*, apud omnes ferè; haud pauci etiam *Angina* corripuntur, quæ tamen est plerumque mucosa, nec multa Febre, nec magna Spirandi Difficultate stipata: *Parasynanchen* hanc Anginæ Speciem vocabant Veteres. Pendens autem à multa Colluvie serosa rectiùs *Epispasticis*, blandis Sudoribus, & Alvum purgantibus, discutitur, quàm larga & repetita Sanguinis Missione; utcunque sit prudens, in ipso Morbi Initio, Venam secare: Hîc etiam detergentia & paulò acriora Gargarismata proficiunt, quibus quoquè astringentis aliquid immiscetur utiliter. Sæpe equidem nimii sumus in *Emollientibus* ubi Fluxio serosa quasi Fauces inundat, quia plus Humoris ibidem invitant.

Longè

Longè tamen alia debet esse Ratio medendi ubi urget pestifera *Cynanche*, hìc enim plerumque Febris est acutissima, rubet tumetque Vultus, usque eò ut interdum etiam liveat, torvi sunt Oculi & inflammati, pulsant dolentque admodum Tempora; mox succedit Phrenitis, aut Stupor somnolentus, difficillimè trahitur Spiritus, imò vix respirare valent nisi prorsus erecti, protinùsque suffocantur nisi juvat cita, larga, & repetita Sanguinis Missio.

Plena Luna 12^o. *APRILI*. *Nova Luna* 26^o.

Aquilo perflavit sæpissimè hoc Mense, interveniente subinde Cauro, interdum Vulturno, unde valdè frigida Tempestas: Nix, Grando, Gelu, frequenter per Initia, sub Finem Pluvia, spirante Austro.

Pluvia 1. 2. $\frac{1}{7}$. $\frac{11}{11}$. 15. 21. 22. 24. 25. 26.
 $\frac{1}{27}$. $\frac{1}{28}$. $\frac{1}{29}$. Nix 3. 4. 8. $\frac{1}{9}$. Grando 8. 9.
 Dig. Dec.

10. Acre Gelu 5. NE 2 = 1. 698.

Magna ignea AB. 20. H. 9. ENE 3. Procella 8. NNW 4^r.

8 Altitud. maxim. 11. 29. 8. NE 2. } media 29. 4 $\frac{25}{30}$
 ——— minim. 24. 29. 1. SE 2. }
 Dies frigid. 5. 64. NE 2. } media 50.
 — tepid. 30. 44. S VV b S 2. }

Ophthalmia, *Pleuripneumonia*, *Anginae*, valde frequentes, multòque magis vehementes. *Vario- lae* grassantur plurimùm, at multò magis *Epidemi- mici*

mici sunt *Morbilli*, magisque etiam funesti. — Tussi gravissima infestantur Pueri; febricitant sæpe haud leviter, ægrèque admodum exantlantur tenax Pituita, unde haud pauci Distentione Nervorum corripuntur: Missione Sanguinis levantur & Usu *Oxymel. Scillit. Expressione Milleped.* &c. Tempestas est valdè funesta Tabidis. Longæ & difficiles *Apthæ*, ac Faucium Ulcera pertinacia haud rarò febricitantibus * accidunt: *Hæticis* & *Phthisicis* utiquè sunt certa, imò & cita, Mortis Prælagia.

Febres tertianæ aliquæ; Arthritis & Rheumatismi sævissimi.

Plena Luna 12º. MAIO. Nova Luna 26º.

Mensis Initio Ventus ab Austro non parcam demisit Pluviam: à 13º. Subsolanus sæpe, mox Vulturnus, tunc Aquilo, Corus interdum: 15º. Fulgur, Tonitru, Pluvia, Vento omni Modo, & omni Hora, variante: 16º. Aquilo velox, nulla Pluvia; Nocte tamen Vis immensa, etiam inter Horam Noctis undecimam & Meridiem 17ⁱ. Pluviæ Digitus integer decidit, minimè intereà subsidente Baroscopio. Perstitit Aquilo ad 19^m; inde Ventus inconstans micante subinde Fulgure: sub Finem Aquilo rursus, qui, contra quod solet, fuit hoc Mense plerumque Austro tepidior.

Pluvia

* Φάρυγγι ἐλασμεῖν, σὺν Πυρετῶ, δεινόν. Hippocr. Prognost.

Pluvia $\frac{1}{1}$ $\frac{11}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{11}{1}$ $\frac{11}{1}$ $\frac{11}{1}$ $\frac{11}{1}$
 1. 2. 3. 5. 7. 9. 10. 11. 15. 17. 18.
 " Dig. Dec.

19. 24. 30. = 3. 210.

Procella 2. Nocte S S E 4^r. Fulgur & Toni-
 tru 18.

8 Altitud. maxim. 25. 30. 0. N E 1. }
 ——— minim. 10. 29. 1. S S VV 3. } media 29. $5\frac{20}{29}$
 Dies frigid. 2. 47. S b E 3^x. }
 — tepid. 27. 28. E N E 1. } media 38. $7\frac{29}{29}$

Ophthalmia, *Anginæ*, *Pleuritides*, *Peripneumonia*, & veræ & spuria, frequentes: *Variolæ*, *Morbilli*, ac *Febres Miliare*s passim. *Tussis convulsiva* plurimos infestat Pueros, aliquos protinûs suffocat. Plures solito à *Pleuripneumonia* malè judicata fiunt *empyici**, rupto interdum in Latere Abscessu, haud rarò intra Pulmonem; qui faciliùs purulenta expuunt servantur, sin aliter brevi totus absumitur Pulmo, magna accedente Raucitate, & Gutturis Asperitate. — *Raucedo* frequenter utiquè Pulmonarios vexat, eaque pertinax admodum; quod sanè inter confirmatæ *Phthiseos* Signa rectè numeratur, nec profectò longè Mors abest si *Apthæ* accedunt, aut Gutturis Ulcera: pertimescenda est adeò in Morbis Pulmonum Raucitas, maximè si viridia sint Sputamina aut quasi cœnosa.

Plena

* De Signis Empyematis perlege Hippocr. Prognostic. & Libri, de Locis in Homine, Sect. 28.

Plena Luna 10°. JUNIO. Nova Luna 25°.

Infauſta, pluvia, frigida Tempeſtas toto ferè Junio, Ventus ab Occidente plerumque, ad Auſtrum ſubinde vergens, haud rarò etiam ad Septentrionem.

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|------------|----------|-----------|-----------|------------|-------------|-----|-----------|-----|-----------|
| | | | <u>1</u> | | <u>11</u> | <u>111</u> | <u>1111</u> | | <u>11</u> | | |
| Pluvia | 1. | 2. | 5. | 6. | 7. | 9. | 10. | 11. | 15. | 18. | — |
| | | <u>111</u> | | <u>11</u> | <u>11</u> | | | | | | Dig. Dec. |
| 20. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 30. | — | 4. | 218. | | |

Fulgur & Tonitru 5°. Noctu. Levis Procella 26. Mane S S w 4^x.

| | | | | | | | |
|---|-----------------|-----|-----|----|------|--------|---|
| 8 | Altitud. maxim. | 16. | 29. | 8. | NNVV | 1. | } media 29. 4 ¹⁸ / ₃₀ |
| | minim. | 10. | 29. | 0. | SSVV | 3. | |
| | Dies frigid. | 3. | 38. | | NbE | 1. | } media 32 ² / ₃ |
| | — tepid. | 29. | 27. | | VVN | VV. 1. | |

Variolæ & Morbilli adhuc frequentes: *Febres Miliare*s compositæ (ut dicuntur) haud raræ: Multos torquet *Rheumatismus*, & *Laterum Dolor*; nec paucos opprimit *Peripneumonia*, at plerumque notha. *Tussis* sævissima passim apud *Pueros*, quæ vix sedatur nisi post *Vomit*us frequentes, & repetitas *Rhabarbari Doses*; tunc verò *Decoct. Cortic. Peruviani* brevè fugatur.

Plena Luna 9°. JULIO. Nova Luna 24°.

Perdurat usque frigida, ac humida Tempeſtas, Aer plerumque crassus valdè & nebulosus, Pluviæ quidem plus sat̃is; unde *Fructus* ωραίοι crudi prorsùs & insuaves. Ventus ab Occidente prævaluit, ad Auſtrum sæpe flectens, sæpiùs tamen ad Septentrionem, interfuit *Boreas* interdum,

1739)

de Morbis Epidemicis.

29

dum, aliquando Malacia. — Raræ admodum Pa-
pilioes, rarissimæ Cicadæ.

Pluvia $\frac{1}{1}$. 3. — 5. 9. $\frac{11}{10}$. $\frac{11}{11}$. $\frac{11}{12}$. $\frac{11}{13}$. 14. 15.
 $\frac{11}{18}$. $\frac{11}{25}$. $\frac{11}{27}$. 28. 29. $\frac{1}{30}$. $\frac{11}{31}$. — 3. 172.
Dig. Dec.
Fulgur & Tonitru 12. a. m. Malacia.

Altitud. maxim. 20. 30. 1. N b VV 1x. } media 29. $6\frac{14}{29}$
— minim. 11. 29. 2. VV S VV 2x. }
Dies frigid. 13. 40. N N E 1. } media $31\frac{2}{29}$
— calid. 23. 24. Malacia. }

Variolæ epidemicæ, haud tamen valdè lethales;
Morbilli aliqui, *Tussis convulsiva* atrox adhuc;
Diu duravit Angina quædam *apthosa*, quæ omni-
bus penè Morbis acutis accedit, præcipuè pustulo-
sis; jamque etiam *peripneumonicos* vexat. — Mo-
lestum sanè, ac sæpe periculosum, est *Symptoma*,
ubi in Febribus Membrana Faucium inflamma-
tur, ac Pustulis obsidetur: Paucæ utiquè *Vario-
læ*, in ipso Faucium Isthmo, multò plus nocent
quam mille extrà.

Plena Luna 7°. AUGUSTO. Nova Luna 23°.

Prior Augusti Pars fuit læta satis, posterior
infelix admodum Pluvia ferè perpetua cadente,
quæ Segetes corrumpit maximè: *Atmosphæra*
porrò, quæ vigesimum usque fuit sicca satis, jam
facta est crassissima ac humidissima, Libs intereà
perflavit; Corus autem prævaluit Initio.

Pluvia 1. 2. 5. 6. $\frac{1}{12}$. $\frac{1}{21}$. $\frac{1}{22}$. $\frac{1}{23}$. $\frac{1}{24}$. 25.
 $\frac{11}{27}$. $\frac{1}{28}$. 29. 30. 31. — 2. 016.
Dig. Dec.

Fulgur

Futgur & Tonitru 23. Permagus igneus Halo circa Lunam 3. H. 10. p. m. w 1^x. Procella 21. Nocte S S w 4^x. — 24. Nocte S w 4^x. — 26. Nocte S w 4.

8 Altitud. maxim. 18. 30. 0. N. 1.

— — — minim. 29. 29. 2. S VV b VV 3. } media 29. 6²/₃₀

Dies frigid. 31. 42. 42. VV N VV 2^x. } media 31¹³/₃₀

— calid. 15. 20. N N VV 1^x.

Variola epidemica, *Tussis convulsiva* adhuc frequens, præsertim in *Cornubia* citeriore: *Anginæ*, & *Peripneumoniæ* nothæ passim, multis *Pustulis*, rubris & aquosis, *Statu Morbi*, erumpentibus, iisque plerumque salutiferis. *Rheumatismus* vexat Plurimos, qui multò nunc fæliciùs *Catharsi* cedit quàm *Venæ Sectioni*.

Magnus Languor omnes opprimit; imò vel *Aviculæ* contristantur, silet ipsa *Cicada*.

Plena Luna 6°. *SEPTEMBRI*. *Nova Luna* 21°.

Pluviosus porrò ac frigidus sequitur September; Libs furibundus sæpe ineunte Mense, post xvi. Vultur nus plerumque, intercurrente nonnunquam *Malacia* — Nimio *Squalore* obruta tabescunt plurima *Frumenta*.

| | | | | | | | |
|--------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|------------------------|
| | <u>iii</u> | <u>i</u> | <u>ii</u> | <u>ii</u> | | <u>i</u> | |
| Pluvia | 1. | 3. | 5. | 6. | 7. | 8, — 10. | 11. 12. 13. |
| | <u>i</u> | <u>iii</u> | <u>iii</u> | | <u>i</u> | | Dig. Dec. |
| | 17. | 19. | 20. | 21. | 22. | 26. | 27. 28. 30. = 3. 4; 2. |

Levis Procella 3. Noctu S w. 4^x. — gravis 10. Nocte S w 4^x. — 11. a. m. w S w 4.

Fulgura & Tonitrua 7. Nocte — Fulgura perpetua sine Tonitru 10. Vesperis — 21. Vesperis — perpetua sine Tonitru quoquè 23. ab Hora 6. p. m. ad

1739)

& Morbis Epidemicis.

31

m. ad mediam Noctem & ultra. AB. 12. & 13.
 Hora 8. p. m. N w b N i.

Altitud. maxim. 14. 29. 8. N N E i. }
 ——— minim. 11. 29. 0. VV S VV 4. } media 29. $5\frac{3}{30}$
 Dies frigid. 14. 48.
 — fervid. 22. 32. S S E i. } media 38 $\frac{2}{3}$

Variolæ usque vagantur, hic autem benignæ satis sunt, aliis tamen in Locis haud rarò lethales. *Tusses convulsivæ* etiamnum frequentes: *Febres lentæ nervosæ* atque *miliares* passim, aliquæ etiam putridæ, aliquæ intermittentes.

Icterus & *Hydrops*, jam sæpe quidem unitis Viribus, plures opprimunt.

Tusses plurimæ, *Fauciumque Tumores*, *Colli Paretidum*, *Maxillarumque*, levi sæpe cum *Angina*, ubique permolesti sunt.

Plena Luna 5°. OCTOBRI. Nova Luna 21°.

Ab ultimo Septembris Diem ad usque vicesimum secundum Octobris Boreas perflavit assidue, unde sublimior *Barometri* Statio, & sicca Tempestas; porrò inter xiv. & xxiii. frigida valdè: sub Finem Mensis infremuit pluvius *Vultur-nus*. Gelu rigidum 18.

Pluvia $\frac{1}{2}$ 2. $\frac{1}{2}$ 13. $\frac{11}{2}$ 24. $\frac{1}{2}$ 25. $\frac{1}{2}$ 26. $\frac{11}{2}$ 27. 28 — 31.
 Dig. Dec.

Grando 28. = i. 5 16.

Procella 29. — 30. S E b S. 4. AB. 19. H. 8. p. m. E N E i.

Altitud. maxim. 8. 30. 3. E N E ix. }
 ——— minim. 31. 29. 1. S E 3x. } media 29. $7\frac{29}{31}$

Dies

Dies frigid. 18. 65. E N E 2. } media 52 $\frac{15}{31}$
 — repid. 1. 44. N N E 1.

Ubique ferè dominantur *Variolæ*, plerumque tamen sunt benigniores. Febres aliquæ putridæ, intermittentes aliquæ, ceu potiùs remittentes, quæ faciliter *Eccoproticis* lenibus abiguntur, epoto subinde *Haustu salino* cum *Corticis Peruviani* tantillo — *Ophthalmiæ*, *Anginæ*, *Coryzæ*, *Tusses* humidæ, creberrimæ; *Pleuritis*, ac *Peripneumonia*, & vera & notha, frequens.

Spuria *Pleuritis* plerumque nihil aliud est quàm *Affectio Musculorum externorum Pectoris*, quæ *Rheumatismi* utiquè Species est; at ubi ipsum *Costarum Periostræum* inflammatur, Dolor sæpe vehemens urget, & pertinax admodùm, unde *Respiratio* haud rarò impeditur maximè* — atqui jam ex facili discutitur, molli existente *Pulsu*, *Fomentis* idoneis, & leni *Catharsi*.

Plena Luna 4°. NOVEMBRI. *Nova Luna* 19°.

Ipso *Mensis* Initio gravis decidit *Pluvia*, *Austro* fremente; à vi. ad x. *Aquilo* frigidissimus prævaluit, mox *Vulturnus*. Diem ad usque xvii. durans; frigidus hic quoquè, ac sæpe nimbosus & pluvius. xxi. *Vesper*i gravis irruit *Procella*, *Libanoto* furente vehementer, dum per plurima corrui *Pluvia*; duravit hæc per integrum ferè *Triduum*, quo maxima fuit, imò & insolita, *Baroscopii* *Depressio*, *Æstus* autem *Maris* immensus †: ad *Finem* verò *Caurus Mercurium* erexit.

Pluvia

* Vid. *Essay on Fevers*, Cap. de *Pleuritide*. † De his Vid. Vol. I. p. 18.

Pluvia. ^{III} 1. ^I 3. ^I 4. 5. 7. 8. ^I 11. 12. ^I 13. 14. ^I 15.
^I 17. 19. 20. ^{III} 21. ^{III} 22. ^{II} 23. ^I 24. ^I 25. ^I 26. ^I 27. 28.
^{II} Dig. Dec.

29. Grando 23. & 29. = 4. 574.

Levis Procella 12. Nocte S E b S 4^x. Procella 21. Vesperis S S w 4. — tota Die 22. S w b w 4^x. — 23. Mane S w 4. Fulgur & Tonitru 21. Nocte — 23. Nocte.

8. Altitud. maxim. 14. 30. 1. S E b E 3. } media 29. $4\frac{12}{28}$
 ——— minim. 23. 28. 2. }
 Dies frigid. 10. 70. N N E 1. Gelu. valdè rig. } media 58 $\frac{10}{56}$
 — tepid. 1. 48. S 3. }

Pleuritides & Peripneumonia, & veræ & spuræ, haud infrequentes, nec Febres nervosæ, ac miliares; præcipuè in Cornubia: Crebra Tussis convulsiva inter Pueros. Anginæ & Tumores Faucium, Parotidum, ac Maxillarum undique, qui sæpe suppurantur & intùs & extrà.

Variolæ epidemicæ hic, & ubique, jamque multò peioris sunt Notæ, sæpe cum lividis & nigris Petechiis, sæpe sessiles sunt prorsùs & subnigræ, sæpe vacuæ omninò, sæpius acri admodùm ac erudo Ichore turgidulæ: Plures sanè jugulant: Qui evadunt plurimis molestissimis Furunculis & Ulcusculis frequenter admodùm infestantur. Haud rarò immensa sit, ipsis primis Morbi Diebus, Salivatio, tenuis quidem ea & acris maximè, unde Fauces & totum Os mox exulcerantur. Semper mihi suspectus est utiquè præmaturus hic & crudus Fluxus*, Tædii quippe plurimum Ægrotis ac Doloris facit, arcetque protinùs Som-

* D num;

* Vid. Essay on Fevers C. de Variolis, p. 145.

hum; unde nec faustè replentur Pustulæ, nec maturantur bene. Porro magnam hoc Sanguinis indicat Acrimoniam; quod quoquè valdè frequens Sternutamentum denotat, & enormis Narium ac Oculorum Fluxio: unde hæc rectè inter mala Signa ponuntur—Nihil huic Malo succurrit magis, imò & sæpe occurrit, quàm tempestiva, summos inter Humeros & pone Aures, *Epispasticatorum* Applicatio, quibus acris evocetur Humor.

Plena Luna 4°. DECEMBRI. Nova Luna 19°.

Tempestas hoc Mense fuit planè mirabilis; ad Initium Boreas, rigidum Gelu, mox pluvius & turbidus Auster, paulò pòst Libs furens, multaque Pluvia, surgente tamen Baroscopio: xiv. ac xv. Corus, xvi. Boreas Geluque recurrunt: xix. & xx. Vulturinus velox; Libs iterum nimbosus xxi. inde Eurus ad xxviii. intercurrente tamen Borea perfrigido xxv. & xxvii. Hinc sævissima Procella ab Oriente ad Finem usque cum rigidissimo Gelu & Nive perpetua minutissima; brevi omnia penetrabile Frigus adurit intùs atque foras, vel generosissima Vina congelans; quicquid Aeri expositum est dicto citiùs congelat—ad Ignes luculentos rigentes, etiam in Lectulis algidi, adeò ob Frigus horrendum torpemus ut vix ferè simus vitales.

Vehementissima Tempestas ad Finem Decembris perplurimas Aves & Aviculas abs Terra abripuit, illasque ad immensam à Littore Distantiam abegit; quæ defessæ prorsùs perlongo Volatu ad Naves se contulere medio in Oceano, & à Nautis erant facillimè captæ: Mirum utiquè Genus Aucupii! —Ipse vidi, Januarii sequentis Initio, fortè tunc visitans nobilissimum *Comitem Delo-*

que Mensis perdurans — Quamvis enim omnia Solis Ardore liquantur interdiu, constringuntur Noctu rigidissimo Gelu. *Atmosfera* fuit plerumque crassa valdè & veluti offuscata Fumo, inter x. verò & xvii. tenuissima. Dies frigidissimi erant 11. 15. 16. 17. 18. 26. 27. 28. adeò sævum regnabat Frigus ut Vina omnigena, foras exposita, mox congelarentur; imò ac vel ipsum ad Littora Mare, quod utique hic accidit rarissimè. Plantæ & Arbores innumeræ pereunt, vel & ipsæ duræ Genistæ, vix vides viridem Herbam. Innumerabiles huc advolant Aves aquaticæ, per plurimæ etiam ab exteris Regionibus, vix unquam hîc visæ.

Dig. Dec.

Pluvia ¹¹ 1. 2. 9. Nix & Grando 8. 9. = 0. 416.

Nullum vidi Lumen boreale toto hoc Mense, etsi Ventus ferè perpetuus è Septentrione spiravit.

| | | | |
|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|
| 8 | Altitud. maxim. | 14. 30. 4. E N E 2. | } media 30. $1\frac{14}{31}$ |
| — | minim. | 1. 29. 1. S V V 2. | |
| Dies frigidissimus | 26. 84. | N N E 1. | } media 75 $\frac{18}{31}$ |
| — tepidus | 31. 69. | S E b E 3x. | |

Variolæ adhuc *epidemicæ* sæpe parvæ sunt admodum, sessiles & subnigræ, sæpe lethales; Ægroti, his correpti, parum tument, perpaululum expuunt, unde non rarò 8. aut 9. Diè suffocantur. Perpetuum est ferè, quod per fccas ac frigidas Aeris Constitutiones, diu durantes, *Variolosi* paricissimè expuunt * ; unde tali prævalente Tempestate suaderem Gargarisationem emollientem ac frequentem, Potus tepidos, relaxantes, continuos, Vaporem aquæ tepidæ, aut Lactis dulcis, Ore

* Vide *Essay on Fevers*, p. 145.

Ore haustum, ut per hæc, laxatis Fibris, attenuato Sanguine, reſeratis Salivæ Ductibus atque absterſis, eliciatur *Salivatio* libera, quæ in hoc Morbo maximi ſemper eſt Momenti.

Tumores Faucium, *Parotidum*, Tonsillarum, &c. apud omnes ferè, qui & Tuſſi quoquè vexantur & acri Deſtillatione. Anginæ, *Odontalgia*, *Pleuritides*, *Peripneumonia*, ſunt undique frequentes. Perniones innumeris moleſti ſunt, ſæpe etiam in Adultis ulcerant.

Febres lentæ, *nervosæ* aliquæ, aliquæ *miliares*; *Aſthma* grave admodum ſævit plurimum, haud paucos Senes jugulat.

Plurimi in Vicinia, & hîc quoquè, Tumore Faucium, Colli atque Capitis corripuntur, mox Inguinis & Teſticulorum Dolore acuto, ac Tumore: hunc Morbum tamen Sanguinis Miſſio, & lenis Alvi Purgatio, ex facili diſcutit—Sanguis ſubflavo Glutine, haud autem valdè tenaci, obducitur.

Plena Luna 10. FEBRUARIO. Nova Luna 16.

Siccus quoquè & frigidus valdè fuit hic Menſis, utcunque enim per Initia Vulturſus Brumam aſperrimam temperavit aliquantulum, reddiit tamen mox Aquilo cum duriffimo Gelu: Ad Finem verò Ventus auſtralis ſpirabat, qui pluviâ fecit *Atmoſphæram* ac multò tepidiorem: *Barometer* altam tenuit Stationem toto Menſe: Aer fuit interdum pertenuis, plerumque tamen craſſus valdè & fumofus, intercurrente ſubinde Malacia: Maximæ ſæpe ſæpiùs Pruinæ; medio nempe Die a Solis Fervore relaxata Terra plurimos exhalavit Vapores, quos Frigus nocturnum

num. mox condensavit, imò & gelavit Forma
Pruinæ — Mare ad Littora sæpiùs congelatum
fuit hoc Mense.

Pluvia 16. 19. $\frac{1}{26}$. $\frac{2}{27}$. 28. 29. Nix ali-
qua 12. = 0. 482.
Dig. Dec.
AB. 11. H. 8. p. m. N. 1^x. Enorme Frigus
14. Thermom. 84.

8 Altitud. maxim 23. 30. 5. E N E 1. } media 30. $1\frac{2}{29}$
— minim. 28. 29. 8. S V V 2. }
Dies frigidissima 14. 84. E N E 2^x. } media 68 $\frac{11}{29}$
— tepid. 29. 56. S S E 2. }

Pleuritis, *Peripneumonia*, *Angina*, *Rheumatif-
mus*, maximè frequens undique; missus ex his
laborantibus Sanguis crassus est valdè & glutino-
sus, parùm habet Seri sublutei. Perplurimi *Tus-
si*, *Catarrho* *sthmate* sævo premuntur: Multi
Xerophthalmia laborant. Innumeri, etiamque Se-
niores, Pernionibus dolentibus, aliquando exul-
ceratis, cruciantur. Febris quædam *Catarrha-
lis* cum acuto Capitis Doloze & Vertigine, ac-
cedente etiam aliquando *Phrenitide*, multos deti-
net — *Phthisici* & *Asthmatici* jam pessimè se ha-
bent — *Variolæ* adhuc passim.

Scabies fœda jam regnat undique inter Po-
pulum.

Plena Luna 2°. MARTIO. Nova Luna 16°.

Perstat usque alta *Mercurii* Statio, Aer cras-
sus valdè & frigidus plerumque, Malacia fre-
quens, præsertim Mensis Initio. Primo Die,
flante Vulturno, multa decidit Pluvia, post au-
tem

tem Ventus inter N w & N E constitit: Gelu-
sæpe hoc Mense & maxima Pruina.

Pluvia $\frac{111}{1}$. 3. $\frac{1}{5}$. 7. 11. $\frac{1}{14}$. 18. 23. 26. 27.

Dig. Dec.

Grando 12. = 1. 278.

Circius vehemens 8. Mane. Magna AB. 12.
H. 9. N N E 2. levis AB. Vesperi 13. N N w 1.
— 14. H. 9. N w 2. Perfrequenter sanè notavi
AB. per duas, tresve Noctes consequentes Vento
à Plagis Septentrionalibus spirante.

Altitud. maxim. 30. 30. 3. N 1x. } media 30. $0\frac{2}{31}$
—— minim. 1. 29. 7. S E b E 1x. }
Dies frigid. 13. 67. N N E 1. }
— tepid. 18. 51. N VV b N 1. } media 55 $\frac{18}{31}$

Anginæ frequentes & Faucium Tumores &
Rheumatismi multi, & gravis sæpe Arthritis: Va-
riolæ adhuc. Asthma sævissimum, diuque admo-
dum durans, permultos premit; plures Rhthisi-
ci moriuntur. Pleuritides & Peripneumoniæ plu-
rimæ, perrarò autem Sanguinolenta expuuntur,
ne liberè quidem & copiose aliquid, unde haud
parùm in Morbo Discriminis.

Sanguis, ex omnibus Pleuriticis & Rheumati-
cis missus, est densus valdè & tenax, & non
Sero satis imbutus.

Nescio unde, sed per plures Menses, Junio-
res, atque etiam haud pauci Adulti, Lumbricis
teretibus infestantur, qui per Morbos sæpissimè
dejiciuntur — An à corrupto Frumento*, nec-
non immaturis & crudis Fructibus, Progenies
hæc verminosa?

D 4.

Plena

* Vid. Mens. August. Anni 1739.

Plena Luna 1^o. APRILI. Nova Luna 15^o.

Siccus fuit hic Mensis & frigidus maximè, stetit plerumque Ventus Orientem inter & Septentrionem, Malacia interdum interveniente; Pruina sæpissimè, & nonnunquam Gelu, ad xv. Nix sæpe, & Grando pòst; permansit Nix super Montes ad xxvi. usque.

Pluvia 8. $\frac{1}{12}$. $\frac{11}{13}$. 14. 25. 26. 29. Nix 20.
Dig. Dec.
21. 22. Grando 26. 27. = 0. 802.
Levis Procella 23. p. m. N N w 4^r.

8 Altitud. maxim. 17. 30. 2. Malacia } média 29. $8\frac{2}{17}$
minim. 12. 29. 3. E 2.
Dies frigid. 14. 62. E N E 2x. }
= tepid. 19. 45. N N VV 2x. } média 51 $\frac{3}{27}$

Perdurante adhuc eadem Aeris Constitutione, iidem prorsùs sæviunt Morbi; jamque multò sunt severiores; pereunt permulti Ruri & in Opido.

Morbis acutis jam sæpe accedunt *Petechiæ*, etiam ipsis *Peripneumonicis*, hoc tamen accidit præcipuè inter Nautas: Horum verò Sanguis parùm glutinosus est, sed magis putridus; ac lividus quasi, ejusque Serum aut viride est, aut turbidum maximè ac veluti Luto foedatum; purus lenta quoquè protinùs expuunt & persæpe foetida: à *Scorbuto* * forsan hæc, qui longè longèque, his in Oris saltem, dominatur.

Vario-

* Vid. *Essay on Fevers*, p. 211.

Variolæ passim, & *Pleuritis* quædam acerbissima, quæ haud paucos jugulat More *paraphrenitico*, quarto vix elapso Die: horum Sanguis extractus merum ferè Gluten refert.

Plena Luna 30. ult.

Nova 14°.

MaiO. *Plena Luna* 30°.

Permanet usque sicca atque frigida *Tempestas*, *Ventus* ferè perpetuus ab Oriente, flectens plerumque ad *Septentrionem*, ad *Austrum* etiam aliquando, sæpe velox, mox tamen omnino silens, maximè sub *Noctem*, insolitum & planè stupendum fuit *Frigus* pro *Anni Tempore* Die v. vi. & vii. *Mensis*; imò haud parùm *Nivis* decidit quinto.—*Atmosphæra* fuit perquàm crassa, etsi tam *Pluviæ* parùm decidit.

Pluvia 4. 5. 12. 14.—17. 20. 23. 26. *Nix*

Dig. Dec.

5. *Grando* 4. 5. 6.=0. 538.

Procella 25. a. m. E 4. AB. 27. *Vesperis* N
w b w i.

| | | | | | | | | |
|------|-----------------|-----|-----|----------|----|----|-----|------------------------------|
| 8 | Altitud. maxim. | 9. | 30. | 1. | N | E | 1. | } media 29. $7\frac{21}{30}$ |
| | minim. | 4. | 29. | 3. | NN | E | 2x. | |
| Dies | frigid. | 6. | 62. | N | b | VV | 2. | } media 42 $\frac{22}{30}$ |
| | tepid. | 30. | 32. | Malacia. | | | | |

Perfurunt usque *Febres pulmonariæ*, magisque multò jam sunt malignæ *Maculis* nigris, lividis, fuscis sæpe stipatæ; dolent vehementiùs *Caput* *Dorsumque*, *Præcordia* premuntur maximè; nunc quoquè semper ferè accedit *Phrenitis* effera, ac persæpe *Angina* quædam ulcerosa vel ab ipso *Initio*, totas *Fauces* sensim perreptans: Vel
cruda

cruda prorsus, vel saniosa expuunt: Cruda, lurida, turbida Urina, pessimè significans, Nihil unquam deponit. Faustè interdum, sub Morbi Finem, Pustulæ erumpunt & Furunculi—sæpe verò jugulat Ægros hic Morbus, dira Anxietate jactatos, perpauco intra Dies, More quasi *Paraphrenitidis*; imò etiam haud rarò *Hepatitis* correptos: nam & Situs Doloris & Color ictericus & intensa Urinæ Flavedo hoc indicare visa sunt.

Jamque etiam grassatur Febris putrida *petechialis*, quæ plurimos Nautas Orco dimittit atque inter Popellum multos. Hæ Febres sæpe complicatæ videntur & unitis Viribus sæviunt, pulmonaria nempe atque *petechialis*.

Variola nunc magis frequentes sunt, ut plurimum tamen mites, licèt parcè admodum expuitur: At discreti sunt plerumque Generis, quod mirum utiquè videtur, quandoquidem alii Morbi acuti Monstri jam quid maligni alunt.

Tussis vehemens inter Equos cum Angina suffocante & Febre plures obruit; imò & bubulum Pecus tali etiam effectū sæpe abripitur.— Grex lanigera summa Macie & arida Tussi maximè laborat; pereunt Oves innumeræ, quarum omnium Jecur tumet multum & indurescit, Vesicula Fellis autem, subatra Bile turgida, ad enormem crescit Magnitudinem.

Nova Luna 13°. JUNIO. Plena Luna 28°.

Major fortè nunquam observata fuit Siccitas, Fontes arescunt prorsus, & Flumina desiccantur; *Pabula canescunt, cum Frondibus uritur Arbor*; Ov. Quamvis *Hygroscopia* omnigena siccissimam Aeris

Tem-

Temperiem denotant, tota *Atmosphæra* tamen crassa valdè & fumosa quasi apparet — unde utiquè nescio, ni deficit forsan sufficiens in *Atmosphæram* Humor ad regularem Luminis Transmissionem — Sic Corpora quædam videmus, quæ, humectata, pellucida sunt, arida verò opaca prorsùs. — Subsolanus à i. ad v. à xix. iterum ad xxv. cæterùm Corus plerumque, hæud rarò etiam Libs.

Pluvia $\frac{11}{5}$. $\frac{1}{7}$. 8. 10. 11. 13. 24. Grando
Dig. Dec.

multa 7. p. m. = 0. 742.

8 Altitud. maxim. 18. 30. 2. Malacia
— — minim. 7. 29. 3. S VV b VV 3. } media 29. $7\frac{24}{23}$
Dies frigid. 12. 41. S VV b VV 2. }
— calid. 25. 25. S E b E 1. } media $33\frac{3}{28}$

Durat adhuc Febris *pneumonica*, quam sæpissimè comitantur *Petechiæ* — Sanguis in hoc Morbo detractus lividus valdè imò & ater conspicitur, ac plerumque nimium solutus*, hæud rarò sane prorsùs saniosus.

Variolæ frequentiores, sed ut plurimum benignæ Indolis. — Febricula quædam cum Pustulis rubellis & valdè urentibus, quæ per ipsa Morbi Initia erumpunt, perfrequens; levis tamen videtur & evanescit citò magna Cuticulæ Asperitate relicta.

Febris

* In Febre *peticulari* epidemica, quam accuratissimè descripsit *Ramazzini*, Sanguinem semper roseum, purpureum, solutum, invenit, minimè verò glutinosum. vid. *Ramazzini* Constitut. Epidem. Ann. 1692. &c. Sect. 27. 47.

Febris nautica pestilentialis jam sævit maximè; en hujus Historiam.

Ineunte Vere ad hunc Portum appulsæ sunt Naves duæ bellicæ (*Panther & Canterbury*, quarum posterior mox à Mari *Mediterraneo*) ex his Ægroti plusquam ducenti ad Terram protinùs delati sunt; horumque Pars major Febre maligna, imò pestilente laboravit; hinc in Vulgum quoquè sparsa maximam edidit Stragem.—Nec vana forsàn fuit Suspicio has quidem Naves Pestilentia quadam per *Africas* Oras tunc longè latèque grassante, attractas fuisse, quoniam has inter & illas frequens fuerat *Commercium*.

Levis Rigor primò corripuit Ægros, mox subito Ardor incerto prorsùs Ordine; Pulsus interea fuit admodùm inconstans, nunc incitatus valdè, nunc mirè depressus; accessit proinde Gravido Capitis, aut Dolor acutus, sæpe Occipitis, sæpe Sincipitis, sæpiùs autem in Temporibus, aut paulò supra Oculos, qui quidem longè vehementior—perdolebant etiam ipsi Oculorum Globi Luminæque refugiebant: Sopor interim perpetuus urgebat, at parcus admodùm aderat reverà Somnus, Tinnitu Aurium semper molestante aut Vertigine gravi. Foedus valdè & amarus in Ore Sapor Vomitiones excitabat frequentes & biliosas admodùm; multa tamen permixta Pituita. Lingua ferè subflava erat, aut fusca & sordida, rarò autem valdè arida, medio autem scabra. Jam extemplò plurimùm debilitati discumbunt, anxii tamen & quasi perterrefacti, errantibus per omnia Membra huc illuc Doloribus. Urinæ tenues, crudæ, aquosæ, aut luridæ, sæpe tamen rutilæ, ceu tantillum inesset Sanguinis intimè permixtum, aut fortissimum aliquod Lixivium referentes;

par-

parcæ hæ & tenues semper; & Nihil prorsus deponebant:—Mali admodum Omnis nunquam non omnes has notavi Urinas.

Hæc quidem inter Morbi Initia, exactis autem tribus, quatorve Diebus in pejus multò ruebant omnia; jam enim vehementius ardet Febris, mox Phrenitis accedit, aut *Coma* Vigil, cum torvo Aspectu & fulvo oculorum Rubore; Jactatio perpetua, Anxiety summa, vix vel ipsis astantibus tolerabilis; sæpe Furor immanis, levis sæpe Desipientia aliena subinde murmurans.

Petechiæ violacæ, lividæ, fuscæ, imò & ipsæ nigræ, sextum inter Diem & undecimum sæpiissime prodibant, nunc citius, nunc tardius; quò magis floridæ eò melius; fuscæ tamen quasi *Cutis Lenticulæ*, parvæ, innumeræ, malè semper significabant, at pessimè omnium *Vibices*, & *Ungues* atque summi *Digitus lividi** aut plumbei—Funestum utique semper est hoc ultimum in Morbis acutis, indicat enim stagnantem in extremis Arteriis Sanguinem—bonum verò omnino ubi vividus adest Unguibus Color:—Medici est igitur hos etiam diligenter inspicere.

Adfuit vel ab Initio permagna Præcordiorum Oppressio, quæ aucta quotidie cum stringente quodam (hoc enim semper plorabant) Cordis Angore, & Respiratione tremula & singultiente quasi (imò sæpe diro cum Singultu ac Languore summo, haud rarò ad Deliquium usque) maximum portendebat Discrimen; cum & jam quoque Tremores, Subsultus Tendinum, Capitis Vacillatio, incerti Rigores, frigidique Sudores ingruerent

* *Essay on Fevers*. p. 98.

erent— Pedes erant sæpe frigidissimi, dum Facies, Genæ præsertim, magno flagrabat Ardore, profusus interea & valdè fœtidus Sudor manabat Talos ad usque; Pulsus interim exilissimus erat, at quàm citissimus: jam jamque instabat Mors.

Frequenter autem *Diarrhœa* fœdissima Miseros colliquabat, arida prorsus facta ac dura Cute, Corii ad instar, dum Lingua, quasi fuerat indurata Fumo, rigebat, impos ferè Motus, nedum Loquelæ. Haud rarò etiam in summo Morbi Statu *Apthæ* subnigræ, ulcerosæ, totas Fauces cruciabant Gulamque, quas paulò pòst perpetuus insequeretur Singultus; Saniosa inde, aut *gangrænosa*, *Dysenteria* Ægrotos brevì conficiens—Levis attamen obrepens Alvi Fluxus circa undecimam, ceu Arte, Sponte eveniens, Saluti fuit plurimis, modò nec lividus, nec liquidus nimium.

Jam nunc quoque (Morbi nempe Statu) interdum maximum attulit Levamen larga Pustularum Eruptio, More veluti Variolarum, quæ tamen nil nisi tenuem & acrem *Ichorem* continebant * — erumpebant etiam aliquando multò minores, at urentes admodum, quæ verò in Squamas mox abirent: salutiferæ quoque & hæ. In quibusdam peralbas quasdam & latas Maculas notavi, paulò eminentes, quasi ex Urticæ Morfu; hæ verò difficilis Indicium.

Erant verò Ægrotantes plurimi ubi Nihil horum planè, sed aut *Parotides*, aut Tubercula, aut in Auribus *Apostemata*, eos sublevabant: omnibus erat ferè magna Surditas, diu durans.

Mul-

* Φλύκταιναι veterum Medicorum.

Multis fuit Narium Hemorrhagia salutaris, at pessimum ubi paucæ, acres, subcruentæ Guttulæ destillabant; nec utiquè juvabat semper copiosa; nam haud rarò longè nimium profundeabant Nares, imò ad *Syncope* usque, præsertim sub Julii Finem, cum esset sæpe prodiga valdè: tunc etiam *Dysenteria* cruenta sæpiùs accederet. — Vix ullam memini Febrem in qua *Scotomia* & falsi Oculorum Splendores erant tam frequentes.

Nihil utiquè novi æquè certum Victricis Naturæ Signum ac liberum valdè & copiosum Sputum, benigno prodeunte Sudore, aut fluente affatim fulva & crassa Urina: perrarò autem Sedi-menti aliquid deposuit Lotium per totum Morbi Decursum; imò, cum interdum crassum fuisset admodum per Horas aliquot, mox tenuè prorsus reddebatur. Signum hoc semper est malè judicatæ Febris: atque adeò hæc vel ex levissima Causa fuit recidiva. — Si quis carnem comederet vel Piscem, nisi probè purgatus & confirmatus benè, certò certius hoc passus est magno herclè cum Vitæ Periculo; nec minùs sanè subiret Discrimen sæpe ab acriore *Cathartico*.

Mihi equidem haud levis Noxa Popello accidisse visa est à nimia Comestura Piscium, qui abundantissimè hac Tempestate undique scatebant, præcipuè Scombri; quippe qui lentos generant ac rancidos Humores. Sudor vel sanissimi Hominis, qui multo utitur Pisce, longè magis foetidus est quam si Carne solùm & Pane vesceretur — quinimò jam diu notum est, quòd nimius Piscatus *Scorbutum* infert & Morbos cutaneos

Hæc adeò de Febris Natura, jam quoquè de Curatione pauca.

In Morbis equidem curandis Regulæ quædam generales servandæ sunt, cum eo tamen, ut propria quoquæ cujusque Ægrotantis Natura perspicienda sit : idè ex *Hippocrate Celsus* * dixit “ Mederi oportere & communia & propria intuitentem. “ Nec in ulla Re magis hoc necessarium est quàm in Sanguine mittendo, ubi & Vires & Ætas & Habitus diligenter sunt consideranda.

Ipsò harum Februm Initio rectissimè mittitur Sanguis, plùs, minùsve, pro Ratione *Symptomatum* nempe † : Si Pulsus sit validus, si Febris vehemens, si Dolor acutus, repeti id debet, maximè si Pellicula tenax Cruorem obtegit, minimè tamen si haud satis firma sit Sanguinis *Crasis* & tenuis nimiùm, præcipuè si Serum ejus sit luridum valdè, aut rubellum — Haud tamen fida satis à Colore & Superficie Cruoris desumitur Indicatio, nisi pleno Flumine & Impetu profiliat : cum per Brachium destillat, aut exit quasi guttatim, falsa semper & florida Specie decipit.

Seçta imprimis Vena, mox Vomitus leni *Emetico* movere oportet, maximè si Nausea urget, aut Vomitus ; hoc enim Modo exantlatur optimè biliosa Colluvies, Fomes, si restaret, futurus Morbi — Hoc etiam ipsa Natura indicat, sua sæpissimè Sponte Vomitiones concitans — Nec solùm Initio, sed in quolibet Morbi Statu eluendus est Ventriculus, si urget Vomendi Conamen, aut Ructatio biliosa, olida & ingrata valdè ‡ — Vitellus Ovi putridus

* *Cels.* Præfat. p. 17. ex Edit. *Almeloveen.* † Perlege quæ de Sanguinis Missione dixi in Febris putridis malignis, *Essay on Fevers*, p. 104. ‡ Ubi Ructus amari cum Gravitate Præcordiorum sunt, ad Vomitus protinus confugiendum est. *Cels.* Lib. 1. C. 3.

tridus, vel ad perpauca Grana datus, horrendam mox excitat Choleram; stagnans & putrida Bilis haud multò minùs virulenta est, quam primùm igitur est ejicienda.

Sequitur plerumque post *Emeticum* Alvi Dejectio, si verò non respondet, Clystere leniore ducenda est: sive sic parùm reddit, sive fuerat ante Febris Accessionem astrictior debito, *Pharmacis* idoneis liquanda est, Manna nimirùm, *Cremore Tartari*, *Rhabarbaro*, Sale *Glauberi*, &c. quæ scilicet in primis Viis præcipuè agunt, minimas saltèm movent in Sanguine Turbas. — *Draastica* utiquè *Cathartica* deprecor prorsùs, utpotè nocentissima: mitiora verò hæcce exterminant commodè Humores, qui in Visceribus diutiùs morando majorem indiès acquirunt Acrimoniam, imò & in Sanguinem per Vasa *Mesaraica*, Venasque lacteas remigrant perpetuò. — Et post Vomitus & post *Catharsin Theriacæ Andromachi* aut *Elixiris asthmatici* paululum administrandum est.

Hisce peractis paulisper jam cunctandum est, ut qua Natura vergat scrutemur, nec officiosa Medicamentorum Farragine illam agamus deviam*; intereà tamen Diluentia quædam subacida propinanda sunt affatim, ut nova puraque Materia corrupto Sanguini admisceatur, ut acres ejus solvantur Sales, atque peccans corrigatur Acrimonia; hoc enim Modo *Crisis* promovetur optimè; præsertim si lenia aliqua attenuantia ac solventia adjuncta sunt. Nec facilè video quæ alia

* E

Medi-

*— Ἀκμαζούσων τῶν Νούσων Ἡουχίνου ἔχειν βελτίον. *Hippocrar.* Aph. 29. Sect. 2. Maximi profecto est hoc Monitum in acutis, quis prudens Medicus Naturam durante Paroxysmo vel Febris intermittentis intesturbat?

Medicina hoc Tempore Febris tentanda sit, ni forsan Vis Vitæ langueat, & torpeat Sanguinis Motus; tunc enim Stimulis agitandum est idoneis, *Epispastica* admovendo nempe; generosa porro exhibenda sunt *Alexipharmaca*.—Sed ne nimius sis, obsecro Medice! in Salibus *Volatilibus Alcalinis* ingerendis, ruunt enim jam omnia ad summam Putredinem, nisi Humorū Acrimonia temperare potes, & Sanguinis Dissolutionem prohibere.—Ideò ubi calidiora Medicamina exiguntur, admiscere soleo plerumque Acida quædam, uti Acetum, *Limonii* Succum, vel *Elixir Vitrioli*; quod Aromatibus imbutum haud contemnendum est *Alexipharmacum*, cujusque Guttæ aliquot sæpius exhibendæ sunt, ex Vino aromatite, aut *Julepo* quodam *Cardiaco* cum Bolo ex *Confect. Cardiac.* Croco, Rad. *Contrayerv.* &c.—Sed Nihil necesse est tradere Formulas, cum qui, quid indicatur in Re præsentē, calleat facillimo Negotio potest adaptare Remedia*: cave tamen ne Calcaribus utaris cum Opus est Fræno; nec vehemens nimium esto in Sudoribus exprimendis præcalidam Medicinam urgendo, nam si probè diluitur Sanguis, & servatur bene mistus, suo semper Tempore, suaque Sponte, ipsa Natura Sudorem profert †—Haud ibo Inficias equidem quod absque Sudore quàm rarissimè solvitur Febris, profusus tamen mihi semper suspectus est.

Hanc

* Εἰ τις ἐδὲν τὴν Αἰτίαν τοῦ νοσήματος, οἶδεν πρὶν φερεῖν τὰ συμπτώματα. Hippocrat. de Flatib. Initio. † Πάντη δὲ ἀνοιγόμενον, τε ἡ ἀναπνὴν, καὶ κινημένον τὸ Σῶμα, συμ-
φύρον ποιήσει. Hippocrat. de Locis in Homin. Sect. 39.

Hanc adeò in Morbis hujusmodi curandis *Methodum* plerumque sequor—Per Initia Febris, debitas post Exinanitiones, *Haustus salinos* præcipio, ex Sale nempe *Alcalino fixo* aut *volatili* (prout Res postulat, quorum hic Sudores, ille Urinam magis movet) *Succo Limonum*, *Aurantiorum* Hispaliensium, aut Aceto Vini acerrimo, bene saturato, cui admisceo Aquam *Alexeter* simplicem Sp. Lavend. C. aut his similia. Hoc modo conficitur Medicamentum, blandi ad instar Saponis, crassos resolvens Humores ac cum aquosa Sanguinis Parte Olea Salesque intimè commiscens—Diluentia interim subacida affatim ministranda sunt, quæ, mediante hoc Remedio salino, toti Humorum Massæ promptissimè admiscentur: Sic bene mistus & fluidus servatur Sanguis, ejusque temperatur Acrimonia; dum acres soluti Sales per Cutim, per Alvum, per Urinam effluunt perpetim; nec verò interea interturbatur Natura dum Concoctionem molitur. Atqui si tardat nimis languetque, generosa magis Medicina vacillantem refoveo; id maximè, si aut Sudor sit frigidulus, aut Urina Pallida, aut Eruptiones (Pustulæ sint sive *Petechiæ*) Coloris minùs vividi.

Per hæc efficitur plerumque ut blandi tandem Sudores erumpant, qui Febrem tenuant quotidie; si tamen inæquales sunt, & parùm constantes, aut subfrigidi, aut profusi admodum, haud ita feliciter, mox enim Rigor accedit sæpe, ac Febris *Exacerbatio*, paulòque post Phrenitis; qua quidem ingruente Alvus protinùs *Enemate* ducenda est si fuerat astricta (vellem utiquè semper teneram potius quàm constipatam per totum

Morbi Decursum) Si Furor urget ad Cucurbitulas scarificatas, Humeris Cervicibusque affixas, confugiendum est; quo peracto *Epispastica* admovenda sunt pone Aures, Occipiti, ipsis quandoque Locis scarificatis; Tibiis proinde aut Femoribus.—Hæc verò maximè ex Ufu sunt, ubi Vis Naturæ torpet, languetque Pulsus Arteriarum.—Jam autem Bolis *cardiacis* adjicio *Camphoram* ac *Succini Salem*, interposita quoque interdum *Uncia una*, vel altera, *Diacodii*, imò si Vigiliæ urgent uno, alterove, Extracti Thebaici Grano.

In hac ferè Medicina persisto Morbi usque Statum, quo aut in melius, aut pejus multò ocyùs mutantur omnia; nec Dies jam, sed & vel ipsæ Horæ æstimandæ sunt: Si modò nec propitius adjuvat Sudor, neque *Diarrhæa* blanda, nec libera accedit Expuitio, in Malis Æger est.—Tentandum est tunc utiquè quid possit lenis Alvi Purgatio, exhibendo nimirum *Rhabarbarum*, *Mannam*, *Cremorem Tartari*, *Salem Glauberi*, &c. subveniendum est intereà Virium Ruinæ *Cardiacis* idoneis: vix meliora novi utiquè quàm Vinum rubrum generosum Aromaticis incoctis, Cinnamo scilicet, Maci, Nuce *Moschata*, Cort. *Aurant. Hispalienf. &c.* cum Aquæ Dimidio, aut subaustera quædam *Alexipharmaca* cum *Elix. Vitrioli*, vel *Limonum Succo*; hæc quippe & Vim Fibrarum & Sanguinis *Crasin* confirmant, Humorū autem Putrefactioni obsistunt maximè. Quod quidem diligenter cavendum est, ubi aliter Sanguis in Saniem, Lympha verò in *Ichorem* degenerant, brevique obrepit omnium Dissol-

Dissolutio putrida, ac si Sanguini immistum fuisset Viperæ * Venenum.

Purgationem per Inferiora poscunt Hypochondria tumida, Intestinorum Murmura, Abdomen tensum, Alvus adstricta, Caput grave, Somnolentia nimia, Vertigo, ingruens Delirium, Halitus foetidus valdè, & Præcordiorum Oppressio cum Ructu frequente.—Prohibent autem Sudores faciles, constantes & æquales, Pustulæ, aut *Exanthemata* jam erumpentia, Expuitio copiosa adveniens; nam vel in *Peripneumonicis* *Diarrhæa* sæpe Sputa supprimit prorsus; quod quoquè in *Variolis* haud rarò accidit infelicitè—minusque commodè semper fert *Catharsin* magnus Virium Languor.

Sub conditionibus autem suprà expositis nullo non Tempore Morbi Alvum moveo †, maximè declinante Febre, ubi nulla alia Via molitur Natura *Crisin*.

Tentatur sæpissimè, fausto admodum Successu, hæc purgandi Methodus in *Variolis* confluentibus, nono, vel undecimo ab Eruptione Die, cum parùm aliquid ultrà per Salivæ Ductus, aut per Cutis Meatus exterminari possit: Quidni & in hac quoquè Febre?—Procul Dubio ubi putrida Colluvies atque corrupta Bilis in Ventriculo & Intestinis abundant, quantocyùs herclè expurganda sunt, ni vis usque fovere Morbum, aucta in Horas Putredine †.—In hac Febre profectò, de qua nunc agitur, & per Vomitus & per Alvum immensam Vim biliosæ Saburræ sæpiùs rejectam vidi, magno utiquè cum Ægro-

* Vide *Essay on Fevers*, p. 51. † Ibid. p. 111. — 114.

tantium Levamine; suavi mox accedente Somno, ubi per plures Dies Noctesque summa antecesserat *Anxietas*, ac *Vigilia* perpetua — Dum *Ventriculus* sanè acribus gravatur *Sordibus*, & putrida *Bile*, laborat semper maximè *Caput*, perturbantur *Spiritus*, & prosternuntur admodum *Vires*. — Nec in primis tantum *Viis* felices edit *Effectus Vomitus*, sed & per omnem undique *Vasculorum Compaginem*, ubi lentescentes attenuat *Humores*, putridosque expellit.*

Nova Luna 12°. *JULIO*. *Plena Luna* 27°.

Hic quoque *Mensis* fuit subfrigidus, *Aer* autem maximè ficcus & quasi fumosus; *Libs* sæpe afflavit, *Corus* sæpius, *Eurus* interdum: *Fons* omnis & *Rivus* exarescunt ferè, vix viridis inventa est *Herba*.

Pluvia 4. 7. 9. 10. 12. 16. 19. 20. 26.
Dig. Dec.

30. = 0. 608.

Tonitru 30. *Pluvia* gravissima ad *Septentrio-*
nem 28.

⌘ *Altitud.* maxim. 15. 29. 9. N N VV 1. } *media* 29. $6\frac{16}{31}$
—— minim. 26. 29. 3. S S VV 3.
Dies frigid. 22. 39. N N VV 1. }
— calid. 3. 26. S VV b VV. 2x. } *media* $31\frac{3}{31}$

Variolæ jam *epidemicæ*, mites tamen plerumque; *Rubeoli* passim & *Morbi Pulmonis*; sub *Finem* *Mensis* *Dysenteria* frequens.

Jam

* Vide *Cr. Cheyne's new Theory of Fevers*, p. 83–94.
Edit. 3. Ann. 1722.

Jam maximè furit Febris pestilentialis plurimosque demittit ad Umbras; Funera certè nunc sexiès saltèm excedunt solitum Numerum: nec solùm hìc, sed & per Viciniam jam grassatur Morbus. — Anxietas horrida, Jactatio perpetua, atrox Capitis Dolor, cruciant Ægrotos, atque mox ferox accedit Insania, paulòque sæpe pòst Vternus, aut Nervorum Distentio: Alvus, Urina, Lachrymæ, Nil sentientibus effluunt, sæpe Vox Faucibus hæret prorsùs, sæpe Lingua nigra aridissima, Verba incondita, aut aliena balbutit. — Plurimis sub Morbi Finem adest Exulceratio Faucium acerbissima, etsi Initio levis tantùm erat Aspretudo; difficillima hinc Deglutitio, nec sine summo Tormento. *Parotides*, *Bubones*, *Furunculi* admodùm dolentes; haud rarò nonum inter Morbi Diem & decimum quartum erumpunt; Salutaria hæc plerumque, maximè si probè suppurant, pessima utiquè si mox recedunt: interdum verò per plurimos Dies indurata permanent sine vel minima Suppuratione, præcipuè in Cervicibus, ubi per Menses etiam aliquando perdurant.

Circa hoc Tempus quoquè sæpe *Diarrhœa* salutifera oritur, id potissimum si biliosa, aut subnigra, atqui non nimis liquida, dejiciuntur: Alvus autem saniosa, cruenta, aut valdè aquosa, mala semper — hujus autem Fœtor plerumque vel Aniculis ministrantibus, imò & ipsis Ægris, planè intolerabilis: interdum urget admodùm pestifer Tenesmus.

Urina vel in Convalescentibus cruda perstat, ac sæpe tenuis, sæpe autem turbida, lactea, & oleosa quasi, nihil tamen omninò Sedimenti deponit: evidens hoc magnæ Cruditatis Argu-

mentum est; adeoque, licet Ægrôtantes penè re-
stituti viderentur, fréquenter tamen promptis-
simè, in * Recidivas incidunt. Convalescentes
sanè, qui Carnem nimis citò, aut Pisces come-
dunt, in Febrem certò certius relabuntur; Præci-
puè haud probè priùs purgato Corpore.—For-
tiora tamen *Cathartica* hos etiam in idem Peri-
culum conjiciunt.

Quibus in Meatu auriculari, aut pone Aures,
aut per Cervicēs Abscessus enati sunt, maximè si
circa Labia Pustulæ plures urentes, certa ferè
Spes Salutis effulsit: omnibus Ægrotantibus Sur-
ditas ac Tinnitus aurium accidit, diu sæpe post
ruptum *Apostema* durans.

Mirum est herclè, quod Eruptio tantillæ Ma-
teriæ morbidæ tam felices sortiatur Effectus;
quod tamen persæpe videmus: vix enim hoc
Modo ejici posse videtur Morbi Causa. Suspi-
cor ego quidem hoc duntaxat esse Signum, quòd
validæ adhuc sint Naturæ Vires, & quòd sit us-
que Sanguini Motus sat expeditus per ultimas
minimasque Arteriolas: quibus deficientibus, nec
maturatur *Apostema*, aut Tuberculum, nec emer-
gunt Pustulæ. Hinc vides paulò ante Mortem,
succumbente nimirum prorsus Natura, Ulcus-
cula pallida, aut exsiccata, &, si quæ sint Pustu-
læ, eas pallescentes, aut lùridas, hærente scilicet
in extremis Vasculis Sanguine.

Inter salutifera Signa insuper fuit acidus, aut
falsus in Ore Sapor, cum Sputo multo; contrà
verò amarus & quasi ex Ærugine (ut dicerent)
foedus

* Febris, quæ sine Ratione, sine bonis Signis, finita est,
ferè revertitur, *Cels. Lib. 2. C. 7. Hippocr. Aph. 12. Sect. 2.*

foedus certum fuit malè judicati Morbi Signum ; ac Febris mox recidivæ, ni per Vomitum, aut lenem *Catharsin* ocys expurgata forent putrida Bilis & colluvies morbida. Quo quidem peracto felices quotidie experiebar *Tincturæ Corticis Alexipharmacæ* * Effectus, & ad Vires reficiendas & Febris Reliquias abigendas. Hujus est utriquè Medicamentu roborare Fibras atque debitam Fluidorum Constitutionem restituere, nec tamen intereà prohibet morboſi Humoris Exitum per Cutis Meatus: hinc longè tutiùs sæpe exhibetur quam ipse Cortex *Peruvianus*, qui haud rarò vehementer nimis constringit.

Per totam hanc infaluberrimam Tempestatem *Vesicatoria* immensum ferè fundebant Humorem, sanescebant verò difficillimè; quosdam certè enormi Fluxu consumeabant prorsùs.

Diu fuit undique Piscium immensa Quantitas, maximè Scombrorum, quorum Uſu immodico procul Dubio plures generantur Morbi; augment enim & Humorù Putredinem ac Labem *Scorbuticam*, jam ubique grassantem, inter Nautas præcipuè, quorum Gingivæ exesæ sunt admodum & Halitus Oris valdè olidus—Rectissimè ideò cum Piscibus comeditur Aceti plurimùm, quod rancidum eorum Oleum corrigit, & putrescentem Indolem—Nullus utiquè dubito quin largus Aceti & Pomacei Uſus foret Nautis utilissimus in longis Navigationibus †: imò hoc jam satè expertum est, adeò ut secum plurimi ad Indiam usque Orientalem *Vinum Pomaceum* deportant.

* *Essay on Fevers*, p. 122. † Vide Monitum nostrum de Sanitate Nautarum tuenda ad Calcem Lib. de Febris.

tant: Acetum verò Carnis & Aquæ Corruptionem prohibet.

Nova Luna 11°. *AUGUSTO*. *Plena Luna* 25°.

Maxima jam Cœli est & Soli Mutatio, perpetuæ ferè decidunt Pluviæ, atque omnia nimio diffluunt Humore; unde Messis infelix admodum, Frumentum penè corruptum, & Fructus prorsus fatui—Immensa scatet undique Vis Fungorum.

Ventus fuit australis sæpissimè; haud rarò sævit Libs procellosus, hinc *Atmosphæra* crassa valdè, frigida, & maximè humida, præsertim sub Mensis Finem.

Pluvia ¹¹2. ¹3. ¹4. ¹5. ¹6. 10.—12. 15. ¹16. ¹17. 18.
¹¹20. 21. 22. 24. 25. ¹¹¹¹26. ¹27. ¹28. ¹¹¹31.—3. 5 10.
 Procella 26. a. m. S S W 4^r.—28. a. m. S W
 4. Magna Pruina 29.

♂ Altitud. maxim. 30. 29. 0. S E 1. } media 29. 4²/₃
 ——— minim. 3. 29. 1. S VV 2. }
 Dies frigid. 29. 42. N. 1. }
 — calid. 1. 27. N VV 1. } media 34²⁵/₃

Variolæ Epidemicæ, quæ hic quidem parùm sunt lethiferæ, longè aliter tamen aliis in Locis.

Dysenteria cruenta, ac *Cholera* frequens—multi levi Angina atque Faucium Tumore vexantur cum Dolöribus vagis *rheumaticis*.

Grassatur adhuc Febris nautica maligna, Plurimosque trucidat, quosdam vel Die septimo, imò interdum citiùs; multos autem vel ad vicissimum & ultra trahit—jam sæpe aut nullæ prorsus.

sus apparent *Petechiæ*, aut raræ; sæpe tamen totum Corpus maculant—crebrò Sudores pingues & foetidi Ægrotos colliquant; haud rarò quos Febris ferè reliquerat sæva *Dysenteria* consumit: Solutis adeò Sanguinis Principiis, qua data Porta ruunt Humores.

Nova Luna 10°. *SEPTEMBRI*. *Plena Luna* 24°.

Ventus, ab Occidente, ad Austrum plerumque vergens, prævaluit decimum usque octavum, continua ferè ac gravi decidente Pluvia, post autem contrario planè Cursu spirabat, surgente *Baroscopio*, Aeremque siccabat.

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|
| | $\frac{III}{2}$ | $\frac{II}{3}$ | $\frac{I}{5}$ | $\frac{I}{6}$ | $\frac{I}{7}$ | $\frac{I}{9}$ | $\frac{III}{10}$ | $\frac{I}{11}$ | | $\frac{II}{13}$ | $\frac{II}{15}$ |
| Pluvia | 1. | 2. | 3. | 5. | 6. | 7. | 9. | 10. | 11. | 13. | 15. |
| | Dig. Dec. | | | | | | | | | | |

16. 17. 22. 23. 24. = 3. 628.

Levis Procella 7. p. m. S. w b. w 4^x.—27.
Nocte E. b. S. 4^x. Paraselene 17. H. 7. p. m.
w N w 1.

| | | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| 8. Altitud. maxim. | 25. | 30. | 0. | N E 1. | } media 29. 6 $\frac{2}{28}$ |
| — minim. | 11. | 29. | 0. | VV 3. | |
| Dies frigid. | 30. | 59. | N E 1. | } media 41 $\frac{1}{2}$ | |
| — tepid. | 6. | 34. | S. VV 2 $\frac{1}{2}$ | | |

Febres malignæ jam nec Vi, nec Numero, adeò sæviunt. *Dysenteria* plures cruciat; Tussis quædam gravis *Asthmatica* haud paucos. Tumores Faucium, *Parotidum*, Maxillarum cum acerbo Dentium Dolore permultos divexant: Morbus colicus à *Pomaceo* novello, cum Alvo citissima plures exercet, *Ophthalmia* passim, *Variolæ* plurimæ.

Nova Luna 9^o. OCTOBRI. Plena Luna 23^o

Fuit hic Mensis multò frigidior solito, Gelu ipso Initio, etiam rigidum Die decimo; Boreas plerumque spiravit, Eurus haud rarò, pluvius Auster nonnunquam: Alta fuit utplurimum Barometri Statio, Aer verò crassus.

Pluvia $\frac{11}{4}$. $\frac{1}{5}$. 6.—8. 16. $\frac{11}{17}$. $\frac{1}{19}$. 20. 21. $\frac{1}{23}$.
 $\frac{1}{24}$. 28. 29. Grando 7. Grando & Nix multa
 Dig. Dec.
 ta 23. = I. 914.

8 Altitud. maxim. 27. 30. 3. NE 1. } media 29. $8\frac{12}{28}$
 ——— minim. 20. 29. 3. S VV 2x. }
 Dies frigid. 27. 69. } media $56\frac{12}{28}$
 — repid. 20. 44. }

Febres lentæ nervosæ frequentes; permanent usque aliquæ malignæ quibus sub Finem accedit *Diarrhæa*, interdum *Dysenteria* mucosa cum Sanguinis Strigmentis.

Tussis, Angina, Faucium Tumores, Dentiumque Dolores perplurimos corripunt. Jam regnat admodum *Colica pomacea*, haud solito tamen cum Furore, ob *Diarrhæam* ferè semper comitantem: *Variolæ* adhuc epidemica.

Nova Luna 8^o. NOVEMBRI. Plena Luna 22^o

Fuit & November perquam frigidus, Aer plerumque crassus, afflavit Aquilo sæpe, sæpe Corrus,

1740)

& Morbis Epidemicis.

61

rus, intercurrente frequenter Africo furente & pluviOSO; maximæ subinde Pruinæ, haud rarò rigidum Gelu.

Pluvia $\frac{III}{I}$. $\frac{I}{2}$. 5. 7. $\frac{I}{9}$. 10. 11. 13. 14. $\frac{II}{16}$.
20. $\frac{II}{21}$. 22. 23. $\frac{III}{25}$. $\frac{I}{27}$. 28. — 30. Grando 1.
Dig. Dec.

5. 25. Nix multa 2. 24. 25. = 3. 844.

Procella gravissima 1. à primo Mane ad Noctem usque. N. w 4^x.

———— 21. Mane S w b w 4. — 26. Nocte S w 4^x.

Fulgur & Tonitru 25. Vesperi.

8 Altitud. maxim. 18. 30. 2. N N VV 1. } media 29. $5\frac{14}{29}$
———— minim. 24. 28. 8. E 2.

Dies frigid. 25. 69. N N E 1.

— tepid. 15. 50. S VV b VV 1. } media 60 $\frac{20}{29}$

Variolæ usque grassantur; Febres malignæ passim, lentæ ac *miliares* sparsæ, Ruri præcipuè; Erysipelas, Angina, Tussis acres haud paucos corripunt. Plurimi Colica *pomacea* laborant cum *Diarrhæa* plerumque, adeòque citò profligatur; solutum enim Ventrem rarò torquet admodum Colicus Morbus, saltem brevi cedit Anodynis; iisque opportunus est Locus post unam alteramve Rhabarbari *Dosin*; neque inter hæc melius est aliquid *Philonio*. Cave tamen ne Alvum nimis citò strictam reddas, nam paulò post ut plurimum recrudescit Dolor, congesta scilicet iterum acri Colluvie; tenera iccirco semper per Dies aliquot servanda est; probe autem intereà munien-

dam

dum est Corpus à Frigore, aliter, constricta
Cute, mox plectuntur Viscera *.

Nova Luna 7. DECEMBRI. Plena Luna 21.

Per Initia Decembris dira, procellosa, pluvia
Tempestas, Libs interim quotidie perfremuit:
Die 2. & 3. Fulgura sæva cum Tonitru, Grandine,
Pluvia; hinc Aer factus est crassissimus & maxi-
mè humidus. Ab undecimo ad vicessimum, mu-
tata penitus Rerum Facie, rigidissimum Gelu,
immensæ Pruinæ; Cælumque sudum perflante
Borea: inde verò Auster prævaluit atque *Atmo-
spheram* densam valdè ac udam maximè fecit.

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----|-----|
| | $\frac{III}{I}$ | $\frac{I}{2}$ | $\frac{II}{3}$ | | $\frac{II}{5}$ | $\frac{II}{6}$ | $\frac{III}{7}$ | $\frac{II}{8}$ | $\frac{II}{9}$ | | |
| Pluvia | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 19. |
| | $\frac{III}{21}$ | $\frac{II}{22}$ | | $\frac{III}{23}$ | $\frac{I}{26}$ | $\frac{I}{27}$ | | | | | |
| | 21. | 22. | 23. | 26. | 27. | 29. | 30. | 31. | Grando ve- | | |
| | | | | | | | | | Dig. Dec. | | |
| hemens 2. | Nix | $\frac{I}{14}$ | $\frac{I}{15}$ | $\frac{I}{19}$ | $\frac{I}{20}$ | = 6. 290. | | | | | |

Furens Procella 1. Nocte S w 4^x. — 2. p. m.
S w b w 4.

Procella 3. S w 4^x. — 5. w 4^x. Vesperis — 6.
primo Mane w S w 4.

— 20. ante Lucem N w b N 4. — 21. to-
to Die SSE 4. cum enormi Pluvia, quæ o-
nem penitus Nivem colliquabat; isto etiam Die
Fulgura & Tonitrua gravissima.

Nebu-

* Consensum Cutim inter & Intestina probè novit *Alex. Trallianus* " αὐξεραι γὰρ τὸ πνεῦμα (ad Intestina scilicet) εἰς ὅσον αὖ πνύσθῃ τὸ Δέρμα. " *Trallian.* p. 216. ex Edit. Goupyli, sed etiam *Hippocra.* Lib. 6. Epidem. Sect. 3. ipso Initio *Luter.* Fol. 1548.

1741)

& Morbis Epidemicis.

83

Nebula foetidissima 27. w S w 1^r.

8 Altitud. maxim. 31. 30. 0. N VV 1x. } media 29. 4.
 ——— minim. 22. 28. 8. S S V 3x. }
 Dies frigidissim. 19. 80. E N E 1. } media 61 $\frac{25}{30}$
 — tepid. 8. 49. S VV 3. }

Crebrae adhuc *Variolæ*: *Pleuritides*, *Peripneumoniae*, *Rheumatismi* passim: Febres petechiales aliquæ adhuc, Tussis vehemens, & *Asthma* grave plurimos premit: Morbus colicus frequentissimus, hunc tamen Alvus cita admodum & biliosa brevi solvit.

Tota Pluviae Quantitas Anno MDCCXL.
 Dig. Dec.
 = 24. 042.

Nova Luna 6°. JANUARIO. *Plena Luna* 20°.

Ab Initio Mensis ad Diem sextum spiravit *Caurus*, inde ad decimum quintum frigidissimus *Boreas*, tunc Libs pluvius irruit, a vicesimo sexto tamen ad Finem usque fremuit subinde *Vultur*—Medio Mense acerrimum Gelu, Aerque valdè ficcus; dum autem *Africus* perflavit factus est humidissimus, liquecente prorsus Gelu.

Pluvia 2. $\frac{1}{16}$. $\frac{11}{18}$. $\frac{111}{19}$. $\frac{1}{21}$. $\frac{1}{22}$. 24. 25. $\frac{2}{27}$.
 Dig. Dec.
 28. 29. Nix 10. 12. 14. = 1. 936.

Procella 27. Nocte & toto Die sequente S E
 b E 4.

8 Altitud. maxim. 1. 30. 3. N. VV 1. } media 29. 8.
 ——— minim. 16. 28. 9. SS V 3. }
 Dies frigidissima 15. 79. E N E 1x. } media 61 $\frac{22}{31}$
 — tepid. 22. 52. S VV 3x. }

Vario-

Variolæ frequentes etiamnum ; Per plurimi Colica laborant, multi fanè ex Ufu *Pomacei* novelli, haud pauci verò à superabundante Bile ; omnes liquida citaque Alvus exercet, nunc biliosa valdè, nunc mucosa. Multi acuti Pectoris Morbi ; Anginæ & *Rheumatismi* frequentes, *Apoplexia* & *Epilepsia* passim.

Tabidi pulmonarii jam pessimè se habent, aucta nempe plurimùm Tussi & Gravitate Spirandi.

Febris *petecbialis* jam paulò magis sævit.

Fœda admodùm Scabies dominatur maximè inter Popellum, obstructis nimirùm Cutis Spiraculis, à gravi longoque Frigore, detinetur Materia, quæ perspirare debebat, unde Glandulæ *miliares* obserantur atque roduntur tandem — In frigidis Regionibus & Tempestatibus semper grassatur *Scorbutica* Lues, densata plurimùm Cute, ac retenta nimium salina Corporis Fuligine — annon hinc hujus *Prophylaxis*, annon hinc Cura ex facili elicitur? Multò faciliùs utique curatur per Æstatem quàm durante Hyeme asperiore.

Nova Luna 4°. FEBRUARIO. *Plena Luna* 19°.

Sublimè ut plurimùm stetit *Mercurius* in *Baroscopio* hoc Mense, idque etiam Initio, licet *Vultur* nonnunquam flavit, imò & ipse *Auster*; Aer autem tunc fuit humidus valdè & crassus * ; à decimo octavo tamen ad Finem usque frequens *Ventus borealis Atmosphæram* tenuem fecit, perquam frigidam, & multò sicciorem.

Pluvia

* Vid. Vol. I. p. 181.

Pluvia 1. 5. — 7. 10. ²¹14. 15. ¹16. ¹¹17. 18. 19.
Dig. Dec.

26. Grando multa 15. 16. 17. = 1. 456.

Barometer fuit ad 30. 5. * septimo etsi Ventus S S E 2^x.

Maxima verò tunc Nebula. — Procella 16. Mane S 4^x.

Fulgur & Tonitru Vesperis. Quàm maximus Halo circa Lunam 11. H. 9. p. m. S. w. b. w. 1.

| | | |
|--------------|---|--|
| 8 | Altitud. maxim. 27. 30. 6. E N E 1. | } media 29. 9 ⁵ / ₂₈ . |
| — | minim. 16. 29. 2. S b VV 3 ^x . | |
| Dies frigid. | 24. 72. E N E 1. | } media 59 ² / ₂₈ . |
| — tepid. | 6. 53. Malacia. | |

Multæ adhuc *Variolæ* : *Rheumatismi* , *Peripneumoniæ* , *Pleuritides* , & veræ & nothæ passim. Tussis vehementes , & diri admodum *Asthmatis Paroxyismi* frequentes : hinc Tempestas fuit maximè noxia tabidis , nam Tussis movet Boreas , Pulmones verò constringit ac Sputa supprimit. — *Colica* & *Diarrhæa* , seu Tormina sæviunt plurimùm.

Durat usque Febris maligna , inter Nautas verò præcipuè , & maximè in *Nosocomiis*.

Nova Luna 6°. MARTIO. *Plena Luna* 21°.

Præalta fuit *Barometri* Statio toto Martio , Ventus intereà perpetuus Orientem inter & Septentrionem ; Aer verò siccissimus ac frigidus valdè , Gelu frequens admodum , imo ad Finem

* F usque

* Vide Vol. I. p. 181.

usque Mensis asperum : per totum ne vel Gut-
tula Pluviæ.

Dig. Dec.

Nix 18. 19. Grando 28. = 0.072.

Maris Æstus suppressit maximè Boreas longè frequens, paululùm etiam magna Barometri Altitudo *. Hoc sanè perpetuum est, quòd adventante procellosa, pluviaque Tempestate & Sonitus Maris permagni, & Æstus enormes præcedunt, quinimò portendunt, his in Oris saltem; contrà durante Apricitate, Ventoque boreali, minimi sunt semper & Fluctus & Æstus Maris.

AB. 5. H. 9. N N E 1. —levis 9. H. 8. E 1x.
—21. Vesperi E N E 2.

| | | | | | | |
|------|-----------------|-----|-----|-----------|----------------------------|-----------------------------|
| ♂ | Altitud. maxim. | 7. | 30. | 9. | N E 1. | } media 30. $0\frac{2}{31}$ |
| | minim. | 31. | 29. | 6. | N 1. | |
| Dies | frigid. | 30. | 68. | E N E 2. | } media 56 $\frac{19}{31}$ | |
| — | tepid. | 9. | 50. | E b S 1x. | | |

Variolæ ubique Epidemicæ, plerumque tamen paulò mitiores, nisi inter Nautas, quorum plures equidem pereunt, una forsan conspirante Febre maligna, quæ permanet adhuc: Credo etiam quòd Scorbutica Lues, qua hoc Genus Hominum jam maximè afficitur, Variolas magis exitiales reddit: haud rarò Mictus adest cruentus, interdum Spûta sanguinolenta.

Plurimæ Pleuritides ac Peripneumonia, æque vehementes admodùm † — sævit abundè Rheumatismus & Arthritis, nec infrequens est gravis Angina † — sævissimum Asthma quosdam diu ac cru-

* Vide Vol. I. p. 17. † "Όταν χειμῆριον γένηται Ἡρκαὶ ὀπισθ' ὁ χειμῶν, χειμερῖναι ἔχ' αἰ νοῦσοι, καὶ βηχῶδες, ἔχ' περὶ πνευμονικαί, καὶ κυναγχικαί". Hippocr. de Humorib. Sect. 7.

crudeliter premit — Tussis importuna valdè & laboriosa plurimos — Horum omnium ferè Sanguis extractus est perquàm tenax. *Phthifici* haud pauci subito abripiuntur.

Nova Luna 4°. *APRILI*. *Plena Luna* 19°.

Manet usque *Atmosphæra* Constitutio sicca valdè & frigida; Initio Mensis Gelu & maximæ Pruinæ; Ventus Aquilonius sæpiùs hoc Mense, sub Finem verò ab Oriente spirabat, Aer interim tenuis & maximè siccus, medio autem largissimæ Rorationes — Sub Finem multa Pluvia apud *Totness*, *Dartmouth*, *Kingsbridge*, &c. hinc ne vel Guttula.

Dig. Dec.

Pluvia 1. 5. 8. $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$ 20. 21. = 0.452.

8 Altitud. maxim. 3. 30. 4. N 1. } media 29. $9\frac{24}{29}$
 ——— minim. 1. 29. 5. N 18. }
 Dies frigid. 2. 64. N 1. }
 — tepid. 14. 41. Malacia. } media $47\frac{14}{29}$

Variola quaquaversum *Epidemicæ*; *Pleuropneumonice* frequentes valdè: *Asthma*, Tussis vehemens, Verbo & acuti & *chronici* Pulmonum Morbi invalescunt maximè: haud pauci Sanguinis Sputo corripiuntur; permulti *Phthifici* ad plures abeunt.

Plurimæ Febres putridæ, sæpe cum Eruptione *miliari*, sæpe cum *Petechiis* in australi *Dæmonia* — Sedulò inquirens has plerumque esse Propagines Febris nauticæ contagiosæ invenio, ea nempe Loca adeuntè uno, alterove Nauta convalescente: parùm adeò tutum est recipere ex

Febre contagiosa recuperatos: diu sanè Vēstibus adhæret Morbi Seminium.

Nova Luna 4°. *MAIO*. *Plena Luna* 19°.

Ineunte & exeunte Mense Aer erat maximè fīccus, medio autem densus & paulò humidior; quippe frequens decidit Imber Diem quartum inter & undecimum, postea vix Guttula Pluviae; afflavit sæpe Vulturū, Aquilo tamen Initio, sub Finem Caurus. Ros erat subinde uberissimus, à vicesimo præcipuè.

Erucae innumeræ Hortis sunt infensissimæ.

Pluvia 5. $\frac{1}{6}$. 7. $\frac{2}{8}$. 10. 13. 15. 17. $\frac{u}{18}$. 19.
Dig. Dec.

= 0. 928.

Procella levis 19. Mane SSE 4°. Imbres gravissimi 30. ad Septentrionem hīc nulli.

| | | | | | | |
|---|-----------------|-----|-----|-----------|----------------------------|----------------------------|
| 8 | Altitud. maxim. | 21. | 30. | 1. | E b S 1. | } media 29. $6\frac{2}{3}$ |
| | minim. | 18. | 19. | 1. | S VV b VV 2x. | |
| | Dies frigid. | 14. | 52. | N b E 1x. | } media 37 $\frac{22}{30}$ | |
| | — calid. | 27. | 24. | NN VV 1. | | |

Vix unquam memini *Variolas* magis ubique grassantes; *Rubeoli* passim, seu *Rossalia Frid. Hoffmanni*.— *Angina*, *Tussis*, *Asthma* frequens. Febres quædam tertianæ*, lentæ quædam ac nervosæ, plures petechiales; jam autem multò magis floridæ sunt Maculæ.

Nova

* Consule quæ dixi, *Essay on Fevers*, p. 20. 21.

Nova Luna 2^o. JUNIO. Plena Luna 17^o.

Ventus hoc Mense varius, Zephyrus autem prævaluit: Aer plerumque crassus; fervida admodum sub Finem Tempestas.— Vis immensa Erucarum omnium Generum omnia ferè Olera devorant: Cicadæ innumeræ, Muscæ infinitæ ac Afili Pecora maximè infestant.

Pluvia $\frac{1}{2}$. 2. $\frac{1}{2}$. 3. 6. 7. $\frac{1}{2}$. 8. 9. 16. — 18. $\frac{1}{2}$. 19. 20. $\frac{1}{2}$.

$\frac{1}{2}$ Dig. Dec.

24. 26. 27. — 1. 250.

Lumen insolitum 29. H. 11. p. m. Arcus nempe igneus lucidus valdè ab Horizonte prope S E ad Gradus saltem nonaginta projectus.

| | | | |
|------|-----------------|-----------------------------|------------------------------|
| 8 | Altitud. maxim. | 13. 30. N VV 1. | } media 29. $6\frac{15}{28}$ |
| — | — | minim. 8. 29. 3. VV S VV 2. | |
| Dies | frigid. | 10. 34. VV B N ix. | } media 27 $\frac{22}{28}$ |
| — | fervid. | 29. 18. S E 1. | |

*Variolæ maxime epidemicæ longè latèque, per multos occidunt: hinc tamen non sunt adeò lethales, nisi accedunt Petechiæ. Aura * subfrigida & Potio subacida liberalis est variolosis nunc maximè necessaria, brevi aliter suffocantur; terribus enim jam est Odor confluentium Variolarum: neque hoc inter mala Signa numerandum est, modò cætera favent. Levis Febris rubeolosa, seu pustulata passim. Anginæ, & Faucium Tumores crebri. Febres nauticæ sparsæ.*

* F 3

Nova.

* Consule quæ dixi, *Essay on Fevers*, Cap. de Variolis, p. 162.

Nova Luna 1^o. JUNIO. Plena Luna 17^o.
Nova 31^o.

Torrida valdè & aridissima Tempestas omnia ferè adussit, vix viridem vides Herbam nisi in Pratis humidissimis, matura tamen hinc Messis & opima, Frumentum optimum. — Mensis Initio venit ab Oriente Ventus, pòst septimum ab Aquilone ad vicefimum usque, inde ad Finem parum erat constans. Ros plurimus omni ferè Nocte. Innumerabiles garrulæ Cicadæ: Muscæ & Afili Armenta vexant admodum.

Quamvis *Atmosfera* est siccissima, ut *Hygrosopia* monstrant, levi tamen Fumo offuscata videtur, quod quidem haud rarò per siccas valdè & apricas Tempestates accedit*.

Dig. Dec.

Pluvia 5. 6. 16. 18. 20. 25. 28. 29. = 0.764.
Fulgura 3. Nocte E S E 3. Tonitru quoque è longinquo. Permagnus Lumen boreale & lucidum valdè, effulgente licet Luna, 12. per totam fere Noctem, N. 1.

| | |
|---------------------------------------|--|
| ♂ Altitud. maxim. 9. 29. 9. N N E 1x. | } media 29. 5 ⁸ / ₂₇ |
| — minim. 5. 29. 3. E S E 2x. | |
| Dies frigid. 20. 30. 0. N 1. | } media 22 ⁴ / ₂₇ |
| — fervid. 14. 14. N 1x. | |

Dies valdè fervidæ 1. 7. 9. 10. 11. 13. 14. 15. 24. 28.

Variolæ undique. Febres multæ putridæ magna cum Oppressione Præcordiorum, arida Lingua, ac

* Vide Observat. Mense Junii 1740.

ac Urina valdè biliosa. Cholera & *Diarrhœa* valdè frequens; porracea, nigra, sæpe rejiciuntur; Tormina plerumque sæviunt multùm, Bilis subatræ plurimum dejectur. Ob Æstum enormem omnes maximè debilitantur Sudore profuso penè digesti.

Non solùm humidissima Sanguinis dissipat fervida Tempestas, sed & ejus Partem maximè ætuosam, Vim porrò Fibrarum vehementer enervat: Quid inde? restat crassior atque segnior Moles Humorum, unde in Vasis *meseraicis*, Hepate, Splene, & ubicunque tardior est, ex ipsa Lege Naturæ, Sanguinis Motus, Obstructio facilis oritur & prompta nimis. Atqui cum & ipse Calor immodicus Sales Oleaque Corporis torreat quotidie & exacuat, fit major in Dies majorque Humorum Acrimonia, inde Bilis acerrima: hinc Cholera, hinc Tormina sævissima, hinc putridæ Febres—Quid igitur? diluendus est affatim Sanguis, demulcenda quoquè perpetim hujus Acrimonia. “Faciám utique, aſt quò
“bibitur plus, eò ſudatur amplius.” En & hujus Mali Remedium sine vel Medicinæ Tædio; admisce modo Vini rubri generosi aliquid Potioni dilutæ, mirabere sanè expertus tantilli tantos esse Effectus; constringit nempe Vascula; Cutis coarctat Meatus, & confirmat Humores: Epoto tantum uno, alterove Vini rubri Gallici, aut Portugallici Cyatho, vidi multoties profusos ex templo sedatos Sudores, etiam in ipsis Febribus colliquantibus.—Cave tamen, Cane pejus & Angue, Infusum *Theæ*, calidosque Liquores: nèc verùm interea, dum Corpus æstuat, perfrigidi Poculi Pœnas lue.

Plena Luna 15°. AUGUSTO. Nova Luna 29°.

Sicca fuit satis & calida, imò nonnumquam fervida, Tempestas hoc Mense, unde Messis lætissima ac foecunda valdè, nec tamen defuit tempestiva Pluvia, quæ Solum, exustum prorsus, recreavit maximè, ita ut sub Finem *Augusti* renovata quasi viridisquè videretur Facies Agrorum.

Ventus fuit varius, sæpiùs è Septentrione, quì Cælum semper sudum & plerumque calidum fecit.

Pluvia 2. 5. 6. 7. 13. ^{II} 19. ^{II} 20. ^{III} 21. 22. 25.
^{II} Dig. Dec.
 26. = 2. 140.

Immensæ interdum Rorationes. Eruce & Cicadæ innumeræ.

8 Altitud. maxim. 16. 30. 0. N E 1. } media 29. $6\frac{26}{28}$
 ——— minim. 21. 29. 2. S S V V 1. }
 Dies frigid. 25. 36. E S E 2. } media 27. $\frac{26}{28}$
 — fervid. 10. 20. N 1. }

Variolæ adhuc maximè *epidemicæ*, jamque multò peiores, Maculis lividis scilicet haud rarò stipatæ. Febres putridæ, perlongæ (*Mesentericæ* forsan) plurimæ inter Popellum atque Nautas præcipuæ; quædam vero valdè *phreneticæ*, hæ autem multò citiùs jugulant. His tumidus est plerumque Venter & astrictus; retenta ideò in Visceribus biliosa Colluvie, lenibus Purgantibus commodissimè fugantur; parùm certè profunt Sudores, minimè verò præmaturæ, & ipso Morbi Initio erumpentes, qui certissimè ferè supprimunt Urinam & Alvum, obrepente mox *Phrenitide*. Mirum est utiquè quàm multum atræ

Bilis

Bilis * ἀνω καὶ κάτω ejicitur sæpe. Sub Finem Mensis Angina (plerumque mucosa) frequens admodum, Dentium quoque Dolor Fauciumque Tumores multis infesti sunt. Cholera & *Dysenteria* grassatur plurimum; idque semper ferè accidit post Æstates præcalidas, non solum ob Bilem adustam acresque factos Corporis Succos, sed adventante subito autumnali Frigore patula Cutis nimium citò occluditur, unde quod perspirandum erat ad interiora ruit.

Plena Luna 14^o. SEPTEMBRI. Nova Luna 28^o.

Quanquam & calida fuit *Atmosfera* & sicca Mensis Initio, pluvius tamen & procellosus Austro, septimo adveniens Die, mutavit prorsus Aeris Temperiem; vicesimo tepida valdè & pulchra Tempestas recurrit, flante plerumque ab Oriente Vento, Ros interim perplurimus; ad Finem Austro iterum Pluviaque.

Cicadæ adhuc infinitæ inter Herbas, jam virides, lætissimè garriunt.

Pluvia 4. ^{III} 7. ^{II} 8. 9. 10. ^I 14. 15. — 18. 28. ^{II} 27.
Dig. Dec.
28. 30. = 2. 756.

Procella 7. prima Luce SSE 4. — 13. E 4. : maxima Procella apud *Londinum* & Oras *Angliæ* boreales * 8. Die.

Fulgura 24. Vesperi. AB. magna ad multam Noctem durans 21. N E 1. — 27. H. 9. p. m.
8 Alci-

* Η μέλαινα χολή τῆ φθινοπώρου πλείνη τῇ ἰσχυροτάτῃ ἐστίν. Hippocrat. de Natur. Hominis, Sect. 25.

8 Altitud. maxim. 21. 30. 1. N E 1. }
 ——— minim. x8. 28. 5. S b E 3x. } media 29. 5 $\frac{14}{26}$
 Dies frigid. 30. 41. N VV 1. }
 — calid. 23. 26. E S E 1. } media 32 $\frac{2}{26}$

Variolæ usque grassantur. Febres *Synochæ*; necnon intermittentes quædam *anomalæ*, quæ verò Typum multò magis regularem servant post leniorem Alvi Fluxum, sive Arte, sive Sponte productum: Vomitu repetito sæpe eliduntur penitus.

Perplurimi Tumore Faucium Dentiumque Dolore & Aurium vexantur; crebrò inde in Meatu Auriculari Abscessus: Aliqui Angina gravi corripuntur.

Diarrhœa & *Colica* frequens, quibus Medela facilis ex *Rhabarbaro Catharsis* & repetita, fortior utiquè dira Tormina plerumque movebat.

Plena Luna 13°. OCTOBRI. *Nova Luna* 28°.

Haud parca cadente Pluvia per *Octobris Initia* Atmosphæra facta est longè humidior, atqui nono ortus ab Oriente Ventus ad decimum octavum duravit, Cœlumque fecit apricum plerumque ac ficcum; inde Libs, mox Vulturnus, multam demisit Pluviam.

Pluvia $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{11}{5}$ 6. 7. 9. 13. 15. 19. 20.
 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1111}{25}$ $\frac{1111}{28}$ Dig. Dec.
 21. 22. 24. 25. 26. 28. 30. = 3. 498.

Procella 21. Nocte S w 4x. — 25. Noctu S E b S 4x.

8 Altitud. maxim. 14. 30. 2. ENE 1. }
 ——— minim. 21. 29. 0. SVV 4x. } media 29. 5 $\frac{3}{31}$

Dies

Dies frigid. 18. 50. E b N 1. }
 — tepid. 7. 36. S VV 2. } media $43\frac{16}{31}$

Variolæ passim: multæ Febres putridæ, ac *Catarrhales*; Fluxiones porro & Tumores Fau-
 cium levi quasi cum Angina frequentes, sæpiùs
 omninò sine Febre. Multi *Asthmate* premuntur.
 Pustulata Febricula (*the Chicken and Pigs or Swine's*
Pox) plures Infantes ac Puerulos corripit; sæpe
 abeuntibus Vesiculis Stigmata relinquuntur quasi à
Variolis; quod quidem haud parvam denotat
 Humoris Acrimoniam, adeòque postulat pur-
 gantia idonea atque demulcentia.—Turpiter per-
 sæpe falluntur Anniculæ dum hujusmodi Stigmata
 pro veris *Variolarum* Vestigiis jactitant.—*Vario-*
læ quippe & Mora, & Maturationis Modo, ab
 his longè diversæ sunt—abeunt nempe *Rubeoli*
 tertio, vel quarto, *Variolæ* autem non nisi, licèt
 quam citissimè, post Diem octavum.

Plena Luna 11°. NOVEMBRI. *Nova Luna* 27°.

Eurus Initio, Aquilo sub Finem prævaluit,
 Boreas interdum, sæpiùs tamen Libs & Auster
 pluviosus; Aer fuit plerumque crassus valdè ac
 tepidus, ad Finem autem rigidum Gelu invasit.

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|----------------|------------------|-----------------|---------|
| | $\frac{1}{1}$ | $\frac{III}{6}$ | $\frac{III}{7}$ | $\frac{1}{8}$ | | $\frac{1}{16}$ | $\frac{III}{17}$ | $\frac{II}{18}$ | |
| Pluvia | 1. | 6. | 7. | 8. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. 21. |
| | $\frac{II}{22}$ | $\frac{1}{23}$ | $\frac{1}{24}$ | $\frac{II}{25}$ | | Dig. Dec. | | | |
| | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | = 4. 024. | | | |

Grando 23. Procella 19. p. m. S w 4°. —
 gravis 25. Nocte S w 4°.

Pulgur & Tonitru ad mediam Noctem ab H.
 8. p. m. 6°. S w 2.

| | | | | | | |
|---|-----------------|-----|-----|------------|----------------------------|------------------------------|
| 8 | Altitud. maxim. | 14. | 30. | 4. | E N E 1. | } media 29. $8\frac{16}{33}$ |
| — | — minim. | 23. | 29. | 2. | S VV b VV 3. | |
| | Dies frigid. | 30. | 66. | N E 1. | } media 52. $\frac{4}{30}$ | |
| — | tepid. | 6. | 41. | VV S VV 2. | | |

Variolæ sparsim—Jam ingruunt *Morbilli*, ut plurimum quidem benigni: Febre pustulosa, & *Rubeolis* Pueri perplurimi corripuntur—Videtur adeò jam inesse Sanguini *Diatheſis* quædam peculiaris ad Exanthemata gignenda, quod sæpe sanè notatur; *Variolis* nempe, *Morbillis*, *Papulis*, & omnium Generum Pustulis, unà grassantibus—Fortè acris & biliosa Colluvies, quæ Mense *Julio*, *Augusto*, & *Septembri* Intestina torquebat, nunc tendit ad Cutim—Anne deducenda hinc est Indicatio curandi per Sudores, Vesiccantia, &c. in Febribus per talem Constitutionem sævientibus?

Febres lentæ nervosæ sparguntur, item *Peripneumoniæ* nothæ. *Asthma*, *Angina*, *Rheumatismus* frequens.

Tusses & Destillationes permultos laceſſunt cum Tumoribus Faucium, Dentiumque Doloribus, sæpe admodum acerbis.

Plena Luna 11°. DECEMBRI. Nova Luna 26°

Ineunte Mense Aer erat crassus valdè, humidus ac subtepidus, post octavum verò multò frigidior, ad Finem frigidissimus: Boreas perflavit sæpiſſimè, Vulturnus frequenter, præsertim Mensis Initio, Auster interdum. Maxima fuit *Atmosphæræ* Mutatio Die ultimo, Mane nimirum omnia rigidissimo constricta Gelu, Vesperi Pluvia

1742) & Morbis Epidemicis. 77
 via perpetua Thermometro à Gr. 80. ad 65. ascen-
 dente, irruente Vulturno.

Pluvia 1. 5. 6. $\frac{1}{8}$. 9. 10. 15. 17. — 19. 20.
 Dig. Dec.
 21. $\frac{1}{31}$. Nix 25. 29. Grando 9. = 1.070.
 Nivis plurimùm erat difflatum.

8 Altitud. maxim. 1. 30. 2. E b S 1. } media 29. $7\frac{16}{30}$
 ——— minim. 9. 29. 4. VV N VV ux. }
 Dies frigidissim. 31. 80. Mane E N E 1x. } media 63
 ——— tepid. 7. 50. S S E 2x. }

Etiamnum Variolæ; Morbilli frequentes; An-
 ginæ, Pleuritides, Peripneumoniæ, & veræ & spu-
 riæ, plurimæ: Rheumatismi atque Asthmatis Pa-
 roxysmi vehementes multos corripunt. Coryzæ,
 Destillationes, Tusse, Dentium Dolores Fau-
 ciumque, Colli, ac Capitis Tumores permul-
 tos affigunt undique.

Tota Pluviæ Quantitas Anno MDCCXLI. fuit
 Dig. Dec.
 = 20. 354.

Plena Luna 9°. JANUARIO. Nova Luna 25°.

Ipsò Anni Principio horrida Tempestas, Pro-
 cella, Pluvia, Grando, Fulgura, Tonitru; nec
 multò lætior fuit totus hic Mensis, quippe nim-
 bosus admodum & squalidus: à xiii. ad xx. per-
 petua ferè Procella, Aer interim humidissimus
 ac valdè nebulosus; tunc Euris paululùm dis-
 pulit Nubes; mox autem Libs turbidus recur-
 rit; ipso Januarii Exitu Corus: à septimò ad
 decimum acre Gelu.

Plu.

Pluvia $\frac{11}{1}$ $\frac{11}{2}$ $\frac{11}{3}$ $\frac{11}{4}$ $\frac{11}{5}$ $\frac{11}{6}$ $\frac{11}{7}$ $\frac{11}{8}$ $\frac{11}{9}$ $\frac{11}{10}$ $\frac{11}{11}$ $\frac{11}{12}$ $\frac{11}{13}$ $\frac{11}{14}$ $\frac{11}{15}$
 $\frac{1}{16}$ 18. — 20. 24. — 27. $\frac{11}{28}$ 29. 30. Grando 1.
 Dig. Dec.
 2. 17. Nix 7. p. m. E N E 2^x. — 3. 520.

Procella 1. S w 4. — 2. primo Mane w S w
 4^x. — gravis tota Nocte 13. S w 4^x. — 14. a. m.
 S w 4. — 15. w b S 4^x. — 16. S w 4. — 19. S
 w 4. — 28. S w 4.

Mirror *Barometri* Altitudinem tantis furentibus
 Procellis.

8 Altitud. maxim. 22. 30. 2. E 1. } media 29. $6\frac{2}{3}$
 ——— minim. 14. 28. 8. S VV 4. }
 Dies frigid. 10. 74. N N E 1^x. } media 57 $\frac{29}{30}$
 — tepid. 19. 50. S VV 4. }

Variolæ frequentes, *Morbilli* epidemici: Pleuritis
 tides, *Peripneumoniæ*, *Anginæ*, permultæ; *Ar-*
thritide & *Rheumatismo* plurimi plectuntur.

Sub Finem *Morbillorum* sæpiùs accedit sævis-
 sima Tussis atque *Peripneumonia*, quæ Morbum
 haud parùm fatalem reddit: quamprimùm hæc
 invadit Sanguis est protinùs mittendus, qui ple-
 rumque est viscidus admodùm & tenax: idque
 ferè notatur in omnibus Febre acuta, hæc Tem-
 pestate, laborantibus; utiquè haud boni est O-
 minis, si fluidus sit & floridus nimiùm, quod
 anginosus accidit interdum & peripneumoniosis,
 atque utplurimùm pessimè significat.

Plena Luna 8^o. FEBRUARIO. Nova Luna 23^o.

Quamquam per Initia Mensis blanda fuit satis Tempestas, advolans tamen octavo Boreas, Aerem fecit multò frigidiorē; post xiii. Ventus varius, xx^o autem Boreas recurrit cum aspero Gelu ad Finem ferè perdurans. Aer fuit perficus & valdè frigidus; Barometri Statio præalta.

Pluvia 3. 4. 6. 12. 13. 15. 17. 18. 19. Nix
Dig. Dec.
11. 18. 22. 23. 24. Grando 21. 22. = 1. 200.
AB. 20. N. 1. Procella 6. Nocte w S w 4^r.

Altitud. maxim. 27. 30. 4. E N E 2. } media 29. 9¹²/₂₆
— minim. 19. 29. 4. S VV 2. }
Dies frigid. 28. 68. E N E 2. } media 61¹⁴/₂₆
— tepid. 1. 54. VV 1. }

Morbilli epidemici, Variolæ passim. Rheumatismus, & Pleuropneumoniæ multos corripunt, Tussis ac Tonsillarum Tumores plurimos: Sæva Arthritis, & Asthma grave frequens admodum. Diu spirante Vento à Plagis orientalibus* Astmatici semper pessimè se habent; imò novi plures, qui, etsi Lectulo inclusi, talem Ventum mox adventantem præsentunt, atque prædicunt.

Tabifica Tussis, & fœda Scabies plurimos Equos consumit, ac jugulat.

Ple-

* Vid. Not. F. 1728. Vol. I. de Aere & Morbis Epidem.

Plena Luna 10°. *MARTIO*. *Nova Luna* 25°.

Siccus maximè & frigidus fuit totus hic Mensis: Aer tenuissimus, vix Imberculus aliquis, Nix nulla, perpetuus spiravit ab Oriente Ventus ad Septentrionem plerumque vergens, hinc acresæpe Gelu maximæque Pruinæ; minimi verò Maris Æstus, at alta semper *Mercurii* Statio—Sub Finem Martii graves ruebant Imbres ad Orientem, hic nulli.

Dig. Dec.

Pluviola 26. 27. = 0. 016.

Levis *AB*. 5. Vesperis N N w 1. — maxima 15. H. 9. N b E 1. — 16. H. 10. N b E 1. — 24. H. 8. p. m. E N E 1x.

Zona Lucida subflava, ad Modum Iridis quasi, à N E ad S w extensa, transiens porrò per ipsum Lunæ Corpus Die 6. H. 9. p. m. N b E 1.

| | | | | |
|---|----------------|------------|-----------|---|
| 8 | Altitud. maxim | 4. 30. 5. | N E 1. | } media 30. 0 ¹⁸ / ₂₉ |
| | minim. | 21. 29. 8. | E S E 1. | |
| | Dies frigid. | 1. 68. | N E 2. | } media 57 ²⁷ / ₂₉ |
| | — tepid. | 31. 51. | N b VV 1. | |

Sparsæ Variolæ, *Morbilli Epidemici*, haud raro lethales: jam & Pectoris & Pulmonum Morbi sæviunt admodum; Pulsus est multum incitatus & valdè durus, Spiritus difficilis, & inter tusiendum acutissimus Dolor, Sputa densa, tenacia, rarò Sanguine tincta—Sanguinis Missio, & Potio diluta, subtepida, liberalis, sola ferè fuisse Remedia, Nitro plurimo adjecto.

Tusses, *Catarrhi*, Dentium Dolores ac Fau-
cium, omnes ferè infestant: Angina verò & *Rheumatismi* plures: Asthma pertinax & grave haud

pau-

742). & Morbis Epidemicis. 81
 paucos premit; Longi & sævi Arthritidis Pa-
 roxysmi.

Omnis penè Equi, nisi Stabulis bene curan-
 tur, Scabie ac purulenta Tussi vexati tabescunt;
 plurimi pereunt.

Plena Luna 8°. APRILI. Nova Luna 23°.

Ineunte Aprilē tempeſtiva Pluvia ſitientes A-
 gros rigavit, paulòque poſt grata Tellus lætam
 Herbam & Flores innumeros protulit, quos fo-
 vebat in Dies Ros uberrimus; his tamen inſenſa
 eſt maximè infinita Quantitas Erucarum omni-
 genarum. Poſt undecimum Ventus, inter Orien-
 tem & Septentrionem ferè perpetuus, ſicciffimam
 & tenuiffimam reddidit Atmospheram.

Pluvia $\frac{1}{5}$. $\frac{11}{6}$. 7. 8. $\frac{1}{11}$. 12. $\frac{11}{22}$. Grando 6.
 Dig. Dec.
 11. = 1. 152.

8 Altitud. maxim. 1. 30. 4. N b VV 1. } media 29. $8\frac{11}{16}$
 ——— minim. 7. 29. 0. N VV 2. }
 Dies frigid. 7. 57. } media 46 $\frac{23}{26}$
 — tepid. 23. 38. E. 1. }

Variolæ plures uſque, Morbilli epidemici; &
 sæpe funeſti. Rheumatismus, Angina, Pleuri-
 tides * Peripneumonix frequentes; Ophthalmix
 crebræ — Sanguis Febricitantium emiſſus jam
 ferè ſemper eſt viſcidus admodum. Tuſſes
 graves, Raucedines, Tonsillarum ac Maxillarum
 Tumores perplures affliſcant. Tempeſtas eſt ta-
 * G bidis

* Vid. *Essay on Fevers*. P. 210.

bidis prorsus infensissima: Febres tertianæ aliquæ * & *Hemitritææ*.

Febris putrida contagiosa, ac pestifera valdè, cum ingente Virium Damno, maxima Præcordiorum Oppressione, Tremore Tendinumque Subsultu, Vigiliis, Delirio, Lingua nigra & sæpe arida valdè, Faucibus squallidis, & Halitu foetidissimo, jam apud *Launceston* ejusque Viciniam favit admodum, estque profectò funesta maximè — Pulsus vacillat plurimum mox ab Initio Morbi, idque vel in Robustis: Urina est plerumque lurida, & vapida quasi, sæpe subnigra & olida, rarissimè aliquid inest Sedimenti, interdum verò continet furfurosa quædam inæqualiter sparsa: haud rarò Statu Febris erumpunt atræ *Petechiæ*, sæpe Papulæ, aut Pustulæ livescentes cum oleoso Sudore ac valdè graveolente: Nihil fuit lætiùs quàm floridæ Pustulæ in ipsa Morbi *Ἀρχῇ*, Nihil funestum magis lividis & subnigris; meræ Maculæ nunquam non aliquid Mali denotabant. Alvus nigra, foetida maximè, & citissima, plures sub Finem abripuit: Aliqui Phrenitide post Per-vigiliū correpti sunt, plures quasi Væterno, idque sæpe vel ipso Morbi Initio; si insciis his oborta est Alvi Dejectio certissima sequuta Mors est, Biduo vix exacto.

Genita hæc in Carceribus Febris, & per Comitia provincialia disseminata longè latèque, Plurimos Letho dedit, optimaque sæpe elusit Consilia — Certè qui fuere Sanguinis prodigi nimis Ægrum utique, non Morbum, jugulabant; per-rarò enim secundam Sanguinis Missionem toleravit, si modò ullam.

Tres

* *Vip. Essay on Fevers, p. 21.*

Tres tantùm hac Febre laborantes vidi, utpotè tunc haud prospera Valetudine gaudens, brevi Domum petere cogebar: Sedulò autem Pharmacopolas atque Chirurgos de Morbo percontans didici Sanguinem ab Ægrotantibus detractum primò fuisse rutilum satis & valdè fluidum, altera tamen Vice missum lividum semper aut nigrum—Hoc ego ipse profectò notavi, imò vix concretum aliquid in Sanguine cujusdam Generosi, etsi diù antè extracto: desideratus hic & à suis, & ab omnibus, Die decimo tertio interiit stupidus, delirus, purpureis Maculis & lividis Pustulis aspersus.

Cui ignota sunt Comitia Oxoniensia 1577. atque nupera apud Taunton Anno 1730. ubi pestifera Mephitis tot tantisque Viris mox fuit Exitio?—Perfrequens est utiquè Generatio Febris pestilentis in angustiis immundisque Carceribus, etiam ipse Aer conclusus in Fodinis, Speluncis, Puteis, tandem evadit exitialis admodum; idque longè citiùs si accedunt quoquè plurimà Animalium *Effluvia*, quæ & ipsa porrò magis magisque in Horas virulenta fiunt, brevique pestifera maximè*.—*Atmosfera* stagnans, Frequentia Hominum polluta, mox valdè rancet & ad Respirationem inepta est prorsus: imò Aquæ dulcis Balneum Sorde cutanea foedatum putrescit atque putet brevissimè.—Nec mirum est hoc utiquè, quandoquidem à quolibet adulto Homine Unciæ quadraginta ferè rancidi Vaporis quotidie exhalant.

* Mirabilis sanè est Historia apud *Lancisium* (Lib. 1. Cap. 6. de repentinis Mortibus) cujusdam Juvenis, protinus extincti, dum effoderet Quercum antiquam, cujus in Caverna magna prægrandis Serpens latitabat.

Ociùs hæc eveniunt omnia accedente Calore, quò magis enim Sales Oleaque Animalia attenuantur, & exagitantur Tepore, eò magis ad Putredinem vergunt—Putrescentium autem Animalium Corpora, maximè Hominum, plùs semper minùsve noxiùm Contagium dispergunt; magnas ideò post Strages, putrescentibus nempe Cadaveribus, Febres pestilentes sæpiùs grassantur.—Carnis putrefactæ Fœtor nobis est planè intollerabilis, monente scilicet Natura, ut hunc quàm maximè vitemus—Profectò cum valdè putridum expurgant Odorem Ægrotantium Corpora à Contagione summoperè cavendum est, nam noxia admodùm spargunt *Miasmata*: id in *Variolarum* Maturatione præcipuè notatur, tunc enim maximè fœtent, & longè longèque magis sunt contagiosæ quàm per Initia Morbi, ut omnibus notum est.

Purgandus est ergo frequenter, atque ventilandus, corruptus Carcerum, Navigiorum, ac *Nosocomiorum* Aer, ubi plurimi congesti sunt Homines, ne longiore Mora fiat pestiferus—imò, & si sit aliquatenùs pollutus Fumis idoneis corrigendus est, quos inter utilissimus est Aceti & Camphoræ Vapor.

Commodissima porrò erit hæc Aeris Purgatio in Ædibus privatis, ubi ægroti decumbunt, * apertis scilicet subinde Fenestris, accensis Focis, &c. indè namque non tantùm illi, sed & ministrantes, puriorem respirabunt Auram.—Mementi equidem haud rarò me fuisse Gravitate Capitis, Nausea, Languore valdè affectum, dum per duas, tresve Horas Febre maligna laborantes

visi-

* Vid. *Essay on Fevers*, P. 162.

visitasset, mox verò resectum prorsus obambulando in Aere aprico, aut equitando. Si hoc non datur acre Acetum; Camphora imbutum, olfacito subinde, atque expue sæpissimè Salivam.

Plena Luna 8°. MAIO. Nova Luna 23°.

Per *Maii Initia* Eurus perflavit, isque fortis admodum, à xvi. autem ad xxiv. Libs pluviosus *Atmosphæram* humectabat plurimum, quæ fuerat antè siccissima. Non tantum Agros irrigando gratissimæ fuerunt hæ Pluviæ, sed & insuper Erucas perimendo; grassabatur enim plurimum tunc Temporis ista Pestis Herbarum. Porro maximum impendebat Segeti Nocumentum à novo quodum Genere Erucarum nigrarum (erant autem robustæ & prælargæ) hæ Agmine vasto à Montibus, Torrentis ad Instar, ruente totos devastabant Agros. Amœnissimus planè ac insolitus est Telluris Ornatus, Flores infiniti!

Pluvia $\frac{11}{6}$. $\frac{111}{7}$. 15. 16. $\frac{1}{17}$. 18. $\frac{1}{19}$. $\frac{111}{20}$. 21. —
Dig. Dec.

24. 30. = 2. 364.

Procella 4. E b S 4. — 5. E S E 4. — 6. Mane E S E 4^r. Halo quam maximus circa Lunam 5. H. 9. p. m. E S E 4.

8 Altitud. maxim. 1. 30. 2. E b S 2. } media 29. $6\frac{26}{30}$
— minim. 21. 29. 4. S VV 3. }
Dies frigid. 5. 48. }
— tepid. 24. 32. S S VV. 2x. } media $38\frac{17}{30}$

Morbilli valdè epidemici; *Variolæ*, & *Peripneumonix* frequentes: *Tussis* & *Asthma* per plurimos infestant; multi tabidi moriuntur; multi

Hydrope laborant. Febris quædam Catarrhalis & Rheumatica passim proserpit, in qua Lingua subatra est aut fusca & valdè squalida, Ora apthosa, Halitus teter, Urina lurida, Pulsus celer, mollis, submissus, crebrò etiam *Petechiæ* lividæ, Tussis parva est, at magna Præcordiorum Oppressio — Mihi quidem videtur Species quædam Peripneumonix nuper malignè grassantis.

Plena Luna 7^o. JUNIO. Nova Luna 21^o.

Ne vel Guttula Pluvix decidit Diem ad usque vicesimum Junii, Aer interim fuit maximè siccus & calidus, Ventus Orientem inter & Arctum; post autem Auster haud parùm Pluvix demittebat.

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----|----------|------------|-----------|-----|-----------|-----------|
| | <u>11</u> | | <u>1</u> | <u>111</u> | <u>11</u> | | <u>11</u> | <u>11</u> |
| Pluvia | 20. | 21. | 22. | 23. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| Dig. Dec. | | | | | | | | |

30. = 2.020.

Permagnus Halo circa Lunam 3. H. 10. p. m. N N E 2. Fulgur & Tonitru 25. Vesperi.

| | |
|--|---|
| ♂ Altitud. maxim. 4. 30. 1. N E 2x.
——— minim. 26. 29. 3. S VV b S 1. | } media 29. 6 ¹⁶ / ₃₀ |
| Dies frigid. 3. 32. N N E 2.
— fervid. 13. 17. N 1x. | } media 25. |

Morbilli sunt valdè epidemici, & sæpe funesti, Tussi admodùm violenta consequente, ac Febre quasi peripneumonica, quæ plurimos jugulat Infantes. Ubi Cuticula aspera fit valdè & Furfure velut aspersa quarto, vel quinto ab Eruptione Die, fausti est Ominis; è contrà ubi Maculæ & Papulæ lividæ sunt, aut lividæ, malum omnino. — Febris putrida passim sæpe cum Pustulis rubris ardentibus, sæpe cum permagnis *Petechiis*.

Angi-

Anginæ, Pleuritides, Peripneumonix, magis
 jam quàm solent frequentes hoc Anni Tempore
 — Ophthalmix plures porrò, & Tumores Capitis
erysipelatosi. — Tussis vehemens *convulsiva*, non
 solum Pueros sed & Adultos etiam sæpe invadit,
 præcipuè ad Mensis Finem — Multi Canes rabidi
 discurrent.

Plena Luna 6°. JULIO. Nova Luna 20°.

Ad Diem vicesimum quintum Julii Tempe-
 stas rigida, atque plerumque pluviosa, Vento
 ferè quotidie variante, Cauro nunc flante, nunc
 Africo; Aer fuit interim crassus ac multò hu-
 midior.

Pluvia $\frac{11}{1}$. 2. 3. $\frac{11}{5}$. 7. 9. 10. — 13. $\frac{1}{17}$. $\frac{1}{18}$. 19.

Dig. Dec.

— 21. $\frac{11}{23}$. 24. 25. = 2. 106.

Altitud. maxim. 27. 30. 1. E N E 1. } media 29. $5\frac{17}{30}$
 ——— minim. 19. 29. 2. S V V b S 2. }
 Dies frigid. 26. 38. N V V 2. } media 31 $\frac{16}{30}$
 — calid. 31. 22. E 12. }

Iidem ferè grassantur Morbi, Tusses tamen
 sunt vehementiores, haud rarò Sanguinem exan-
 tiant. Haud pauci jam Ictero & Hydropes labo-
 rant: per siccas valdè & calidas Tempestates bi-
 liosum Sanguinis Principium augetur, mobilissi-
 ma dissipantur, restant crassiora; hinc Obstru-
 ctio & Icterus, hinc Hydrops, ruptis nimirum
 Vasis *Lymphaticis*; adeoque *Ascites* sæpe conse-
 quitur Morbos arquatos.

Sub Finem hujus Mensis Conjux mea dile-
 ctissima occidit hydropica, lugentibus Amicis

Vicinis, Bonis omnibus: Mulier sanè pia, prudens, venusta! — Erat illa quadragenaria, gracilis, agilis, temperans maximè; atqui paulò infirma, heu & hydropica Stirpe nata! nunquam verò antehac vel levissima habuit Signa Hydro-
 pis; nisi quòd, undecim circiter abhinc Menses, dum Curru agitata velociùs per octo, decemve Milliaria Domum peteret, intumere Crura Pedesque plurimùm — Hujus autem brevissima Mora, nam postridiè evanuit omninò Tumor — Vere tamen elapso, post acerbum Colicum Dolorem, icterico Colore fœdata elanguit, emacuit, perparcam reddidit Urinam, eamque crassam ac fulvam maximè, imò vel subatram — Tandem Tumor aquosus Pedes, Crura, etiamque Abdomen invasit. Mox Ruri se recipiebat, equitabat quotidie, *Emeticis*, *Catharticis*, *Diureticis*, *Saponaceis*, *Deobstruentibus*, *Chalybeatis*, breviter optima & idonea Medicina (quippe duos, tresve Medicos perdoctos consultabam) utebatur diligentissimè — Multò hinc melius quod ad omnia ferè se habebat, ni quòd Urinam parcam valdè, turbidam & subnigram redderet usque. At per breves hæ Induciæ! paulò enim pòst recrudescabant Mala, adeò ut sub Finem *Maii* redirent & Icterus & Ventris Crurumque Tumor: augebatur porrò *Ascites* indiès, in tantum utiquè ut Medio *Junio* decumbentem penè suffocaret Mòles Aquarum, sursùm nempè compulso Septo transverso — Protinùs ideò ad *Paracenthesim* confugimus, quam firmo admodùm Animo perfert: detractus est Seri subviridis, ad Ignem concretis Congius quasi cum Dimidio — Post duos, tresve Dies se mirè resectam percipit, imò redit brevì & Stomachi & Corporis Vigor. Rus pe-
 tit

1742)

¶ *Morbis Epidemicis.*

89

tit iterum, equitat alacriter, evanescit Cutis Flavido, vividi sunt oculi, Spiritus facilis. — Lætissima jam mihi Spes Salutis effulsit; sed enim quàm vana, nam vix tribus exactis Hebdomadis increvit rursus Abdominis Tumor ad Molem enormem: iterum ergo emissæ sunt Aquæ ad eandem ferè Quantitatem, sed ichorosæ, sed foetidæ, sed sanguinolentæ minimèque ad Flammam coagulantes — Perstabat ex Foramine Trochare factò, Fluxus prælargus Humoris subalbidi, purulenti, olidi, quo consumpta peribat optima Matrona Die Julii 27°. — Sed quò me rapit dulcissimæ Uxoris Amor? — Ast! *Quis Desiderio sit Tudor aut Modus tam cari Capitis?*

Ὀλύμπια Δάματα ναίει — persequar ad Astra.

Nova Luna 5°. AUGUSTO. Plena Luna 19°.

Per totum hunc Mensem lætissima Tempestas, prospera Messis, optimùm Frumentum; Aer fuit siccus admodum ac purissimus: Ventus plerumque ab Oriente venit, sæpe haud parùm calidus: maxima subinde Roratio.

Innumerabiles Vespæ, Cicadæ, Erucæ: Multi Canes rabiosi.

Dig. Dec.

Pluvia 16. ¹¹17. 26. 27. = 0. 434.

8 Altitud. maxim. 9. 30. 1. E b N 1. } media 29. $7\frac{25}{31}$
 ——— minim. 16. 29. 5. S 2x. }
 Dies frigid. 19. 34. E 2x. } media 26. $\frac{22}{31}$
 — fervid. 3. 18. E 1. }

Morbilli adhuc Epidemici, Variolæ passim, Cholera frequens: Febres quædam intermittentes,

tes, quotidianæ ut plurimum; perpauci aliter Morbi.

Plena Luna 30. SEPTEMBRI. Nova Luna 17.

Hic quoque Mensis fuit plerumque siccus, sed pro Anni Tempore valdè frigidus, imò duodecimo Mane Glacies super plurima Stagna, atque Pruina maxima per Agros, Ventus ab Occidente sæpe vergens ad Austrum, sæpius tamen ad Septentrionem; à xvi. ad Finem Orientem inter & Septentrionem perflavit. Ob magnam Siccitatem omnes ferè Fontes arescunt: maximæ Rorationes sæpe ac Pruinæ.

Pluvia 2. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 14. 27. 28.
Dig. Dec.

29. = 1. 402.

8 Altitud. maxim. 18. 30. 0. E N E 1. } media 29. 6 $\frac{24}{30}$
— minim. 29. 29. 1. N 2x. }
Dies frigid. 12. 55. N b E 1x. } media 41 $\frac{1}{3}$
— tepid. 1. 29. S V V 2. }

Cholera, Ophthalmia, Variolæ, necnon Febres putridæ passim; Juniores Vermibus infestantur maximè.

Febriculæ quædam levi cum Angina quasi, Tussi, Dolore Dentium Fauciumque Tumore frequentes valdè; ex facili leni Sudore discutitur, aut breviter mitiore Cathartico fugatur. Haud Dubio repentinum Autumnii Frigus fuit in Causa hujus Febriculæ, imminuta scilicet plurimum Perspiratione Sanctioriana.

Morbilli epidemici, ac sæpe lethales, vehementissima Tussis ut plurimum comitatur, unde
haud

haud rarò Peripneumonia suffocans sub Finem, interdum spumofum atque sincerum Sanguinem expuunt; hinc frequenter nimis cita Mors aut certa *Phthisis*.—*Diarrhœa* mucosa, perliquida, enormis *Morbillos* sæpe subsequitur; inde Abdomen durum & maximè tensum, at reliqui Corporis summa Macies, tandemque Tabes funesta; idque semper ferè si atra dejiciuntur & valdè foetida.

Optimum & Tussis & Peripneumonix Remedium est opportuna Sanguinis Missio, ducta mox leni Clystere Alvo, imò blandè purgata; *Diacodio* intereà licet compescere Tussis Sævitiā, acremque avertere Distillationem admoto inter Scapulas *Epispastico*; *Dietam* verò diluentem, mollem, omni Carne vacuum instituere oportet. Sive derepentè recedunt pustulosæ Maculæ, sive lividæ aut plumbeæ quasi evadunt, mox oritur summa Præcordiorum Oppressio, Anxiety, Delirium, &c.; tali in Casu Linteis, aut Pannis calidis protinùs, confricandum est totum Corpus, porò ad *Cardiaca* idonea confugiendum est, quæ sunt *Lap. de Goa*, *Crocus Anglicus*, *Moschus*, *Camphora*, ex *Jalapio* temperato, aut *Vino tepido*; nec utiquè novi meliora, nedum tutiora ubi *Morbilli* evanescent, aut minùs vividi spectantur. Erumpentibus *Morbillis* ab Aere frigido madidæque Sudore Indusis summoperè cavendum est, his enim creberrimè reperiuntur *Eryanthemata*; neque intereà æstuoso in Aere continendus est Ager, nec Stragulis nimium onerandus, nam & Spirandi Difficultatem adaugent, & Sudores immodicos eliciunt, præcipuè in Adultis, quo nihil pejus—Faceffentibus porò *Morbillis* *Diarrhœa* ingruit sæpissimè: hinc summa opus est

Cau-

Cautela, nec sanè præproperè sistenda est; por-
rige subinde modicam *Rhabarbari Dosis* cum
Nuce Moschata tosta, Decoct. C. C. C. C. — *Oryzæ*
— *Fracastorii*; & *Misturam* absorbentem aliquam
ex *Corall. rubr. lævig.* *Bolo Armena* & *Aq.*
Cinnam. tenui confectam exhiberi jubeo.

Plena Luna 3^o. OCTOBRI. *Nova Luna* 17^o.

Magna jam incipit Cœli Mutatio, plurima
nempe ruente Pluvia, furente quoquè Procella;
& per Initia, atque Mensis Exitum: medio ta-
men Apricitas, Borea plerumque flante à xv. ad
xxii. *Atmosphæra* multò fit crassior ac humidior.

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----|-----|-----------------|-----|
| | $\frac{11}{2}$ | $\frac{1}{3}$ | 4. | $\frac{11}{5}$ | 6. | $\frac{11}{7}$ | $\frac{11}{8}$ | 9. | 10. | $\frac{11}{13}$ | 14. |
| Pluvia | | | | | | | | | | | |
| 16. | $\frac{2}{17}$ | 25. | $\frac{11}{26}$ | 27.—29. | $\frac{111}{30}$ | $\frac{111}{31}$ | | | | | |
| | | | | | | | Grando 3. | | | | |
| | | | | | | | Dig. Dec. | | | | |
| 27. | 31.—4. 960. | | | | | | | | | | |

Maximus Maris Æstus & Procella Vesperi 2;
w S w 4. Procella 3. primo Mane & a. m. N w
4. Nox procellosa 5. w S w 4^r. item 7. S S w 4^r.
— porrò 26. w N w 4. Procella cum Fulgure
27. primo Mane—29. Nocte S w b w 4. — 30. S
w b w 4. — 31. p. m. S S w 4. Glacies 20. 21. 29.

| | |
|---|-----------------------------|
| ☿ Altitud. maxim. 22. 30. 2. E N E 1x.
——— minim. 3. 28. 8. N V V 4. | } media 29. $6\frac{4}{31}$ |
| | |
| Dies frigid. 28. 29. N N V V 2.
— tepid. 10. 40. S V V 3. | } media 47 $\frac{12}{31}$ |

Rheumatismus & *Diarrhœa* frequens; *Dysente-*
riæ quædam; *Raucedines*, *Faucium Asperitates*
ac *Tumores* plurimos vexant. *Variolæ* passim
multæ adhuc, eæque sæpe malæ admodum In-
dolens,

1742)

& Morbis Epidemicis.

93

dolis, *Petechiis* scilicet lividis haud rarò comitantibus: imò ipsi *Morbilli* livescentes, jam multò plures jugulant quam *Variola*, præsertim Adultos qui universa quasi *Necrosi* pereunt anhelis, suffocati, stupidi prorsus. — Nil lætius evenit a-beuntibus *Morbillis*, quam rupta & aspera valdè *Cuticula*.

Plena Luna 1^o.

NOVEMBRI.

Plena Luna 30^o.Nova 16^o.

Pluviosus fuit admodum & frigidus hic Mensis, crebrò etiam nimbosus: incipiente *Novembri* Ventus ab Occidente venit, à decimo autem ad Finem usque ab Oriente, flectens plerumque ad Septentrionem, aliquando tamen interfuit *Vultur* — Aer per totum gelidus, caliginosus, humidus — *Barometri* Statio humilis.

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|-----|
| | ^{II} | ^I | ^{II} | ^I | ^I | ^{II} | ^I | | ^{III} | ^{III} | |
| Pluvia | I. | 2. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 11. | 13. | 20. |
| | ^I | | ^{II} | | ^{III} | | | | | | |
| | 21. | 22. | 23. | 25. | 26. | 29. | 30. | Grando vehemens | | | |
| | | | | | | | | Dig. Dec. | | | |

1. Nix 16. = 5. 267.

Procella 1. p. m. & insequente Nocte S w 4^o.———— 10. Nocte E 4^o. — 25. Nocte S E 4^o.— vehemens 30. primo Mane E S E 4^o.

Rigidum Gelu 15. 16. 29.

♂ Altitud. maxim. 28. 30. 0. NE 1. } media 29. 3¹⁴/₃₀

— minim. 23. 28. 7. E S E 3. }

Dies frigid. 29. 68. N N E 1.

— tepid. 1. 53. S VV 4^o.

Iidem usque dominantur Morbi, atqui Distillationes, *Coryzæ*, *Tusses*, *Rheumatismi* multò sunt severiores.

DECEM-

D E C E M B R I :

Sæpe Boreas, sæpe hoc Mense perflavit Vulturus, unde *Baroscopii* Statio fuit præalta, à xviii. ad xxii. intervenit Libs decedente Pluvia—nec tamen hoc detruxit *Mercurium*, altior quini. mò surrexit, adeò ut xxii. Gradum 30. 4. attigerit; quod quidem haud parùm mirabar, sed *Atmosphæra* erat crassissima, & Eurus mox prævalebat per Dies aliquot—Sub Finem tamen Libs recurrit. Acre sæpe Gelu incipiente Mense, à xii. ad xvii. asperrimum.

Pluvia 18. ¹¹19. 20. 23. 27. ¹¹28. 29. ¹31.
Dig. Dec.

Nix 3. 7. = 1. 342.

Ventus vehemens 14. 16. E N E 4^x. Procella 28. Mane S w 4^x. Circius furens 30. p. m.

♂ Altitud. maxim. 22. 30. 4. S S VV 1^x. } media 30. 0²/₃₁
— minim. 29. 29. 6. S VV 3^x. }
Dies frigid. 15. 76. E N E 2^x. }
— tepid. 31. 51. S VV 3^x. } media 63¹²/₃₁

Cita ac torminosa Alvus multos adhuc exercet, imò interdum etiam cruenta: *Asthma* grave plures premit—Tusses, Raucedines, Colli Tumores & levis Angina plurimos. *Variolæ* passim, *Rheumatismi* multi. *Peripneumoniæ* aliquæ; & Febres lentæ putridæ.

Tota Pluviæ Quantitas Anno MDCCXLII.
Dig. Dec.
= 25. 783.

Nova Luna 14^o. *JANUARIO*. *Plena Luna* 28^o.

Densa fuit admodum ac humida, toto ferè Mense, *Atmosphæra*, plerumque etiam frigida, *Barometri* Statio interdum præalta, a magna partim Aeris densitate. Ventus Initio ab Occidente spiravit, a nono autem ad decimum octavum ab Oriente, declinans ad Septentrionem, isque frigidus & glacialis; inde Libs multò tepidior.

Pluvia $\frac{11}{1}$. 2. — 4. $\frac{11}{5}$. 7. 8. 10. 19. 24. $\frac{11}{25}$.
Dig. Dec.
26. 28. 31. Grando 6. = 1. 5 12.

Magna *AB*. 12. H. 8. p. m. Nebula valdè foetida 22. Malacia. Procella 5. tota ferè Die
w S w 4. — 26. p. m. & per Noctem S w 4^x.

8 Altitud. maxim. 11. 30. 7. E N E 1. } media 29. $9\frac{20}{29}$
— — minim. 26. 29. 3. S V V 4^x. }
Dies frigid. 21. 69. N N E 1. } media $59\frac{22}{29}$
— tepid. 7. 52. S V V 3. }

Variolæ adhuc pæssim: *Rheumatismi*, *Pleuritides*, *Tusses* plurimæ; *Angina mucosa*, *Tumores Faucium Dentiumque Dolores* frequentes; *Febres* aliquæ lentæ — *Cervi* perplurimi pereunt undique.

Nova Luna 13^o. *FEBRUARIO*. *Plena Luna* 27^o.

Crassa perstat & humida *Atmosphære* Constitutio, est autem paulò tepidior, Ventus incertus valdè, variat ferè quotidie; Corus tamen prævaluit!

Pluvia

Pluvia $\frac{11}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{11}{1}$ $\frac{1}{1}$
 1. 2. 3. 4. 6. 9. 11. 13. 14. 15. 22.
 Dig. Dec.

23. 25. 27. = 1. 584.

Procella & Fulgura 3. p. m. S w b w 4.

Altitud. maxim. 8. 30. 2. N V V b V V 1. } media 29. $8\frac{1}{2}$
 ——— minim. 3. 29. 3.
 Dies frigid. 20. 64. N E 1. } media $54\frac{20}{28}$
 — repid. 9. 51. V V 1.

Febris *Catarrhalis* & *Variolæ* passim; Tussis innumeros infestat cum Tumore Faucium, Tonsillarum, & lævi sæpe Angina; Febres aliquæ tertianæ. Tempestas sanè est parùm morbosa; atqui plurimi etiam Seniores Lumbricis rotundis vexantur.

Fœtidissima Scabies adhuc inter Equos, quæ diu jam duravit.

Nova Luna 14°. MARTIO. *Plena Luna* 28°.

Frigidus succedit *Martius* Aerisque Temperies multò ficior; ineunte Mense Malacia crebra, exeunte verò nimbosa Tempestas *Barometrum* deprimens plurimùm; à vii. ad xxi. Ventus aquilonius & Gelu subinde.

Pluvia $\frac{11}{1}$ $\frac{11}{1}$ $\frac{11}{1}$ $\frac{11}{1}$
 1. 3. 6. 11. 13. 22. 25. 26. 27. 28.
 $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$
 29. 30. Nix & Grando 7. 10. 11. 23. 25. 30.
 Dig. Dec.
 = 2. 946.

Maxima AB. 8. Vesperi N N E 1. Nubeculæ lucidissimæ sequi videntur Venti Cursum.

Procella 25. S w 4. — 26. à primo Mane per totam

1743)

& Morbis Epidemicis.

97

totam Diem S w b S 4. ac Velperi & durante Nocte Circius vehementissimus — Turbo gravissimus 28. ab Hora 5. p. m. ad 9. w N w 4^x.

8 Altitud. maxim. 15. 30. 2. N b E 1. } media 29. 6²/₃
 ——— minim. 26. 28. 8. }
 Dies frigid. 8. 66. N N E 1x. } media 55²²/₃₀
 — tepid. 5. 51. Malacia. }

Variolæ frequentes, Febres intermittentes plures & quotidianæ & tertianæ, *Rheumatismus*, necnon Tormina passim; Tusse ubiquè, Gravedines, Dolor Dentium, Capitis & Tonsillarum Tumores cum Asperitate Faucium multos molestant.

Scabies foedat Equos maximè, extrema Macie confecti plures pereunt, aliqui Angina atque Tussi suffocantur.

Nova Luna 13^o. APRILIS. Plena Luna 27^o.

Pars prior Aprilis fuit valdè frigida, posterior tepida satis; Ventus ab Septentrione undecimum Diem adusque, sæpe cum Nive, Grandine, Gelu: à xiii. ad xvii. orientalis, post varius; plerumque tamen è Plagis australibus.

Pluvia 1. 4. 5. 8. 11. 13. 14. 18. — 21. 23.

25. 26. 27. 28. Grando 1. 4. 5. Nix 2. 5. 6.
 Dig. Dec.

= I. 662.

Levis AB. 1. H. 8. p. m. N b E 2. Fulgur & Tonitru 21. Nocte, Circius vehemens 22.

* H

8 Alti-

8 Altitud. maxim. 6. 30. 1. N 1. } media 29 $\frac{5}{29}$
 ——— minim. 26. 29. 3. S S V V 3.
 Dies frigid. 2. 64. N 2x. } media 49 $\frac{21}{29}$
 — tepid. 30. 35. S S V V 2x. }

Variola adhuc; multæ Febres intermittentes*, tertianæ potissimum; Pleuritides & Peripneumonix plurimæ: Febris putrida passim cum Eruptione *miliari* rubra plerumque; omnes ferè levi Angina per Initia corripuntur, sub Finem Cuticula multum desquamatur. — Plures tabidi moriuntur.

Dysenteria cruenta multos, inter Popellum præcipuè, perimit, Vermes teretes ferè semper ejiciuntur, etiam ab Adultis, imò & à Senioribus — Nescio pol unde, sed per plures jam Menses juniores, necnon Ætate provectoros, longè magis infestaverunt Vermes quàm memini unquam. An ab immensa Copia Fructuum omnigenorum, quæ undiquè per Æstatem & Autumnum Anni 1742. maximè scatebat? his certè utitur nimium Vulgus semper cum abundant, imò & abutitur: quippe Cerasa, Pruna, Poma perpetuò devorat.

Maximè sæviit hæc *Dysenteria* in Oppido *Plimton*, ejusque Vicinia, Solo scilicet pingui & uliginoso, Morbisque plus satis obnoxio, Febribus lentis præsertim & intermittentibus: duravit autem ab Initio *Aprilis* ad *Maii* Finem. Huic plerumque accessit Febris, rectius fortasse dicerem hæc fuit ipsius Febris *Symptoma*; nam ab ipso sæpe Principio, atque ante ulla Tormina, haud levis urgebat febriculosus Ardor cum Pulsu incitatore,

* Vid. *Essay on Fevers*, p. 20.

tatiore, ac Lingua scabra; quid quod & sæpissimè cum manifesto satis Horrore ingruerat Morbus, & non rarò utique More *Hemitritæ* Cursum tenebat—Haud certè scio an fuerit Febris *epidémica*, mox describenda, ad Intestina translata: hoc sanè mihi compertum est, *Dysenteriam epidemicam* non esse frequentem Veris Sobolem*.

Ut ut fuerit, aderat semper Febris plùs minùsve, Sanguinem ideò plerumque incipiente Morbo detrahi curabam, ne gravior foret Intestinorum Inflammatio, indeque acerbiora Tormina, certiorque demùm Gangræna—Urgebant semper per Morbi Initia Nausea & Vomitus; Monitis adeò Naturæ obsecundans nūquam non Ventriculū elui jubebam, dato *Ipecacuanhæ* Decocto aut Infusione, epoto mox affatim *Oryzæ* aut Pulli Jusculo. Hoc peracto porrigendum est *Rhabarbarum* subinde cum liberali, diluente & demulcente Potione, qua lenitur Acrimonia Humorum & in Sanguine & in Visceribus, dum *Rheum* acrem expellit Colluviem. Ita sanè necessaria est lenis Alvi Purgatio Initio omnis *Dysentericæ*, ut si hæc omittatur, Astringentia verò & Opiata præproperè dantur, mox gravissima accedunt Tormina, Stomachi Ægritudo, Singultus, *Apthæ*, tandemque Intestinorum *Sphacelus*, quem cita Mors excipit—Hoc equidem Monitum in *Dysenteriis* curandis perpetuò observari debet; in hac autem, de qua nunc agitur, pernecessarium est utiquè, quia procedente Mor-

* (Δυσεντερὴν γίνεσθαι Θέρους ὥρη, δεύτερον ἡδη τοῦ πύου, ὡς ἔχει Ἡρόδ. ἢ καὶ χειμῶνος. *Arct. Cappad. Cap. de Dysenteria ad Finem.*

bo Lumbrici ferè semper ejiciuntur: Quid sperandum Hoste in imis Visceribus hærente? Quid si hostem Calomelano expugnes? Hoc feci hercle sæpius, nec pœnitendo certè Eventu, quinimò læta sæpe reportata Victoria.

Non ita tamen Purgantibus insistendum est, quasi Nil ultra desiderat Morbus; Tormina namque *Anodynis* subinde sopienda sunt, nimiusque porrò Fluxus Humorum est cohibendus; intereà corroboranda sunt etiam Intestina—facit ad hæc omnia commodè satis *Confectio*, ut dicitur *Fracastorii* (præcipuè Nuce *Myristica* tosta, aut Cinnamomo adjecto) si debita exhibeatur *Dosi*, & si sit necesse, *Extracto Thebaico* adjuta. Decoct. C. C. aut Lac dulce cum Aquæ fontanæ Duplo & Cinnamomi paululo coctum, aut Serum Lactis tenuissimum, in quo Ferrum ignitum sit extinctum, sorbenda sunt subinde. Si Bilis acris abundet, si *Dysenteria* sit valdè cruenta, & sinceri Sanguinis plurimum dejiciatur Tinctura Rosar. rubr. probè acidula juvat, aut Vinum rubrum austerrum dilutius—Plerumque, sub Morbi Finem, excruciat maximè gravissimus quasi Intestinorum Descensus, & perpetuus desidendi Conatus; hoc nihil æquè levat ac *Diascordium*, aut Theriaca Andromachi, ex Lacte dulci, aut Decocto albo, Clystere data. Sed de Morbo *dysenterico* mox plura.

Sub Finem *Aprilis* per omnem hanc Regionem grassata est Febris quædam levis plerumque, interdum verò haud parùm truculenta, Senibus & Pueris pulmonariis.—Simul & semel innumeros corripuit Horrore quodam vagante, & Gravitate Capitis, mox quoquè Dolor ejus accessit, Artuumque porrò & Dorfi, plurimos tamen universa quasi Lassitudo molestavit. Protinus maxi-

ima fuit Distillatio acris per Oculos, Nares, Fauces, sæpius etiam in Pulmonem, unde Sternutamenta ferè perpetua, ac vehemens plerumque Tussis: Omnibus adfuit Pectoris quædam Strictura, & Gravitas permolesta. Secundo ad eam Die invaluit Febris, Pulsusque multò citatior factus est, aucta quoque spirandi Difficultate, præcipuè si Sanguinis Missio fuerat neglecta. Sitis utique non admodum urgebat, at Lingua erat peralba, veluti Cremore Lactis suffusa: Oculi leviter inflammati, atque in ima Orbita dolentes, Lumina refugiebant.

Non uno Tenore processit Febricula, sed nunc Algor, mox Ardor incessit, nullo prorsus servato Ordine; cum eo tamen ut haud rarò tandem in Tertianam aut Semitertianam* facerit. Erat autem ominis multò peioris *Peripneumonia** seu *Pleuropneumonia* quæ quidem ob Sanguinis Abundantiam, atque Tussis Vehementiam accedebant interdum, his præsertim, qui calidiore Regimine & Medicina usi fuerant; nec infrequens, eandem ob Causam, erat Pleuritis* aut *Rheumatismus* acutus, præcipuè neglecti Sanguinis Missione, ineunte Morbo.

Sanguis extractus fuit nonnumquam valdè glutinosus, plerumque tamen floridus, at non multo Sero scatens; varius autem fuit in variis, quo magis ardebat Febris utique eo tenacior: qualiscunque verò visus est Sanguinis Status, haud magnum ejus Dispendium ferebat hic Morbus; imò, si vel *Peripneumoniæ* aliquid subesset minimè largam sine maxima Virium Ruina, rarò

H 3

plus

* Vid. *Essay on Fevers*, P. 20.

plus Vice simplici Venæ Sectionem tolerabat : nec in hac solùm, sed in omni Febre *Catarrhali epidemica*, hoc ferè perpetuum notavi ; namque minuendo Naturæ Vires nimiùm *Perspirationem* inhibet, indèque acrem/ auget Colluviem. — Aliqua tamen Sanguinis Missio, ipso Morbi Initio, in robustis adultis, lautè viventibus, *plethoricis* juvat semper.

Per totum Febriculæ Decursum sputabant largissimè, quod Pectori Levamen erat maximum ; Tussis autem Importunitas haud leviter *Tracheam* atque Pulmones exasperabat ; Oleum ideò *Amigdalinum*, *Sperma Ceti*, imò & *Papaveris* aliquid, *Diacodium* putà, *Tinctur. Thebaic.* aut *Elixir Pæregoricum* desiderabat : Ultimum hoc porro utiles blandosque Sudores movebat, nec intereà gravabat Pectus. Frequenter equidem Pulmonum Gravitas & Præcordiorum Oppressio *Oximel Scillitic.* *Lac Ammoniac.* *Syrup. Croci*, aut tale quid, deposcebat — atqui, hoc in Casu fuit instar omnium ferè lene *Emeticum* ; quod quidem, mox post Venæ Sectionem, totum hoc sæpissimè discussit, & non uno solùm Nomine Opem tulit.

Pars Ægrotantium longè major faciles, æquales, benignos habuere Sudores secundo, vel tertio Die, qui una comitante Expuitione larga, Febrem quinto profligarunt, sæpe etiam citius, manente tamen ut plurimùm haud parvo Virium Langore — Hæcæc autem Nihil promovit felicius quàm diluens, demulcens, tepidus Potus ; Serum nempe Lactis dilutissimum, Hordei, aut Avenæ, aut conditi Eryngii Decoctum ; *Hederæ terrestris*, *Tussilaginis*, *Glycyrrhizæ*, Infusio ; imò per plurimis *Coffee* Potus profuit maximè cum Lactis dulcis pauxillo — Apage verò Sales Spiritusque,

ut vocant, *volatiles*, calida *Alexipharmaca*, & id Genus alia, quæ turbant certè plurimùm, parùm verò utiliter expurgant Morbum. — Cæterùm Febrē, acriùs atque diutiùs inhærentem, *Hauftu Salino communi** moderabar.

Crebrò autem sub Febriculæ Finem multæ rubræ, urentes Pustulæ erumpebant, sæpe repentina, imò & profusa Diarrhœa accedebat sævis interdum cum Torminibus, facta nimirùm morbosæ Materiæ ad Intestina *Metastasi*. — Hinc fortè & *Dysenteria* plurimæ, quæ & hîc quoquè tunc Temporis passim grassabantur; mucosæ fateor, rarè cruentæ — Adeò tamen parùm cohibendus erat hic sese levandi Naturæ Conatus, ut per Alvum sæpius Sponte facesseret Morbus; atque ideò Manna, *Rhabarbaro*, *Tartaro solubili*, *Tamarindis*, &c. promovendus: fortiora tamen Purgantia horrenda plerumque excitabant Tormina. Viresque penitus disjiciebant.

Febris hæcce, utcunque longè latèque maxime vulgaris, paucis fuit Exitio; quandoquidem tertio ut plurimùm quartove Die evanuit, modò se reciperent maturè ea correpti — Res fuit herclè *Dietæ* potiùs accuratæ, ac debiti Regiminis, plerumque quàm Medicinæ elaboratæ; non quòd non interdum multò plus Curæ atque Diligentia poposcit. Sudores æquales, at moderati, Sputa multa, facilia, Urinæ largæ, lutulentæ facile sublevabant Morbum: mirabar sæpissimè immensam Urinæ subsidentiam; quæ tamen Nil auspiciatius.

H. 4.

Eadem

* Vid. supra Mense Junio 1740.

Eadem prorsus videtur hæc Febris, quæ per totam Europam, hoc Vere, sub Nomine *Influenza* grassata est: apud Gentes tamen Australes longè magis quàm hic fuit pestifera; quinetiam & apud Londinenses ipsos Funera auxit maximè, imò una duntaxat Hebdomade ad Mille saltem.

Nova Luna 12°. *MAIO*. *Plena Luna* 27°.

Sicca fuit admodum, perpulchra & calida *Atmosphæra*. Diem adusque vicesimum secundum; Boreas perpetuus ad xvii. indè Vulturnus, post xx. Libs pluviosus.

Pluvia 16. 20. 22. 23. 25. 26. 27. 28. 29.

Dig. Dec.

30. = 0.866.

Fulgur & Tonitru è Longinquo 20. p. m. levis Procella 27. Nocte S w b S 4°. Grando 30. — & h conjunctissimi sexto Die H. 11. p. m. adeo ut unum tantum Planetam quasi exhibeant.

| | |
|----------------------------------|---|
| Altitud. maxim. 8. 30. 1. N E 1. | } media 29. 6 ²⁴ / ₂₇ |
| minim. 21. 29. 2. S S VV 2. | |
| Dies frigid. 1. 36. Malacia. | } media 30 ¹³ / ₂₇ |
| — fervid. 7. 21. N N E 1. | |

Plurimi *Apoplexia* correpti sunt, & plures erepti, nec hic tantum sed & aliis in Locis: an ab enormi, ac intempestivo Æstu Sanguinem subito nimis expandente? Febres quotidianæ & tertianæ creberrimæ longè latèque; *Variolæ* & *Morbilli* passim. — Tussis ferina * frequens & pertinax maximè,

* Consule quæ dixi de Pertussi Puerorum, Vol. 10.

maximè , sæpe post Morbillos funesta — Fugat hanc optimè modica Sanguinis Detractio , & lenis Alvi Purgatio , confert Rusticatio , frequens Equitatio , atque accurata & lenis *Dieta*: ubi parùm hæc proficiunt Medicamenta ex Argento vivo præparata & *Cortice Peruviano* rarò fallunt , quoniam Lentorem attenuant Sanguinis , & Vermes pellunt , qui jam diu per plurimis maximè sunt infesti , nec cedit plerumque Tussis nisi his ejectis : — Haud rarò prodest Balneum frigidum , ubi omnia incassum exhibita fuere : cave tamen ne adsit Febricula , vel *Hæmoptoe* .

Dysenteria cruenta , aut mucosa , sævit maximè apud *Plimton* & Vicinitatem : Per plures Lumbricos dejiciunt , nec tamen indè multum levantur ; imò sæpe haud multò post frigido Sudore correpti mox Animam agunt : credo quòd *gangrænosa* Sanies fœdos hos Inquilinos expellit : unaque cum his exeunt interdum Carunculæ lividæ , fœtidissimæ , haud dubia utiquè Signa *Sphaceli* Intestinatorum * .

Venæ Sectionem , quam superiore Mense ad *Dysenteriam* consului , jam etiam magis necessariam invenio ipso protinùs Morbi Initio , ob magnum sanè & insolitum Tempestatis Calorem : turgescit enim indè quamplurimum rarefactus Sanguis , atquè majorem excitat Inflammationem . — Vix unquam utiquè datur *Dysenteria epidemica* ubi Intestina non sunt , aliquo saltem Gradu , inflammata — Ubi autem viget Inflammatio , ibi rectè semper mittitur Sanguis quamprimum ;

Vires ,

* ἢν ὑπὸ Δυσεντερίας ἐχομένοσιν οἶον Σάρκες ὑποχωρήσωσι , Σανάσιμον . Hippocr. Aph. 26. Sect. 4.

Vires, Ætas, Pulsus, Constitutio & Anni & ipsius Ægrotantis Modum statuatur. — Movenda dein est leniter Alvus (detergo prius Ventriculo si Nausea & Vomitus urgent) blandis tamen semper Purgantibus utendum est, quæ namque ex Aloe, Scammonio, aut Colocynthide confecta sunt, in hoc Morbo Toxica sunt prorsus, non Remedia — Omnium sanè optimum est Rhabarbarum, quod exhibendum est sæpius (tostum id semper si ab Indiis venit Orientalibus) cum Nucis moschatae aut Cinnamomi pauxillo — Tinctura hujus ex Vini Spiritu, utpotè resinosa nimis, parùm proficit; longè melior est quæ Vino rubro extrahitur.

“ Adeonè verò purgandum est si cruenta sit
 “ Alvus & perliquida? “ etiam; acris etenim Intestinorum Colluvies fit longiore Mora acrior longè, vellicatque multò magis, unde majorem excitat Inflammationem, ipsumque adeò auget Morbum. — “ At Sanguine tincta est Alvi Pro-
 “ luvies — fit ita; “ nocetne modica Sanguinis Expuitio in Pulmonum Inflammatione; nonne hæc sæpissimè, sub certis Conditionibus, Morbum expedit? — Si alterutrius *Mesentericæ*, aut *Cæliacæ*, Arteriæ Ramusculi, Intestinorum Tunicas, perreptantes, obstruuntur, facta Resolutione, facta Coclione, obstruens Materia sæpissimè in Cavo Intestinorum funditur; solvitur adeò Obstructio, solvitur Inflammatio, solvitur Morbus — Dolentes, inflammatae *Hæmmoroides* internæ Sanguinem frequentissimè emittunt: an Periculo est hoc Ægrotanti an Levamento? — Si sit igitur Alvus moderatè tantùm cruenta Nihil horresco; leni eluo Portione irritantem Acrimoniam, imo & corruptam blandè expurgo Colluviem, quæ citò ali-

aliter exulcerata facit Intestina, tandemque *sphacelata*, cujus Signa sunt certissima Ventris Proluvies atra, oleosa, foetidissima cum lividis Carunculis, Sudores frigidi, Singultus, Delirium. Porro singulare quoddam in hoc Casu nonnumquam observavi, *Symptoma*, semper lethale, Urinam nempe limpidam, at parcam valdè; id præcipuè in perbono quodam hujus Oppidi Sacerdote, cui primò Nausea, Vomitus, Alvus torminosa atquè cruenta valdè levi cum Febre, Lingua perarida, Urina ferè nigra: Die quinto omnia magis pacata, sexto tamen recrudescebant Tormina, Dejectio atra, saniosa cum Grumis quasi carnosus horrendi Foetoris, Urina perparca, frequens autem, at prorsus limpida, etsi *Rhabarbarum* assumpserat quotidie: mox adeò Singultus, leve Delirium, Sopor nimius, tandemque nono, Finis omnium Malorum, Mors. Hic utiquè Intestina ita *sphacelata* videbantur ut Nil omninò ad Sanguinem transmitterent.

In nullo sanè Morbo magis necessaria est diluens & demulcens Potio quàm in *Dysenteria*—in hac utiquè pura puta Aqua fontana haud parùm Pauperculos juvabat, qui ad Fontem quandam sacrum, si Diis placet, & *antidysentericum*, confugere—innocuus saltem erat & purissimus, multòque magis Nomen *Aquæ Vitæ* meruit quàm *Spiritus Vini ardens*, hoc Titulo celebratus, quo se nimium sæpe in hoc Morbo Popellus abutebatur. Aquæ bene frigidaë Potionem cominendat vel ipse *Celsus**, si vetus Vitium est; atqui inter Initia egelidam suadeo; quippe quæ & Intestina

* *Cels.* Lib. 4. C. 15.

rina eluit meliùs, & per *Meseraica* Vasa & *Lactea* ad Sanguinem diluendum transit faciliùs : cum verò elota sit acris Viscerum Colluvies, ea sanè firmanda sunt, adeòque tunc haud perperràm exhibetur frigida — hac sola utiquè, Opii pauxillo adjecto, nonnumquam *Dysenteriae* Curacionem consummavi, probè purgatis priùs Intestinis — Non multùm equidem probo oleosa & glutinosa; si horum aliquid, derasis ac Mucò naturali privatis Intestinis, desideratur *Decoct. alb. Emulsio Amygdalina* cum *Gum. Arabic. Mucilago Semin. Cydonior.* exhibeantur; in Victu porrò *Gelatina C. C.* cum *Icthyocolla, Salop, Panatella*, aut id Genus alia.

Sed hæc de *Dysenteria* obiter. — Nunc quid *Febris epidemica* facit videndum est — Sanè grassatur usque plurimùm, jamque frequenter plus habet *Peripneumonicae* Indolis, interdum magis ad putridæ Naturam accedit; in alterutro Casu Sanguis emissus parùm videtur viscosus, etiam licèt Pectus haud parùm opprimitur — hanc porrò *Febrem* nunc comitantur magna *Faucium Asperitas*, quandoque ipsa *Angina* — Statu Morbi frequentes *Pustulae* urentes erumpunt, faustæ semper, sequiturque permagna *Cuticulæ Desquamatio*: rarior autem jam adest *Diarrhoea*, multòque si accedit, levior est; calida namque *Tempesta* magis nunc ad extra evocat Humores, adeòque *Pars* longè major *Ægrotantium* blando, at universali, oborto Sudore mox facillè liberatur; atqui plures *Febre* quadam intermittente corripiuntur* — *Quotidianæ* certè & *tertianæ Febres* jam

* Vid. *Essay on Fevers*, P. 20.

jam ubiquè regnant; exeunte attamen Mense Catarrhalis epidemica ferè penitus faceffit.

Nova Luna 11^o. *JUNIO*. *Plena Luna* 25^o.

Siccus quoquè, & calidus ut plurimum, fuit hic Mensis, medio tamen inter fuere duo, tresve Dies perfrigidi; spiravit Aquilo frequenter, Subsolanus interdum, Auster rarò, aliquando Ventus siluit prorsus: exeunte Mense Rorationes maximæ—Stupenda Pruina, imò ipsa Glacies xiii. primo Manè, idque per totam ferè Angliam.

Pluvia 3. 5. 10. 12. 13. 14. 15. 17. 26.
Grando 13. Meridie cum Fulgure & Tonitru.

Dig. Dec.

= 0. 838.

Procella, Fulgur, & Tonitru 14. Nocte—Fulgur & Tonitru primo Mane 26.—Levis AB. 28. Nocte N 1.

| | |
|--|--|
| <p>Altitud. maxim. 6. 29. 8. Nb E 1.
minim. 3. 29. 3. S 1.</p> | <p>} media 29. 6⁶/₂₆</p> |
| <p>Dies frigid. 13. 46. Nb E 1.
— fervid. 7. 20. E 2.</p> | <p>} media 28.</p> |

Variolæ adhuc & *Morbilli*, *Tusses convulsivæ* plurimæ: *Febres putridæ* & *Peripneumonica* passim, intermittentes verò, tertianæ potissimum. epidemica*; *Tussis*, *Tumor*, ac *Faucium Asperitas* permultos molestat.

Nova

* *Essay on Fevers*. P. 21.

Pluvia $\frac{1}{1}$ 2. $\frac{11}{5}$ 6. 15. 19. 20. 29. 30.
Dig. Dec.

= 0. 700.

Fulgur, Tonitru, & gravissima Pluvia apud
Launceston 17. p. m. — hic etiam Fulgur, Toni-
tru, & Pluvia 29. Nocte.

Altitud. maxim. 23. 29. 9. NN E 1. } media 29. $6\frac{17}{28}$
— minim. 5. 29. 3. S VV 2x. }
Dies frigid. 29. 34. E S E 2x. } media 27 $\frac{6}{28}$
— fervid. 9. 19. E 1. }

Variolæ ac *Morbilli* passim, multæ adhuc Fe-
bres intermittentes Ruri: *Apoplexiæ* aliquæ, &
Choleræ: Pauci admodum ægrotant.

Nova Luna 7°. *SEPTEMBRI*. *Plena Luna* 22°.

Durat usque perpulchra & maximè sicca Tem-
pestas, quin & saluberrima*: Fontes & Rivuli
penè exarescunt penitùs, at immensa Vis Roris
decidit quotidie. Ventus ferè perpetuus ex Orien-
te, intercurrente tamen nonnunquam Aquilone,
Austro rarissimè.

Dig. Dec.

Pluvia 2. 3. 6. 8. 16. 17. = 0. 250.

Altitud. maxim. 24. 30. 0. E N E 1. } media 29. 8.
— minim. 5. 29. 6. S 1. }
Dies frigid. 30. 48. N E 1. } media 36.
— calid. 19. 30. E b N 1. }

Ineunte Mense haud pauci Febre quadam an-
ginosa correpti sunt, quæ paulò post More peri-
pneumo-

* — οἱ Αὐχομοὶ τῶν ἐπομβριῶν εἰσὶν ὑγιεινότεροι. Aph.
15. Sect. 3.

pneumónico Pulmones invadebat, magno interdum cum Ægrotantium Periculo. *Asthma* frequens, Scabies undiquè, paucissimi aliter Morbi.

Nova Luna 6°. OCTOBRI. *Plena Luna* 22°.

Pluviosa Tempestas ingruit, citoque Pede irruit Hyems, crassus hinc fit Aer & humidus. Initio Mensis Corus prævaluit, à x. ad xiv. frigidus Boreas, tunc Vultur, paulòque post nimbofus Auster.

Pluvia $\frac{1}{3}$. 3. 4. $\frac{1111}{6}$. 7. — 9. 15. — 17. $\frac{1}{18}$. 20. 21. $\frac{1}{22}$. 23. $\frac{1}{24}$. 25. $\frac{11}{26}$. 27. 29. 31. — 3. 6 3 8. Dig. Dec.

Levis Procella 16. S E b S 4^x. — 23. Vesperis S S w 4^x. — Vehemens 23. media Nocte S E b S 4^x. — gravis tota Die 25. S 4. Amplissimus & subluteus Halo circa Lunam 19. H. 8. p. m.

Altitud. maxim. 1. 30. 0. N 1. } media 29. $\frac{16}{28}$
 ——— minim. 25. 29. 0. S 4. }
 Dies frigid. 14. 55. N E 1. } media 44. $\frac{15}{28}$
 — tepid. 27. 39. Malacia. }

Febris quædam *Sporadica*, quæ & Fauces ac Pulmones graviter afficit. Tusses, Dolores & Tumores Faucium frequentes; *Rheumatismi* graves passim.

Nova Luna 5°. NOVEMBRI. *Plena Luna* 20°.

Ineunte Novembri Corus plerumque spiravit, Medio Boreas, à xix. autem nunc Libs, nunc Auster, nihilominus altam satis Stationem retinuit
Baro.

1743)

& Morbis Epidemicis.

113

Barometer, Atmosphæra verò crassa fuit valdè ac tepida.

Pluvia ^{II} 1. ^I 2. ^I 3. ^I 4. ^I 5. ^{II} 6. ^{II} 11. ^{II} 16. ^{II} 17. ^{II} 18.
Dig. Dec.
19. 20. 25. 28. 29. = 2. 512.

Fulgur & Tonitru 2. H. 4. a. m. Pruina & Gelu 9. 14. N E 1^x.

Altitud. maxim. 24. 30. 2. S b E 1. } media 29. 9.
minim. 18. 29. 4. S VV b VV 3. }
Dies frigid. 14. 62. N E 1x. }
— tepid. 6. 42. VV S VV 2. } media 49 ²⁵/₂₈

Blanda admodum Tempestas, pauci Morbi; Febres tamen quædam anginosæ, scarlatina & pustulosæ; Tusses crebræ.

Nova Luna 5°. DECEMBRI. Plena Luna 20°.

A primo ad Diem septimum Decembris perflavit Eurus, post Corus, aut Libs, interdum Aquilo: à xxiv. ad Finem usque Ventus perpetuus ex Oriente, isque sæpe perfrigidus: præalta fuit ut plurimum Baroscopii Statio.

Pluvia ^{II} 1. ^I 8. ^I 9. ^I 14. ^I 15. ^I 16. ^{II} 17. ^I 18. ^I 19.
Dig. Dec.

Grando 14. = L. 514.

Maximæ Pruinae sæpissimè hoc Mense, Gelu rigidum frequens.

Altitud. maxim. 21. 30. 6. N E 1. } media 30. 0 ¹⁵/₂₉
minim. 17. 29. 1. S VV 2. }
Dies frigid. 31. 73. E N E 2x. }
— tepid. 8. 46. S VV 3x. } media 59 ²²/₂₉

I

Tem-

Tempestas est adhuc maximè salubris, Morbi multò rariores solito: Tusses frequentes, etiam *convulsivæ* plurimæ inter Pueros, Pleuritides, & Anginæ aliquæ, *Rheumatismus* passim.

Tota Pluviæ Quantitas, Anno MDCCXLIII.
Dig. Dec.
= 20. 908.

Nova Luna 3°. *JANUARIO.* *Plena Luna* 18°.

Constans ab Oriente Ventus, toto ferè Mense; *Mercurium barometricum* in alto sustinuit Loco, flectens verò plerumque ad Septentrionem Aerem fecit siccum & frigidum valdè, hinc Gelu sæpe asperrimum; imò 28°. 29°. vel ipsum Mare ad Littora congelatum erat.

Pluvia $\frac{III}{7}$. $\frac{I}{11}$. $\frac{2}{15}$. 30. Nix 27. = 1. 068. Dig. Dec.

| | | | | | | | | | |
|------|-----------------|-----|-----|----|---|----|--------------------------|----|------------------------------|
| 8 | Altitud. maxim. | 18. | 30. | 6. | E | N | E | 1. | } media 30. $0\frac{17}{30}$ |
| — | minim. | 7. | 29. | 6. | S | | | 2. | |
| Dies | frigidissim. | 29. | 76. | N | E | 1. | } media 64 $\frac{1}{2}$ | | |
| — | tepid. | 11. | 56. | S | b | E | | 2. | |

Tussis inter omnes ferè vehemens & laboriosa; sævissimi *Asthmatis Paroxyismi*: Dolores Dentium, Raucedo, Fauciumque Asperitas plures molestant; Pleuritis, vel Peripneumonia, corripit multos, *Ophthalmia* aliquos—Tussis *convulsiva* inter Pueros *epidemica*, ad quam profligandam magis fuit necessaria Sanguinis Missio quàm memini unquam, etiam in Puerulis tenerrimis, quorum Sanguis haud rarò non levi obductus erat Glutine: porrò non ita feliciter successit *Corticis Peruviani* Decoct. quod sanè perpetuum est ubi Sanguis est densus admodum ac tenax, atque In-

flam-

1744)

& Morbis Epidemicis:

115

flammationibus aptus; unde pessimè Pleuriticis
& Peripneumonicis exhibetur.

[Nova Luna 2°. FEBRUARIO. Plena Luna 16°.

Varia fuit Tempesta variusque Ventus hoc
Mense, frequens autem ab Oriente *Barometrum*
tenuit ad altum satis Gradum, Malacia subinde
per Initia; per totum *Atmosphæra* densa, ac sæpe
frigida, haud multum tamen Gelu.

Pluvia $\frac{1}{7}$. $\frac{8}{8}$. 9. 11. 17. $\frac{11}{19}$. $\frac{2}{20}$. 21. — 23.
 $\frac{1}{24}$. 26. 28. 29. Grando 9. N b w 1^r. — 24. N
w 3. — 1. 722.

Circius vehemens 24. p. m. — vehementissimus
28. Noctu.

—— 29. a. m. Maximus & lucidus Halo
circa Lunam 18.

Altitud. maxim. 13. 30. 3. E S E 2. } media 29. 8 $\frac{1}{2}$
—— minim. 29. 29. 2. N VV b VV 4. }
Dies frigid. 6. 67. E 2. }
—— tepid. 23. 49. VV S VV 22. } media 56 $\frac{15}{27}$

Variolæ aliquæ; rubra *miliaris* Eruptio cum
Febricula passim & Febres *rheumaticæ*. — Tussis
violenta inter omnes ferè, pluribus *catarrhalis*
est prorsus, multis tamen *asthmatica*; hinc Pe-
ripneumonia frequenter oritur, haud rarò Spu-
tum Sanguinis, quod quidem aliquos in Tabem
pulmonariam præcipitat. — Tussis *convulsiva* et-
iam Adultos quosdam corripit, qui solummodò
repetita Sanguinis Missione levantur, & Vomi-
tu leni.

Nova Luna 3°. *MARTIO*. *Plena Luna* 17°.

Incipiente *Martio* perplurima Grando, Cauro sæpe perflante: à xii. ad xxiii. Ventus Orientem inter & Septentrionem constitit, inde Libs; ad ipsum Finem Aquilo: Aer fuit siccus plerumque & frigidus.

Pluvia $\frac{111}{1}$ 2. $\frac{1}{3}$ 4. $\frac{11}{5}$ 6. $\frac{1}{7}$ $\frac{11}{9}$ 11. 23. 25.
 $\frac{1}{26}$ $\frac{11}{27}$ 28. 30. Grando 2. 3. 6. 7. 8. $\frac{1}{10}$.
 Dig. Dec.

Nix. 8. $\frac{1}{31}$ = 2. 632.

Procella 2. N w b w 4^x. — 5. S w b w 4. —
 11. N w b N 4^x. Lumen boreale fulgidum valdè
 22. H. 9. p. m. E N E 2^x.

8 Altitud. maxim. 15. 30. 1. E N E 2. } media 29. $5\frac{2}{3}$
 — minim. 5. 29. 2.
 Dies frigid. 14. 62. N N E 2. } media 55 $\frac{26}{30}$
 — tepid. 28. 46. VV S VV 2. }

Febres aliquæ tertianæ, & semitertianæ: Tussis molestissima & pertinax admodum undique, quæ ex Naribus sæpe, sæpe de Pulmone, Sanguinem erumpere facit, accedit interdum Peripneumonia — hinc *Phthifici* plures, præsertim qui antea fuerant *Asthmatici*: Pleuritis & *Rheumatismus* passim, sub Mensis Finem *Pleuroperipneumonia* frequens valdè — Cruor extractus est perquam crassus atque maximè tenaci & flavo obductus Glutine.

Nova Luna 1°. APRILI. Plena Luna 15°.

Ineunte Mense Nix & Grando multa flante Aquilone, mox turbidus Auster; à xii. ad xvi. Eurus, indè Aquilo rursùm; Corus sub Finem. Aer fuit sæpe gelidus valdè; maximæ Pruinae sæpissimè per medium Mensẽ, imò & interdum Gelu.

Pluvia $\frac{1}{1}$. $\frac{III}{4}$. 6. $\frac{III}{7}$. 8. $\frac{1}{9}$. $\frac{II}{10}$. $\frac{III}{12}$. $\frac{II}{15}$. 22.

$\frac{II}{28}$. 30. Nix & Grando 1. $\frac{1}{2}$. 3. 4. 9. 26.
Dig. Dec.

= 3. 390.

Procella 7. p. m. 5 4^r. Gelu 14. 15.

8 Altitud. maxim. 19. 30. 1. N N E 1. } media 29. $6\frac{3}{29}$
— minim. 5. 29. 0. S S V V 3^r. }
Dies frigid. 3. 65. N N E 3. } media 50 $\frac{6}{29}$
— tepid. 24. 41. N V V b V V 1. }

Pleuritides & Peripneumonix valdè frequentes, sæpe conjunctæ sæviunt: Multi *Asthmate*, multi *Rheumatismo*, multi Pleuritide spuria, laborant, plurimi Tussi gravissima. *Morbilli* passim, *Variolæ* quamplurimæ per Viciniam, necnon in citeriore *Cornubia*; haud paucæ Febres tertianæ* — *Paraphrenitis* solito frequentior.

Vix sanè observavi unquam Cruorem, ab Ægrotantibus detractum, magis densum atque glutinosum quàm hoc Tempore, idque sæpe post quartam, imò & sextam Sanguinis Missionem — hoc profectò notavi præcipuè in primario Noso-

I 3

comiz

* *Essay on Fevers*, P. 20.

comii nautici Chirurgo, qui ineunte Mense Paraphrenitide fuit peremptus.

Bonus hic & ingeniosus certè Vir Mane, tertio *Aprilis*, inhorruit, mox Rigore maximo correptus, inter visitandum Ægrotos, se recepit, protinùs sævissimo Doloꝛe Dorsi ac imi Pectoris dextri percitus succubuit, febricitavit vehementer — Missus est extemplò Sanguis ad ℥xvi . me dein arcessiri voluit — Fotum emollientem, & laxans *Enema*, præcipio, Nitrique plurimum & *Spermatis Ceti*, Potum diluentem, porrò & subtepidum, liberalem; furente tamen usque Doloꝛe, sub Noctem alteram Sanguinis Missionem ad ℥xvi . Fotumque iterùm, & *Enema* è Lacte dulci cum Sale marino plurimo, quo bis, terve dejecit Alvus; mox *Diacodii* ℥ss . sumpsit ac *Tinct. Thebaic.* gut. xxiv. — Tota Nocte ejulavit, difficillimè spiravit, Tussicula arida vexatus Nil expuit — bene Mane adeo, Die quarto, ℥xiv . Sanguinis detractæ sunt, Fomenta etiam & *Cataplasmata* demulcentia admota, paulòque post injectum est emolliens *Enema*, quo rejecto epotus est Haustus *Anodynus*: pacata hinc omnia per oras aliquot, accessit Vesperi Somnus — Infidæ autem hæ Induciæ! Nox maximis in Molestiis acta; Febris vehementis, Spiritus brevis, interruptus, difficillimus, Dolor acerrimus, Sitis ingens, Lingua arida — Ergo Vº. *Aprilis* H. 9. a. m. repetitur V.S. ad ℥xii . saltem, *Mannæ* porrò ℥x . cum *Sale Mirabil. Glauber.* ℥ss . ex Iusculo avenaceo assumptæ sunt; ter hinc, quaterve, respondit Venter, sævissimus tamen usque urget Dolor, Pulsusque celerimè vibrat, exilis quidem, sed durus admodum: bis Noctu repetita sunt *Anodyna*, unde Sopor aliquis, at perturbatus valdè — Cum parum

rùm hæc omnia proficere viderim *Camphoram* cum *Nitro*, &c. exhibui, *Hauftusque Salinos* ex *Sal. C. C. Succo Limonum*, &c. ut nimirùm per Sudores forsan Morbum elicerem; Femoribus porrò atque Dorso *Vesicatoria* applicari jussi — Sudavit paululùm inæqualiter, mox autem Rigor invasit, Dolorque Dorfi & Lateris immanis recrudit, adeò ut jam non modò exclamaret, sed & fureret planè — quinta adeò Vice, Die 6. nempe, post Meridiem, Sanguis emittitur ad z^{xxv} . circiter: ad Fomentum dein & *Clyisma*, necnon *Anodyna* confugimus, hinc Quies aliqua, sed Languor magnus, obrepfit denique Somnus. Post sex vel octo Horas inalgescens horruit, ejulavit, deliravit, se Flammis atque Ferro excruciatum intùs, dextro è Latere, exclamavit; (durum valdè, sed retractum, persensi Hypochondrium dolens*) anhelavit quasi ex citissimo Cursu interim maximo Nifu, at summo Angore, quasi Gladio perfossus, Suspirium edere anxie desideravit — Dubius omninò quid facerem ultra sextam Sanguinis Missionem suadeo ad z^{xii} . circiter, Fomenta iterùm *Cataplasmata* & *Anodyna* — Supervenit Sopor, Tremor, Tendinum Subsultus, Singultus: atqui se relevatum prædicat; quievit utiquè plurimùm, sed aliena murmurans & incondita — Frigidulus occupat Sudor Frontem, dum Genæ intenso Rubore flagrant, nigrescunt Ungues, frigescunt Manus; faciliùs verò movet, imò & se Sponte in Lecto erigit, meliùs se multò autumans, si modò Gravitas Spiritus immen-

* Si Septum transversum percussum est, Præcordia fursùm contrahuntur. *Cels. Lib. 5. C. 26.*

sa, & aliquantus usque Lateris Dolor ac Pondus abessent — At ego Hominem planè moribundum video, Septo transverso nempe *sphacelato*: tamen Sopores inter, Singultus & Deliria, atterit Noctem, Die 7^o. Mensis, paulè ante Meridiem, obiit Vir si quis alius, Vita dignus longiore. — Mox post Mortem livium quasi à Contusione apparuit totum Latus Dextrum, Os *iliū* adusque. Hic Casus fuit verè *paraphreniticus**, cujus per-paucæ extant apud Scriptores Medicos Historiæ: credo equidem longè sæpiùs occurrit quàm vulgò putatur.

Ab hoc Ægroto intra Quatriduum detractæ sunt Sanguinis Unciæ ferè centum, cujus singula Portio erat quàm maximè viscida, etiam ultima, licet Sero permulto tenuissimo limpido innatabat Crassamentum (parvula velut Insula globosa, penè tamen prorsùs submersa) quod firmissimo quasi Corio erat obductum, vix utiquè Scalpello penetrandum†.

Nova Luna 1^o. —

Plena 15^o.

MAIO. Nova Luna 30^o.

Ventus Orientalis hoc Mense prævaluit, à xix. ad xxiv. Zephyrus: Aer fuit siccissimus, sub Finem valdè calidus — blandissima plerumque Tempestas.

Pluvia $\frac{11}{3}$. 8. $\frac{1}{10}$. 11. 12. $\frac{11}{13}$. 18. 21. 22.

Dig. Dec.

Grando 13. = 1. 236.

Ful-

* *Essay on Fevers*, P. 240. † *Ibid.* P. 188.

1744)

& Morbis Epidemicis?

121

Fulgur & Tonitru 3. Nocte.

Altitud. maxim. 15. 30. 1. E N E 1. } media 29. 6 $\frac{26}{28}$
 ——— minim. 22. 29. 2. S VV 3. }
 Dies frigid. 14. 47. E N E 2. } media 36 $\frac{6}{28}$
 — fervid. 30. 20. E N E 1. }

Febres intermittentes *epidemicæ*; Pleuritis &
 Peripneumonia frequens, *Morbilli* passim: *Vario-*
le plurimæ, quarum haud paucæ mali admodum
 Moris: forsan à profusis Sudoribus; quibus A-
 dulti, præcipuè ineunte Morbo, sæpe corripiun-
 tur — Sed & Puerulis non multò minùs sunt exi-
 tiales, qui nimirum Confluentibus, nigris, cruen-
 tis non rarò obruuntur.

Plena Luna 13°. JUNIO. Nova Luna 29°.

Sicca duravit & calida Tempestas ad Diem
 Mensis vicesimum, Euris intereà spiravit fre-
 quenter, postea verò Ventus ab Oris australibus
 multam invexit Pluviam, Aeremque fecit multò
 frigidior.

Pluvia 4. 5. 8. 10. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
 Dig. Dec.
 27. 28. 29. 30. = 2. 786.

Fulgur & Tonitru 5. Vesperis — 22. Hora 9. p.
 m. — 23. p. m. Nebula valdè foetida 26. p. m.
 Malacia.

Altitud. maxim. 14. 29. 8. E b N i. } media 29. 5 $\frac{5}{29}$
 ——— minim. 28. 29. 0. S S E 2. }
 Dies frigid. 24. 36. S b VV 2. } media 27 $\frac{25}{29}$
 — fervid. 17. 16. N N VV 1. }

Febres

Febres intermittentes sparsim, tertianæ ac *Hæmitritææ* potissimum; Pleuritides, Peripneumoniæ; & Anginæ aliquæ. *Variolæ epidemica*, interdum valdè malignæ, utpotè *Petechiis* & *Hæmorrhagia* aliquando stipatæ.

Plena Luna 13°. *JULIO*. *Nova Luna* 28°.

Per Initia Mensis Pluvia frequens, parca pòst; Aer plerumque crassus, Ventusque varius, Malacia interdum; à xvi. ad xxii. spirabat Eurus.

Pluvia $\frac{1}{1}$. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$. 4. 6. $\frac{2}{8}$. 9. $\frac{1}{10}$. $\frac{11}{22}$. 24. 30.
Dig. Dec.

= 1. 324.

Levis Procella 3. p. m. S. w b w 4^x.

8 Altitud. maxim. 7. 30. 0. NN VV 1. } media 29. 6 $\frac{20}{29}$
minim. 3. 29. 2.
Dies frigid. 4. 36. VV N VV 1. } media 29 $\frac{4}{29}$
calid. 20. 22. E 1x.

Variolæ epidemica, sanè sunt haud parùm funestæ; sæpe parvæ, atræ, sessiles cum Foveola in Pustularum medio livida aut nigra — interdum crudo diffluunt *Ichore*, qui subjectam Carnem erodit, imò & nonnunquam ipsa Gangræna afficit — Linguae, Faucesque sub Morbi Declinationem sunt valdè squallidæ, ac frequenter scabræ admodùm & atræ; accedit porrò sæpissimè *Diarrhæa* profusa; aliquando Tragedia clauditur More peripneumonico: — largissimè tamen plerumque expuunt Ægri, præsertim per Initia. Si quid in his *Variolis* malignis possit Medicina, id utiquè faciunt *Alexipharmaca* subaustrera cum aci-

acido plurimo *: *Tinctura* utor sæpissimè *Corticis Peruviani Alexipharmaca* cum multo *Elixire* aut *Spiritu Vitrioli*, sæpe *Vino rubro Gallico* his acidis adjectis, præsertim sub *Febris* Decessu, intereà *Potionem liberalem*, acidulam, demulcentem suadeo atque *Victum idoneum* — Proficiunt hæc interdum maximè, sed utplurimum, atra *Variolas*, atra *Mors* sequitur.

Ubi ingruente Morbo *Variolæ* luridæ, lividæ, aut parùm acuminatæ visuntur, *Febrisque* adest lentior, generosa quædam *Cardiaca* exhibenda sunt, *Epispastica* porrò applicari debent, quicquid contrà reclamatione *Sydenhamius*, ejusque *Sequaces* (quos inter, in plurimis, etiam & ego sum) — *Crocus* hic & *Pulv. Contrayeru. C. Moschus* & *The-riaca Androm.* imò & dulce *Vinum Locum* habent — Miram sanè *Vim* habet *Moschus* per *Cutim* expellendi, nec tamen intereà calefacit nimium: Si crudæ sunt *Pustulæ*, si prorsus aquosæ, *Myrram* adjicio, cui inest *Coctioni* fovendæ plurimum — Atqui quando turget *Sanguis*, furit *Febris*, ardent omnia, porrigere talia bacchantis est *Medici*, non *prudentis*, qui *Diis Manibus* devovet *Ægrotos* — utinam non talia vidissem! — Adeo *Nihil* in hoc Morbo perpetuum est, nedùm utiquè in ullo.

Plena Luna 12°. AUGUSTO. Nova Luna 26°.

Incipiente *Augusto* benigna satis fuit *Tempestas*, ab xi. autem ad *Finem* usque *pluviosa* plerumque & frigida *Vento* mutante subindè; *Initio* *Mensis* *Ros* perplurimus.

Pluvia

* *Essay on Fevers* (Cap. de Variolis) P. 151.

Pluvia ⁱ 1. ⁱⁱⁱ 3. ⁱⁱⁱ 11. — 14. ⁱ 15. ⁱⁱⁱ 16. ⁱⁱⁱ 17. 19. 22.
ⁱⁱⁱ Dig. Dec.
 23. 25. 26. 27. 29. ⁱⁱⁱ 31. = 2.074.
 Procella 17. Nocte S w 4. — 28. w S w 4^x. —
 31. primo Mane S w 4.
 Fulgur & Tonitru 13. Vesperi.

8 Altitud. maxim. 4. 30.0. N VV b VV 1. } media 29. $6\frac{6}{29}$
 — minim. 18. 29.1. S VV 3^x. }
 Dies frigid. 30. 41. N VV 2. }
 — calid. 5. 25. N VV b VV 1. } media 31. $28\frac{28}{29}$

Plurimæ *Variola*, Febres intermittentes passim.
 Tusses frequentes, sub Finem Mensis Anginæ
 aliquæ: Nisi à *Variolis* paucissima Funera.

Plena Luna 10. SEPTEMBRI. *Nova Luna* 25^o.

Et frigidus fuit & valdè humidus hic Mensis;
 Libs sæpe perfremuit; à xvii. ad xxiv. Vultur-
 nius furens, hinc humilis *Baroscopii* Statio, at Maris
 Æstus tumidi, ac inordinati admodum — xxvi.
 vehemens Procella Mane ESE 4^x. Meridie S S
 E 4. Vesperi S S w 4^x. vastissimos concitavit
 Fluctus atque Maris Æstum immensum, qui
 longè latèque inundavit Littora; multò sanè
 magis quàm fuit visum antehàc unquam*.

Pluvia ⁱ 1. ⁱ 3. ⁱⁱⁱ 4. ⁱ 5. ⁱⁱⁱ 6. ⁱ 7. ⁱⁱⁱ 9. ⁱⁱ 10. ⁱⁱ 11. ⁱⁱ 12. ⁱ 13.
ⁱ Dig. Dec.
 15. ⁱ 17. ⁱ 18. ⁱⁱ 20. ⁱ 21. ⁱⁱⁱ 24. ⁱ 26. ⁱ 27. 30. = 4.470.
 Halo amplissimus circa Lunam 8. H. 8 p. m.
 8 Alti-

* Vid. Vol. I. P. 18.

8 Altitud. maxim. 2. 29. 9. VV NVV 2. } media 29. $3\frac{4}{29}$
 ——— minim. 26. 28. 9. }
 Dies frigid. 30. 48. N V 1. }
 — tepid. 9. 34. S S VV 3. } media $39\frac{19}{29}$

Variolæ multæ ; jam verò paulò mitiores ;
Morbilli passim : perpauci certè hîc Morbi ; *Ce-*
lice tamen , *Rheumatismus* , ac *Tussis* quosdam
 vexant ; *Alvi Fluxus* plurimos.

Plena Luna 9°. OCTOBRI. *Nova Luna* 23°.

Nimboſa Tempeſtas hoc Menſe & valdè ſqua-
 lida , *Pluvia* ferè perpetua , immenſa undique *Di-*
luvia ; infremuit *Libs* ſæpiſſimè , intervenit au-
 tem *Caurus* frequenter , haud rarò *Vultur* , xii.
 ac xiii. *Boreas* frigidus

Pluvia $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{14}$ $\frac{1}{15}$
 $\frac{1}{19}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{21}$ $\frac{1}{22}$ $\frac{1}{23}$ $\frac{1}{24}$ $\frac{1}{25}$ $\frac{1}{28}$ $\frac{1}{30}$ $\frac{1}{31}$
 Dig. Dec.
 = 5. 608.

Procella levis 2. S w 4^r. — vehemens admo-
 dum 3. Nocte w S w 4^r.

——— 4. a. m. w b. N 4. — 8. *Vesper* S w
 4^r. — 9. S w 4. — 22. primo *Mane* w S w 4^r.

Fulgur & *Tonitru* 3. Nocte — perpetua *Fulgu-*
ra & *Tonitrua* Nocte 22. S w 4. — *Maximus*
Maris Æſtus 9°.

8 Altitud. maxim. 13. 30. 2. N E 1. } media 29. $4\frac{2}{3}$
 ——— minim. 4. 28. 6. }
 Dies frigid. 13. 60. Gelu. }
 — tepid. 19. 42. S VV b VV 3. } media 48.

Variola passim; *Tormina* & *Alvi Fluxus* plurimos exercent: oriuntur hæc credo majore ex Parte à *Pomaceo* novello — *Poma* namque ob nimium *Madorem* citissimè putrescunt, hinc fortè magis ad *Diarrh. am* disponunt quàm si firmiora fuerant & generosiore *Succo* prædita. — *Tusses sævæ* & creberrimæ, hinc aliquando *Peripneumonia*, aut *Pleuritis* — *Peripneumoniæ* nothæ quoque haud sunt raræ. *Febres* putridæ nonnullæ. In *Genere* tamen multò pauciores sunt *Morbi acuti* quàm quis crederet, habita scilicet *Ratione Tempestatis* infausæ — frequentes forsan *Procellæ* dirimunt pravas ac morbosas *Atmosphæræ* *Congestiones*, vehemens veluti *Motus Oceani* *Aquarum Putrescentiæ* obstat.

Plena Luna 9°. *NOVEMBRI*. *Nova Luna* 23°.

Per *Initia Novembris* pluvia *Tempestas* & interdum *nimbosa*, *Corus* sæpe, haud rarò *Africus*: à x. ad xxi. *Aquilo*, subinde *Malacia*, *Libs* dein *furens* ad xxv. *Boreas* post & *Apricitas* pulchra.

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----|-----|
| | $\frac{iii}{2}$ | $\frac{ii}{3}$ | $\frac{i}{4}$ | | $\frac{iii}{7}$ | $\frac{i}{8}$ | $\frac{ii}{9}$ | | |
| Pluvia | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | | | | | | | | | 11. |
| | | | | | | | | | 13. |
| | $\frac{i}{16}$ | $\frac{iii}{22}$ | $\frac{i}{23}$ | $\frac{i}{24}$ | | | | | |
| | 16. | 22. | 23. | 24. | 25. | Nix & Grando | 9. | 17. | |
| | | | | | | Dig. Dec. | | | |

Pluvia nivosa 20. Nocte = 3. 740.

Procella 2. Meridie S w 4°. — 6. Nocte S w 4°. — 22. Nocte S b w 4. *Circius* vehemens 17. — *Acre Gelu* a 17. ad 21.

8 Altitud. maxim. 29. 30. 5. ENE r. } media 29. 7 $\frac{6}{28}$
 ——— minim. 23. 28. 7. Sb VV 3 }
 Dies

Dies frigid. 20. 69. E b N 1. }
 — tepid. 7. 44. S VV 1x. } media $56\frac{11}{28}$

Pleuriticæ & Peripneumonice Febres intermittentes porrò ac *Variolæ* passim; *Rheumatismi* plurimi: Tusses, Dentium Dolores, Faucium, Auriumque, cum Tumore Glandularum, valdè frequentes — Colica quamplurimos infestat, partim à *Pomaceo* novello, partim etiam ab abundante & acriore Bile; Tormina sæpe sunt admodum sæva magno cum Ardore Urinæ.

Plena Luna 8°. DECEMBRI. Nova Luna 22°.

Altam tenuit Stationem *Barometer* hoc Mense; Aer autem fuit plerumque crassus valdè, sæpe perfrigidus, sub Finem multò lenior — ineunte Decembri Aquilo persæpe flabat, exeunte Corus atque Libs, Vento interdum omninò silente.

Pluvia $\frac{1}{8}$. $\frac{11}{9}$. $\frac{1}{10}$. 11. 17. $\frac{1}{20}$. 21. $\frac{11}{22}$. 23.
 Dig. Dec.

25. 28. Grando 12. Nix 13. = 1. 394.

Procella 11. p. m. ad mediam Noctem durans
 N w b N 4.

MB. 14. H. 9. p. m. N E b N 1. — 24. Vesperi N w 2x.

Altitud. maxim. 14. 30. 6. NE 1. }
 ——— minim. 11. 29. 3. } media $30.0\frac{2}{3}$
 Dies frigid. 14. 70. valdè rigidum Gelu }
 — tepid. 23. 50. S VV b S 3. } media $57\frac{25}{30}$

Morbi colici plurimi, ab Acrimonia Bilis aliqui, plures longè tamen à *Pomaceo* impuro, nec bene defæcato — in his Alvus est plerumque
 cita,

cita, sæpe accedit *Dysenteria* mucosa, sæpe biliosa, aliquando cruenta.

Tusses innumeræ cum Tumore Faucium, Maxillarum, Parotidum — Peripneumonia passim — Febris *catarrhalis* valdè frequens; solvitur sæpe multa effluente crassa ac ardente Urina.

Gallos inter & Hispanos Captivos sævit admodum Febris quædam *catarrhalis* maligna, jugulatque per plurimos: accedunt sæpe *Petechiæ*, hæud rarò *Parotides*, sæpe Pustulæ urentes aquosæ: Dolet Initio maximè Caput, Dorsum, ac Regio Præcordiorum, protinùs supervenit Phrenitis, anhelosa Respiratio, Tremor, Subsultus, brevi Mors.

Tota Pluviæ Quantitas Anno MDCCXLIV.
Dig. Dec.

= 31.444.

Plena Luna 7^o. JANUARIO. Nova Luna 21^o.

Incipiente Anno altum fuit *Baroscopium*, sæpe Boreas, sæpe perflavit frigidus admodum Vulturnus, hinc Gelu acre frequenter: post vicissimum Mensis Diem nunc Libs, nunc Caurus: Aer erat plerumque maximè humidus præsertim Gelu liquante atque Nive.

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|-----|-----|---------------|-----|
| | | | ¹¹¹ | ¹¹ | ¹¹ | | | ¹¹ | |
| Pluvia | 3. | 4. | 10. | 11. | 12. | 13. | 20. | 21. | 22. |
| | ¹¹ | ¹ | ¹¹ | | ¹¹ | | | | |
| 23. | 25. | 27. | 28. | 30. | Nix | 9. | 17. | Grando | 27. |

Dig. Dec.

31. = 2.910.

Gravis procella cum Nive perpetua 9^o. S E 4.

8 Altitud. maxim. 1. 30. 4. N 2.
 ——— minim. 26. 28. 7. S VV 3. } media 22. 6²³₃₀

Dies

Dies frigid. 9. 69. S E 4.

— tepid. 25. 54. S VV 3.

} media 61 $\frac{2}{3}$

11

Morbi colici adhuc passim; Rheumatismi, Pleuritides ac Peripneumonix, & veræ & nothæ, sparsim. Plurimi Faucium, Maxillarum, Parotidum, imò & Capitis sæpe Tumore laborant, accedente Tussi plerumque & Coryza: Ophthalmia frequentes.

Febris catarrhalis maligna jam grassatur maximè, & per plurimos Captivorum mittit ad Inferos; etiam nunc haud rarò Nostrates, qui cum his multùm versantur—Plures sæpe diutissimè trahit, sæpiùs autem magis est acuta & More Peripneumonix, aut Anginæ suffocantis, jugulat—accedunt sæpe Retechia, sæpe Dysenteria cruenta—hæc tamen nec certo Ordine, nec Tempore—Horum multi Gangræna Pedum corripuntur à Erigore forsan & Sordibus.

Plena Luna 5°. FEBRUARIO. Nova Luna 20°.

Frigidus admodùm fuit hic Mensis, Boreas persæpè flavit, interdum Vulturnus, Libs rarissimè: Aer siccus semper & tenuis, Gelu subindè asperrimum: præalta erat Medio Februario Barometri Statio.

Pluvia $\frac{9}{2}$ 5. 9. 14. 19. 22. Grando 2. 6. 23.

Dig. Dec.

Nix 26. 28. = 0. 838.

Nix plurima 26. etsi Ventus erat w S w 3.
Therm. 70.

Magna AB. 9. H. 10. Noctis N N E 1.—Levis H. 7. p. m. E N E 2.

* K

8 Alti-

♂ Altitud. maxim. 18. 30. 6. E N E 2x. } media 29. $8\frac{23}{28}$
 ——— minim. 5. 29. 2. S E 1x.
 Dies frigid. 25. 75. NE b N 1x. }
 — tepid. 15. 58. E S E 2. } media 65 $\frac{13}{28}$

Asthma sævissimum plures premit; Tusses, Pleuritides & Peripneumonix valdè sunt frequentes; imò & sæpe graves admodùm, quippe difficulter & parcè expuitur—Sanguis extractus est perquàm tenax, & crassissimo Glutine obductus, Serum autem viride, aut subflavum, at perliquidum—hoc quoquè in *Rheumatismo* notatur, qui jam haud paucos graviter & diu torquet.

Inter Captivos sævit usque Febris maligna *cattarrhalis*, immensamque Stragem edit; ministrantes Aniculas, imò & quosdam Chirurgos nunc invadit, etiam & occidit.—Sæpe in summo Febris Incremento, sæpe sub Finem, erumpunt Pustulæ aquosæ, urentes, crebrò Papulæ livescentes, interdum luridæ, aut subatræ Maculæ, *Apthæ* frequenter—Nihil horum autem multùm juvare videtur, longè magis enim est ex Re *Ægrotantium* Sputum abundans (modò non sit lividum, saniosum, foetidum, quòd frequenter nimis evenit) blandusque & equaliter diffusus Sudor—profusum verò extimesco semper, qui sæpe oleosus, mox frigidus, tandem fit lethalis; idque certò certiùs obrepente Horrore—Nil in tali Casu magis est ex Usu quàm Vinum rubrum cum Aromaticis coctum—præcipuè si urget *Diarrhæa*, five mucosa, five cruenta: quod frequenter accidit.

Plena Luna 6°. MARTIO. Nova Luna 22°.

Per Initia Martii pluviosa fuit valdè & squa-
lida Tempestas; Aer inde crassus admodum &
humidus; spiravit sæpissime Libanotus, Corus,
crebrò, Vulturnus interdum.

Pluvia $\frac{iii}{4}$ $\frac{i}{5}$ $\frac{i}{6}$ $\frac{ii}{7}$ $\frac{iii}{8}$ $\frac{iii}{9}$ $\frac{iii}{10}$ $\frac{iii}{11}$ $\frac{ii}{13}$ 15. —
17. $\frac{ii}{24}$ 25. $\frac{i}{27}$ $\frac{i}{28}$ $\frac{i}{29}$ Grando & Nix 1. 2.
Dig. Dec.

3. = 4. 694.

Procella primo Mane 1. w S w 4. — 9. No-
cte S w b S 4^x. — 29. Nocte N w permagnæ
Nebulæ à 24. ad 27.

8 Altitud. maxim. 25. 30. 0. N VV 1. } media 29. 5 $\frac{2}{3}$
—— minim. 10. 29. 1. VV 3. }
Dies frigid. 2. 64. S VV b VV 2. Nix. } media 51 $\frac{4}{3}$
— tepid. 21. 42. N 1. }

Tusses valdè frequentes, Tumores Colli, Ma-
xillarum, Capitis undiquè; plurimæ Febriculæ
catarrhales — maligna sævit adhuc maximè inter
Captivos, necnon inter Nautas nostros. — Pleu-
ritides ac Peripneumonix hæud paucæ & veræ
& spurix.

Plena Luna 5°. APRILI. Nova Luna 20°.

Pluvius quoquè erat hîc Mensis & algidus
Corus Initio spirabat, à xiv. ad xxviii. Boreas
ferè perpetuus, Pluvia tamen decidente frequen-
ter ea verò valdè frigida.

Pluvia 1. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
 17. 20. 21. 22. 23. 25. 26. 28. 29. Grando
 Dig. Dec.

gravis 7. 11. = 3. 9 12.

Circius vehemens tota Nocte 3. — prælargus
 Halo circa Lunam 2. H. 10. Noctis — foetidissi-
 ma Nebula per totam Diem 13. S. 1^x. — Glacies
 ubiquè 27. Mane E N E. 2.

8 Altitud. maxim. 16. 30. 1. E N E 2^x. } media 29. 5.
 ——— minim. 21. 28. 8. N 2^x. }
 Dies frigid. 27. 55. } media 48 $\frac{10}{3}$
 — tepid. 14. 40. E 1. }

Rheumatismus passim, *Ochias* solito frequentior,
 eaque certè acerbissima. Pleuritides & Peripneu-
 moniæ, tam veræ quàm nothæ, haud paucos
 corripunt: Tusses, Tumores Faucium, atque
 Dentium Dolores cum Gutturis Asperitate plu-
 rimos: quædam Febres intermittentes, inter ju-
 niores *Morbillose* & *Scarlatinae* aliquæ.

Catarrhalis Febris usque grassatur, diu inter-
 dum trahit Ægrotos, citò sæpiùs Cursum absol-
 vit, sub Finem plerumque expuunt largissimè
 lentam falsamque Pituïtam, crebrò sine ulla
 Tussi, cum importuna sæpe Tussicula, id porrò
 multo cum Levamine; Urina est tenuis utpluri-
 mùm, rarò valdè rubra, Lingua subalbida, vix
 unquam nigra aut scabra, leve tamen Delirium,
 seu Desipientia ferè semper adest Morbi Statu. —
 Plures etiamnum jugulat *catarrhalis* maligna.

Plena Luna 4°. MAIO: Nova Luna 20°.

Blanda satis Tempestas incunte Mense, Euro afflante; post Diem autem decimum uda, frigidaque, Libs ferè perpetuus.

Pluvia 2. 11. — 15. $\frac{1}{16}$. 17. $\frac{1}{18}$. 19. 20. — —
Dig. Dec.

31. Grando 16. — 19. a. m. = 1. 732.

Procella 16. primo Mane S w 4°. Fulgur & Tonitru 19. a. m.

Altitud. maxim. 5. 30. 0. E N E 2. } media 29. $4\frac{26}{31}$
minim. 16. 28. 9.
Dies frigid. 20. 48. VV b N 21. } media 40 $\frac{8}{31}$
— tepid. 6. 33. E 2.

Morbilli, ac Febres Scarlatina hic & per Vietnam epidemica, gravis sæpissimè accedit Tussis & Affectio peripneumonica: queis Nil magis occurrat quàm opportuna Sanguinis Missio.

Multæ Febres Catarrhales adhuc, quædam prævæ admodum & diu durantes: Urina plerumque cruda est valdè, subindè quasi lactea, Nihil prorsus deponens per totum Morbum; Lingua est humida ut plurimum, at squallida & sublutea; atque expuunt affatim, idque fausto semper Omine — contrà ubi Lingua fit nigra & arida, parcèque prodeunt Sputamina, rarè evadunt; mox enim anhelii, delirantes, tremèntes; palpantes facti Fato tandem succumbunt, nisi obstant Vesicatoria, ac Sudor liberalis; qui sanè (nescio unde) jam haud ita facilis erumpit: Alvus etiam fusa largiter Ægrotantibus frequenter succurrit maximè. — Capitis Gravitas & Vertigo

per Initia Febris ferè semper adsunt, leve Delirium verò & Surditas procedente Morbo; toto Decursu Screatus maximus, etsi Tussis interdum abest omninò. — Usque adeò per Salivæ Ductus molitur Natura Crisin.

Variolæ, Febres *miliares* & pustulosæ passim; Scabies frequens, *Ophthalmiæ*, necnon Anginæ aliquæ.

Haud infrequens est Peripneumonia quædam notha, quæ diutissimè sæpe perdurat, demùmque instar Febris lentæ *nervosæ* opprimit Ægrotos, etsi Initio haud parùm exarserat — Horum Sanguis extractus tenuis ut plurimùm & floridus spectatur, quod mala inter Signa semper est, nec largam hujus Effusionem patiuntur tales sine summo Vitæ Discrimine, quamvis valdè difficilis videatur Spiritus ac magna Pectoris Oppressio: Mirum est utiquè quantum detractò Cruore mox debilitantur* — Sæviit hæc præcipuè per Australes Provinciæ Oras; nec fuit alia forsan quàm *Catarrhalis epidemica* in Pulmones maximè conversa — *Camphora*, *Crocus*, *Lap. Contrayerv. Gum. Ammoniac. Oximel. Scillitic.* cum Sero *Sinapino* tenuissimo aptissima fuere Remedia; *Vesicatoria* porrò perquàm utilia. — Pustulis sub Finem erumpentibus, ac Sudore, rarò pereunt.

Plena Luna 30. JUNIO. Nova Luna 18.

Fuit & hic Mensis frigidus admodùm & pluvius, Africo sæpissimè perflante, Coro sæpe, interfuit autem Vulturnus à xxi. ad xxiv. — Aer fuit
maxi-

* Vid. *Essay on Fevers*, P. 225.

maximè crassus ac humidus, tristisque Temper-
stas; hyemalem potius quàm æstivam putares,
adeò omnia sunt uda & squalida: rarò vides Pa-
pilionem, imò vix Muscam; torpent omnia.

Pluvia 1. ¹/₅. ¹/₆. ¹/₇. 8. 9. — 13. ¹/₁₄. ¹/₁₅. 19.
Dig. Dec.
22. 23. 24. ¹/₂₅. 27. 28. = 2. 760.

Tonitru & Fulgura gravissima 22. Nocte in-
ter Horam x. & xii. longè latèque perfremuit
hæc Procella.

Altitud. maxim. 18. 29. 8. VV N. VV 1. } media 29. $5\frac{5}{30}$
minim. 25. 29. 2. S VV 3x.
Dies frigid. 12. 48. VV N VV 2. } media 37 $\frac{11}{30}$
calid. 22. 24. S E 2x.

Crebri adhuc valdè sunt *Morbilli*, quibus sæpe
etiam Adulti corripiuntur: *Rheumatismus*, Tu-
mor Faucium, Angina, Tussis frequens: Fe-
bres intermittentes passim.

Febris putrida maligna jam grassatur multùm,
sæpe cum Pustulis rubellis, sæpe cum *Petechiis* —
enormes interdum *Hæmorrhagiæ* ex Ore, Nari-
bus, Utero accedunt; præcipuè ubi Maculæ præ-
largæ sunt ac lividæ, aut nigræ, aut violaceæ*
— Levis adest Horror Initio, mox Dolor Capitis
& Gravedo cum Vertigine, in plurimis Nausea &
Vomitio; protinùs in omnibus magna Præcordio-
rum Oppressio & Anxietas permolesta, adeò ut
perpetuæ urgeant Vigiliæ, unde certò certius ob-
repat Delirium, tandemque aliquando Veternus.
Urina plerumque est maximè cruda ac tenuis,
rarò aliquid deponens, sub Morbi Finem verò

K 14

inter-

* *Essay on Fevers*. P. 96.

Interdum livida quædam aut fursurosa quasi, nonnunquam etiam nigra prorsus. Lingua, Dentes, Faucesque nigrae, aridae, squalidae sunt, ex Ore foedus admodum exspirat Halitus. Pluribus accidit *Diarrhæa* mucosa, aut subnigra, cum Strigmentis interdum sanguinolentis. — Multi diu conflictant Morbo, haud pauci intra Dies octo succumbunt; nec desunt plures, qui prorsus evadunt.

Maxime sæviit hic Morbus inter Captivos, Nautas atque nostros, multos etiam jam per Viciniam attigit — An ex Contagione, an ab ipsa *Atmosphæra* Constitutione haud certè scio; parum namque contagiosus videtur nisi in ipsis *Nosocomiis*: magna utiquè est undique Virium ac Animi Dejectio apud omnes, etiamque sanos.

Plena Luna 20. *JULIO*. *Nova Luna* 18.

Jam tandem *Æflas* affulget, *Pluviæ* parum nisi ipso Initio & sub Finem Mensis, afflavit plerumque Ventus septentrionalis, australis rarissimè. Sol fuit fervidus sæpe, multò hinc tenuior facta est *Atmosphæra*, & ficcior longè, maximæ subindè Rorationes, interdum *Nebulæ* lenissimè spirante Vento.

Pluvia $\frac{II}{I}$ 1. 2. 3. 18. 19. $\frac{I}{27}$ $\frac{III}{28}$ Dig. Dec. = 1. 208.

8 Altitud. maxim. 30. 30. 0. N b VV 2. } media 29. $7\frac{6}{30}$
 — minim. 1. 29. 2. S VV b S 2. }
 Dies frigid. 30. 36. }
 — fervid. 13. 22. N 1. } media $28\frac{22}{30}$

Febres quædam intermittentes, quædam *Peripneumonix*, *Ophthalmix* plurimæ — *Morbilli* epide.

epidemic, iique sæpe funesti; Tussis vehemens, ac *hectica* Febris, plerumque accedunt, durante diu; sæpe Alvi Fluxus colliquans evanescentibus *Morbillis*, haud rarò *Ophthalmia*, Angina, & Ulcera Faucium succedunt, aliquandò *Parotis* cum *Erysipelate* Capitis; plus semel hoc Mense notavi Faucium & Oris Gangrænam, Maxillæ porrò & Vomeris Ossis Cariem, unde Mortem miserrimam; post *Morbillos* scilicet.

Febris putrida maligna quæ dudum sæviit; dominatur usque, maximè inter Nautas atque Captivos; sæpe cum Maculis parvis, obscuris vel subatris, cum luridis interdum Papulis per totum Corporis habitum; sæpe Pustulæ largæ, erodentes erumpunt: Jam insuper magis urget Vomitus quàm antehac, quem *Diarrhœa* gravis mox excipit: porrò haud rarò multò magis defluunt Sudoribus: adeò tamen parùm hæc juvare videntur, ut potiùs Vires pessudent plurimum — Atqui si Fluxus Alvi citò nimis sistitur, Delirium obrepit certissimè, aut Sopor profundus, cum duro Abdominis Tumore, ac Singultu; quo non aliud magis pestiferum *Symptoma*. Omnes ferè Morbi Statu plùs minùsve delirant, ac surdescent semper — Quicquid fuit emissum Sanguinis vel rutilantem & speciosam habuit Faciem, aut lividam, aut atram, & Muco viridi vel livescente obductum, semperque solutum nimis*. — Proximè mihi accedere videtur hæc Febris ad Naturam istius malignæ quam Anno 1740. descripsi, adeoque Medicina utor eadem ferè, Deo dante, satis feliciter.

Plena

* Vid. *Essay on Fevers*, P. 108.

Plena Luna 1^o—Nova 16^o.

AUGUSTO.

Plena Luna 30^o.

A tertio Die Mensis ad decimum septimum Pluvia multa, & triste Cœlum: flavit Initio Vultur, postea Libs — hinc vero ad Finem usque Apricitas pulchra, longè grata Messoribus; maximæ nunc Rorationes; jamque tandem lætè garriunt Cicadæ innumeræ, porrò Muscæ, modò quasi reviviscentes, volitant ubiquè, valdèque sunt molestæ.

Pluvia ¹¹¹4. ¹¹5. ¹¹6. ¹¹8. ¹¹9. ¹¹10. ¹¹11. ¹¹12. ¹¹13. ¹¹14. ¹¹15.
Dig. Dec. 16. 20. 21. 23. = 3. 5 16.

Multa Fulgura & Procella 8. Nocte S S w 4^r.
— 9. Mane Procella S w b w 4. — 15. Nocte S S w 4^r. Nebulæ magnæ 24. 27. 28.

♂ Altitud. maxim. 28. 30. 0. N N V V 1. } media 29. 5 ⁶/₃₁
— minim. 9. 29. 0. S V V b V V 4. }
Dies frigid. 17. 40. V V b S 3. } media 32 ²³/₃₁
— calid. 3. 25. E S E 1. }

Morbilli frequentes, Variolæ sparsæ, at mitiores: Ophthalmiæ plurimæ, Dysenteria passim. — Sævit adhuc Febris maligna inter Nautas atque Captivos, rarior tamen multò est alibi, nec ita frequenter Petechiis foedata.

Nova Luna 14^o. SEPTEMBRI. Plena Luna 29^o.

Incunte Septembri Pluvia frequens, ab octavo autem Die ad vicesimum octavum, nisi decimo sexto, nulla prorsus, Nebulæ interim sæpius, & Ro-

Rorationes maximæ: Sol fervidus medio Mense, at maxima Pruina xx°. Ventus ab Oriente spiravit toto ferè Mense, à xx°. ad xxviii. vepor admodùm.

Pluvia $\frac{11}{2}$. 3. 4. $\frac{1}{5}$. 7. 8. $\frac{1}{16}$. 28. 29. $\frac{1}{30}$.
Dig. Dec.

— 1. 078.

Fulgur & Tonitru Mane 2°. Procella 22. E.
E 4^x.

Maximus Halo circa Lunam 26. Nocte.

Altitud. maxim. 11. 30. 1. E 1.

— minim. 2. 29. 2. S E b E 2. } media 29. $6\frac{24}{30}$

les. frigid. 24. 46. E 3.

— calid. 15. 26. E S E 1. } media $35\frac{8}{30}$

Variolæ frequentes, *Diarrhææ* & Morbi colici assim; aliquæ *Dysenteria* cruentæ. — Plures ad hæc Febre putrida, maligna laborant cum *Petechiis*, Delirio, Singultu, &c. — *Asthma* sævissimum multos opprimit; plurimique Tumore Faucium, Maxillarum, *Parotidum* vexantur; *Ophthalmiæ* multæ.

Morbilli epidemici etiam inter Adultos, ac plures gulant, sæpe More peripneumonico, sæpe lenta *Ætica* Tabe; haud rarò *Dysenteria* cruenta accedit, sæpiùs verò enormis mucosa *Diarrhæa*, nunquam accidunt dirissima Oris Ulcera, atque indè Maxillarum Caries.

Nova Luna 14°. OCTOBRI. *Plena Luna* 29°.

Tristis fuit admodùm & maximè pluvius hic Mensis, vix Dies unus & alter apricus, Aer valè crassus & humidus; Corus perflavit Initio, post Libs furens sæpissimè, Auster subindè, non rarò sub Finem Vulturnus.

Pluvia

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Pluvia | $\frac{11}{1}$ | $\frac{11}{2}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{111}{4}$ | $\frac{1}{5}$ | $\frac{11}{6}$ | $\frac{11}{8}$ | $\frac{11}{9}$ | 10. | $\frac{11}{12}$ | $\frac{11}{15}$ |
| | $\frac{1}{16}$ | $\frac{1}{17}$ | $\frac{1}{18}$ | $\frac{1}{19}$ | $\frac{1}{20}$ | $\frac{1}{21}$ | $\frac{1}{22}$ | $\frac{1}{23}$ | $\frac{1}{24}$ | $\frac{11}{26}$ | $\frac{11}{28}$ |
| | $\frac{11}{29}$ | $\frac{11}{30}$ | $\frac{11}{31}$ | Grando | 3. | 22. | = | 5. | 896. | | |

Dig. Dec.

Circius vehemens 1°. Mane. Procella 5°. Mane.
S 4.—8. S w 4^r. p. m. Iris vivida lunaris 1. H. 7^r.
p. m.

| | | | | | |
|-----------------|-----|-----|-----------|----------------------------|-----------------------------|
| Altitud. maxim. | 14. | 30. | 2. | E 1. | } media 29. $\frac{25}{29}$ |
| minim. | 5. | 28. | 7. | S 4. | |
| Dies frigid. | 30. | 54. | S S E 2x. | } media 46 $\frac{11}{29}$ | |
| — tepid. | 11. | 38. | S S VV 2. | | |

Morbilli adhuc plurimi : Variolæ epidemicæ ;
Morbi colici & Rheumatismi passim Ophthalmiæ
multæ : quidam Peripneumonia notha laborant ;
aliqui Apoplexia perculsi sunt. Tusses, Coryzæ,
Gravedines, ac Febriculæ catarrhales permultæ ;
Febres lentæ & nervosæ haud raræ.

Nova Luna 12°. NOVEMBRI. Plena Luna 28°.

Venit ab Oriente Ventus ad Diem xiv. ad Sep-
tentrionem vergens plerumque, tunc Aquilo, mox
Auster furens Pluviam demisit plurimam, paulò
tamen pòst rursùm frigidus Aquilo ; ad ipsum
Finem Libs. Atmosphæra fuit ut plurimùm geli-
da, crassa admodùm ac humida.

| | | | | | | | | | |
|--------|------------------|----------------|-----|-----|-----------------|------------------|----------------|----|----------------|
| Pluvia | 1. | $\frac{1}{2}$ | 12. | 13. | $\frac{11}{14}$ | $\frac{111}{18}$ | $\frac{1}{19}$ | 20 | $\frac{1}{21}$ |
| | $\frac{111}{22}$ | $\frac{1}{23}$ | | | | | Dig. Dec. | | |
| 22. | 23. | 26. | 30. | Nix | 15. | 16. | = | 3. | 522. |

Dig. Dec.

Fulgura multa sine Tonitru 1. Nocte S E 1^x
Procella 18. S b w 4.—19. p. m. S w 4^r. Cir-
cius

us vehemens 19. Nocte. Subitus admodum & maximus *Baroscopii* Descensus 18. a 29. 7. scilicet ad 28. 8. intra sex vel octo Horas. Gelu rigidum 16. 17. 21. 25. Densissima & valde foetida Nebula 23. p. m.

Altitud. maxim. 6. 30. 3. E N E 1x. } media 29. $7\frac{2}{3}$
 ——— minim. 19. 28. 7. N VV 4x. }
 Dies frigid. 16. 71. N b VV 1. } media $17\frac{16}{30}$
 — tepid. 1. 46. S E 1x. }

Variolæ undiquè *epidemicæ*, jamque quædam *malæ* admodum sunt *Indolis*; utcunque per totum Autumnum fuerant *benignæ*. *Ophthalmiæ* plurimæ, ac *Epiphoræ* pertinaces admodum. *Pleuritides* aliquæ & *Peripneumoniæ*.

Ineunte Mense *Febris* quædam *catarrhalis* recurrit, seu potius ingruit; vehemens *Dolor Capitis* atque *Pectoris Oppressio* urgent, *Nausea* perpetua ac *Vomitio* pituitosa, *Pulsus* valde *vehemens*, at mollis, rarè *tensus*; *Lingua* sordida, fuliginea, vix unquam *arida*; *Urina* turbida admodum pallidam, at *flavescentem*, prælongam, per totum *Morbi Decursum*, deponens *Subsidentiam*. Expuunt omnes largissimè. — *Sanguis* rarissimè valde *tenax* est, interdum verò nonnihil glutinosus, omnes *Vertigine* & *Somnolentia* nimia laborant. Quosdam *Diarrhæa* lenis liberat, quosdam *Sudor* blandus æqualis, plures liberissima *Sputamina* maximè secta prius *Vena* & prostrata *Vomitio*ne; ubi nimirum *Artis* est *Subsidium* adhibere *Naturæ*.

Nova Luna 12°. *DECEMBRI*. *Plena Luna* 27°.

Incipiente *Decembri* flavit Boreas, consequente frigida & sicca Tempestate: ab xi. ad xv. pluvius Vulturius, paulòque pòst turbidus Auster; sub Finem Mensis Eurus: Aer fuit crassus valdè, & medio Mense humidus maximè.

Pluvia 1. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 19.
 20. 21. 22. 23. — 25. 26. 30. — 3. 4 10.
 Dig. Dec.

Procella 13. p. m. S E b S 4^x. — 19. tota No-
 cte S 4. — 20. Mane S w 4.

———— 23. Nocte S w 4. — 24. tota ferè Die
 S w b w 4.

Altitud. maxim. 2. 30. 4. E N E 1^x. } media 29. 5 ²/₃
 ———— minim. 14. 19. 0. S S E 3^x. }
 Dies frigid. 7. 70. N E 2^x. } media 59 ²³/₃₀
 — tepid. 19. 50. S 4. }

Tussis vehemens, *Asthmatica*, frequens; *Vario-*
la maximè *epidemica* longè latèque; quædam
 confluentes sunt, parvæ, sessiles, nigrae, quædam
 tamen valdè benignæ. — Febriculæ pustulosæ
 (*the Chicken and Swines Pox*) plurimæ inter Pue-
 ros: Pustulas has subrubras & aquosas pro Va-
 riolis sæpe agnoscunt Mulierculæ (nam & Vesti-
 gia crebrò diù relinquunt) haud rarò tamen pau-
 lò pòst tristi Eventu vident Errorem, dum Va-
 riolæ, æque malignæ, reverà invadunt.

Jam increbescunt valdè Febres peripneumoni-
 cæ, periculosæ quidem & haud rarò lethales.
 Aliqui parùm aut nil expuunt plures biliosa ad-
 modùm sincera & perliquida aut spumosa &
 mini-

minimè cocta, nonnulli Saniem ferè subatram : anhelant maximè & summa Pectoris Gravitate premuntur — Majus mihi videtur impendere Periculum Peripneumonicis ubi permagna urget Pectoris Oppressio, & grave quoddam Præcordiorum Pondus, etsi levis tantùm & obtusus adsit Dolor, quàm si Pectore, aut Latere magis acutè torquentur: hìc enim Sanguinis Missio certum plerumque adfert Levamen: in priore Casu, ita sæpe non juvat ut etiam haud parùm sit noxia. Jam utiquè plures occurrunt Peripneumoniæ, ubi immensa est Pectoris Gravitas, & Spirandi Difficultas magna, & Tussis haud levis, & multus in Pulmone Strepitus, quæ vix tamen admittunt Venæ Sectionem* — Sperares forsan magnum à repetita Sanguinis Missione Auxilium, accidit è contra Debilitas maxima, Sputi Suppressio, Anxietas gravissîma, Vigiliæ perpetuæ, mox Delirium, Tremores, frigidi Sudores, tandemque nimis frequenter Mors inopinata; sæpe etiam inter Gemitus & Colloquia. — Atqui hunc Sanguinem inspicere diligenter; nimium semper apparet solutus, quamvis floridus plerumque, & speciosus, & diu Seri tenax: aspice altera Vice detractum Cruorem, Crassamentum lividum vides, & laxum maximè, plurimo fulvo, turbido aut subviridi, aut subrubicundo innatans Sero: tertia, nigrum ferè & saniosum, vix ullo Modo cohærens — Pessîmi hoc semper Ominis notavi in Peripneumonia, & plerumque lethale*.

Sunt autem & nunc multi *Pleuroperipneumonia* laborantes; præsertim Ruricolæ, quibus Dolor est

* Vid. *Essay on Fevers*, P. 108. 211.

est Pectoris aut Lateris vehemens, Tussis violenta, Spiritus ex Ore fervens, interruptus, difficilissimus, Pulsus plenus, durus, atque velox, rubicunda ac turgida Facies — Postulant hæc citam & largam Sanguinis Missionem, imò & repetitam, unde mox relevantur plurimum — Horum autem Sanguis densus admodum & viscosus est, ac dum frigescit Pellicula obductus albida, & coriacea quasi — Porro Sanguine misso, Diluentia subacida, nitrosa, & quæ Sputo movendo sunt, Morbum ut plurimum brevi solvunt.

At prior Peripneumonix Species, hoc Mense, hic magis sæviebat, in qua Urina plerumque Initio erat cruda prorsus, sæpe tenuis, subindè autem quasi lactea, sub Finem verò parca, turbida, subnigra. Lingua atro veluti Mucos oblita, vel ficca admodum & prærubra, Colore Corticis Granati æmula, sæpe tamen glabra valdè, livescens, & splendida quasi, at aridissima, cum Bulla nigra interdum ad Lingux Apicem — Pestifera hæc & funesta sunt; potissimum si saniosa, nigra, & valdè foetida Sputamina ejiciuntur.

Res est herclè non levis Momenti duas has Peripneumonix Species probè distinguere, maxime per Initia Morbi; cum & ingens Pectoris Oppressio & Spirandi Difficultas, Febris Ardor, & Sævitia Tussis, utramque comitentur, & æquè postulare videantur Sanguinis Missionem. Prior attamen, & jam frequentior, Peripneumonia, vix quartam Sanguinis Partem adimi patitur sine summa Virium Ruina, quam posterior & fert facile, imò & sæpissimè poscit. — Unde igitur petenda Distinctio est?

Si Pulsus celer valdè, exilis & contractus est, aut mollis, inæqualis & vacillans, si Anima du-

citur

citur laboriosè & cum frequènte Suspirio, potiùs quàm cum Anhelatione æstuante, si urget magis Pectoris Gravitas quàm Dolor, si Urina cruda est, tenuis, & vapida, si profusi aut inæquales, frigiduli Sudores erumpunt, si Languor magnus & Manus tremulæ, cautissimè profectò mittendus est Sanguis & perparcè; si modò liceat omninò secare Venam. At si frigefactus Cruor nimis apparet solutus, & parùm firmè cohærens, utcunque floridus sit, protinùs siste Manum, ni jugulare vis ægrotantem. Si de mittendo Sanguine dubitas, an scilicet conveniat necne, hoc certè cognosces Signo; nunquam igitur dubio in Casu, prima Vice, esto Laticis vitalis prodigus; qui sæpe corrigendus est utiquè, non profundendus: — At si plenus, velox,ensus, aut durus Pulsus validè vibrat, ardetque Febris, si fervidus expirat Spiritus atque densus, si Pectus dolet admodùm, rubetque Vultus & turget, mittendus semper est Sanguis pleno & Flumine & Modo: etiam bis, terve, repetenda est Venæ Sectio si urget usque spirandi Difficultas atque Dolor, maximè si extracto Cruori inhæret Crusta subflava & glutinosa valdè.

Nunc grassatur plurimùm Febris quædam putrida, diu admodùm sæpe detinens Ægrotos; multisque certè lethalis: haud rarò ad vicesimum Diem, imò aliquando ad tricesimum usque protenditur.

Levis Rigor Initio totum pererrat Corpus; subito mox Calore incertoque exceptus; sic Vicibus alternis: Lassitudo insuper & vagus Dolor omnia fatigat Membra; nunquam non protinùs accedit Capitis Dolor, sæpe acutus admodùm in Fronte, in Temporibus, in Sincipite,

interdum in imis Oculis : Pulsus intereà celer , tremulus, inæqualis est, etiam & haud rarò intermittens planè , ac fortiore Digiti Pressu interruptus prorsùs.— Urina verò tenuis est ac mera quasi Vappa, aut Jumentorum instar turbida*, sed nihil omninò deponens*—haud multùm inarescit Lingua , nec sitiunt valdè, fordescunt tamen semper Fauces—Vomitum interim biliosus, viridis, aut fuscus urget vehementer, sæpe haud Parùm foetidus; Anxietas enormis, Jactatio perpetua, ac Pervigilium contumax, semper, accedente Morbi Statu , Delirium inferunt & Tremores , Tendinumque Subsultus : Sub Finem Lingua Labiaque tremula fiunt, nigra & aridissima, Dentes atrii & sordidissimi . Singultus , Oculi vitrei, Sudores frigidi, Ungues lividi, Pulsusque deficiens, instantem denunciant Mortem; licèt interdum stupidi sine Sensu , Motu , aut Loquela jacent per Dies aliquot integros priusquam extremam agunt Animam, Coxis intereà Natibusque *Necrosi* affectis.

Hoc modo huic Febri succumbunt multi; at sæpiùs multò magis effera sævit—Premitt ipso Morbi *Insultu* Anxietas, & Præcordiorum Pondus immane, acerbissimus Capitis atque Dorsi Dolor, Vomitus perpetua, viridis, atra, horrenda, Singultus continuus, nigrescit Lingua , Dentesque protinùs, furit mox Phrenitis, toto Corpore tremunt , tandemque frequenter *Caro* premuntur , nec evigilant unquàm—Sextum inter Diem ut plurimùm & nonum erumpunt *Petachia*, sæpe lividæ , sæpe etiam aterrimæ , quæ interdum repen-

* Οὐρον ἀνατεταραλμένον , οἷον ὑποζυγίου . Aph. 70. Sect. 4. Vide *Holler.* in Aphorismum.

repentè evanescunt, profuso fluente Sudore, vel *Diarrhœa*; quibus *Ægri* sæpissimè laborant. Crebrò Sanguinem stillant Nares, aliquando profundunt, unde Delirium sæpe mitescit; sed inde Vi-res deprimuntur maximè — quod idem de Fluxu Alvi dicendum est, qui multò sæpius accidit — Citiùs equidem tardiùsve semper ferè, durante Febre, per Alvum molita est Natura *Crisis*, at frequenter nimis Morbus tantùm Morti cessit; haud rarò autem successit Victrix Natura — Si Dejectiones nigræ, perliquidæ, aut saniosæ sunt, & maximæ foetidæ, utiquè nihil spero; præcipuè si absque Voluntate descendunt: nec multò sanè melioris est Ominis inflatum atque durum Abdomen, perdurante Ventris Cursu, præsertim si Singultus advenit, & perpauca redditur Urina: quam subatram penè notavi, imò & nonnunquam planè nigram.

Hanc habes hujus Febris Historiam, Lector; quam sive *Scorbuticam*, sive malignam, sive pestilentem dices, nihil moror; est sanè valdè funesta, atque haud pauca prodit magnæ Putrescentiæ, etiam & Contagii, Signa. Quicquid est, perparcam, si modò ullam, admittit Sanguinis Detractionem, ex majore Vena saltem, sine stupenda Virium Jactura — Vomitum autem plerumque moveo, seu promoveo potiùs: quia Sponte ferè urget semper; Alvumque *Clysmate* duco, si sit astricta. Mitioribus postea utor *Alexipharmacis*, iisque subausteris, & Acido imbutis, inter quæ vix meliora, nedum tutiora, probo quàm Vinum ipsum rubrum cum Aquæ fermè Dimidio, in quo porrò Macis & Cinnamomi paululum sit incoctum, adjecto Malo *Aurantio* Hispalensi tosto, ac deinde contuso & infuso: jucundus admo-

dùm est hic Potus & Morbo percommodus. Si visalia, *Tinct. Rosar. Decoct. Lusitan.* cum *Aq. Cinnam.* & *Sp. Lavend. C.* paululo, Serum & Lactis vinosum tenuissimum, Locum habent: nec ficientibus, atque avidè desiderantibus, nego subindè Vinum *Pomaceum* subtepidum: Sales *Alcalinos volatiles* & *Spiritus*, ut dicuntur, respuo prorsùs*, nisi cum *Salinis* utor *Haustibus*. Hæc, vel similia, præcipio ad Febris usque Statum; intereà verò si vehemens sit Infania, Cucurbitulas scarificatas Humeris Cervicibusque applicari jubeo, sæpe deïn *Epispastica*, maximè si Languor opprimit. Blanda porrò *Eccoprotica* exhibeo tertiis quartisque Diebus, si Alvus est dura nimis — in ipsa Febris ^{Antiph.} parùm certè moveo, perspiciciens diligenter quid Natura faciat, aut ferat.

Si persicca Cutis est & aspera, *Camphoram* cum *Theriac.* aut *Mithridat.* necnon *Haust. salinos volatiles*, aut *Julap. Camphorat.* cum *Aceto*, *Sp. Lavend. C.* & *Syrupo Crocino* præscribo; idque ut plurimum bonis Avibus si blandi Sudores erumpunt, & floridæ Pustulæ urentes — Si parùm hæc proficiunt alia tentanda est Via, per Alyum nempe ac Urinam; adeoque *Rhabarbari* paululùm cum *Sale Succino* & *Nuce Myristica* alternis saltem Diebus ministro, aut *Mannam Calabrinam*, *Cre-morem Tartari* & *Tartar. solubil.* — Si liquidus nimium sit Venter, compesco Fluxum paulatim *Tinct. Rosar. Decoct. alb. Confect. Fracastor.* fortiora *Opiata* suadeo rarissimè; si *Theriacam* excipias — Jam summa mihi Cura est sustentandæ Naturæ molli restaurante Victu, & Medicina idonea; *Panatellam*, Juscula leniora, Panem bis coctum.

* Vid. *Essay on Fevers*, P. 118.

Etum ex Vino, Gelatinam C. C. Sago, Salap. aliaque hujusmodi præcipio — pro Medicamento autem maximè *Tinct. Cortic. Alexipharmac.* quæ mihi longo jam Tempore, Febre putrida declinante, explorata atque probata est; atqui huic semper fermè adjicio *Elixir. Vitrioli* — Hac Methodo herclè, ac Medicina, perplurimos ex ipsis Oraci Faucibus ereptos novi, — surdastros tamen semper, atque stupidos diu; Lingua indelebili penè Nigrore fucata.

Tota Pluviæ Quantitas, Anno MDCCXLV.

Dig. Dec.

fuit = 35. 476.

Nova Luna 10°. JANUARIO: Plena Luna 26°.

Ventus fuit parùm constans hoc Mense, sæpe frigidus, sæpe nimbosus: ab Oriente spiravit Initio, septimo & octavo Libs irruit; à x. ad xvi. Eurus aut Boreas, indè ad vicesimum nonum Corus, aut Libs, hic plerumque furens, ad ipsum Finem Boreas.

| | | | | | | |
|--------|---------------|-----------------|-----|---------------|----------------|---------------|
| | ¹¹ | ¹¹ | | ¹¹ | ¹¹¹ | ¹¹ |
| Pluvia | 1. | 7. | 8. | 16. | 18. | 19. |
| | | | | | | 20. |
| | | | | | | 21. |
| | | | | | | 23. |
| | | | | | | 24. |
| | | | | | | Dig. Dec. |
| | ² | ¹¹¹¹ | | | | |
| | 25. | 26. | 27. | 28. | Grando | 29. |
| | | | | | Nix | 30. |
| | | | | | | = 3. 496. |

Procella 23. Nocte S w b w 4^x. — 25. tota Die S w b w 4.

———— 27. p. m. S w b w 4^x. Circius vehementissimus Nocte inter 27. & 28. Rigidum Gelu & maxima Pruina 5. 6. 13. 14. 15. 29. 31. maximus Halo circa Lunam 20. Vesperi.

8 Altitud. maxim. 1. 30. 4. N E 1. } media 29. $8\frac{7}{18}$
 ——— minim. 27. 28. 8. }

L 3

Dies

Dies frigid. 31. 70. N E 1. } = $59\frac{8}{28}$
 — tepid. 25. 50.

Variolæ adhuc *epidemicæ*, plerumque autem satis benignæ; inter Nautas tamen & Milites haud paucos occidunt: An quòd à pravo Victu & pessima *Spirituum Ardentium* Ingluvie horum Sanguis fit magis acris & putridus? an quòd à *Scorbutica* Lue, imò &c. sæpissimè *venerea*, polluitur?—Hoc sanè perpetuum est, quòd omnis *Febris epidemica* magis est inter hos pestifera quàm vel Oppidanos inter aut Ruricolos. *Faucium Tumores*, & *Tusses* undiquè, *Morbilli* plures & *Rheumatismi*.

Febri putrida, nervosa, maligna usque grassatur, pluresque opprimit, atque multos diu admodum trahit.

Peripneumonix multæ mali admodum *Moris* cum *Spirandi Difficultate* & *Anxietate* maxima, *Dolore* in imo *Pectoris*, atque *Tussicula* perpetua, perpauca sæpe exantlante, sæpe saniosa prorsus. Hæ post tres, quatuorve *Dies* in malignam *nervosam*, aut *petechialem* degenerant, *Viresque* summoperè deprimunt—Vix *Sanguinis* *Missionem* adeò admittunt, multò minus repetitam aut largam*.

Nova Luna 9°. *FEBRUARIO*. *Plena Luna* 24°.

Boreas perflavit sæpissimè durante *Februario*, *Aeremque* fecit ficcum & valdè rigidum, acri admodum sæviente *Gelu*: altam intereà tenuit *Stationem Barometer*—interdum verò *Libs* precello.

* Vid. *Essay on Fevers*, P. 184. — 186.

cellosus *Mercurium* depressit maximè, multamque demisit Pluviam.

Pluvia $\frac{1}{7}$. $\frac{11}{8}$. 15. $\frac{11}{17}$. $\frac{11}{18}$. $\frac{11}{19}$. $\frac{11}{20}$. 21. $\frac{1}{24}$.

26. 27. Nix multa. $\frac{1}{14}$. — 28. Grando gravis 18.
Dig. Dec.

Nocte = 2. 680.

Procella 18. Nocte S w b w 4^r. AB. 9. H.
8. N E 1. — 27. N E 2^r.

8 Altitud. maxim. 2. 30. 6. E N E 1. } media 29. 7 $\frac{27}{28}$
—— minim. 20. 28. 4. S V V b V V 3^r. }
Dies frigid. 13. 76. N N E 2. }
—— tepid. 26. 52. N V V 1. } media 64.

Plurimæ adhuc *Variolæ*, ut plurimum mitiores, Nautis tamen, Militibus, atque Captivis adhuc valdè funestæ, qui quidem evadunt, Furunculis & Ulceribus maximè vexantur, sæpe *hectica* Febre.

Tussis, sævissima, *Asthma* pertinax, Anginæ, Fauciumque Tumores permultos cruciant. — *Rheumatismi*, Pleuritides, ac *Pleuroperipneumoniæ* sunt valdè frequentes.

Dominatur usque Febris quædam peripneumonica, pestilens admodum, pluresque opprimit: magna semper adest Pectoris Oppressio & Præcordiorum, vehemens plerumque accedit Capitis Dolor, vel ipso Initio cum gravi Vertigine, cui mox Delirium: tenuia, cruda, spumosa sæpe expuunt, interdum biliosa valdè, satis liberaliter, at parum aut Nil plerumque juvantia, aliquando foeda, subnigra, & saniosa — intereà haud multum urgere Febris videtur, aut Sitis, nec est Lingua admodum sicca, Muco attamen subatro

frequenter perfusa. Si, adveniente Morbi Statu, Urina (fulva prius & turbida) derepentè tenuis mingitur & aquosa, sequitur mox semper Delirium, brevique post crebrò Singultus, atque lethalis Nervorum Distentio — Haud rarò hanc Febrem solvit *Diarrhœa critica*, utcunque in aliis Pulmonariis sit pertimescendus (nimius saltem) Alvi Fluxus. Læti plerumque etiam est Ominis Pustularum & Ulcusculorum Eruptio circa Labia, licèt molesta est admodum — Papulæ porrò rubræ, urentes per totum ferè Corpus, olido succedentes Sudori, Morbum, præcipuè sub Declinationem, prorsus judicant tota ferè post desquamante Cuticula* — Hoc adeò notans Judicium, quibusdam *Vesicatoria* a Capite penè ad Calcem usque applicari jussi; verùm enim verò Opinione minus jam successit Experimentum.

Nova Luna 11^o. MARTIO. Plena Luna 26^o.

Prior Martii pars fuit sicca valdè & frigida, Borea flante cum rigido sæpe Gelu; a xii. ad xxi. Vulturnus plerumque, Pluvia frequenter cadente, Libs interdum; ad Finem recurrit Boreas.

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|--------------|--------------|----------------|-----|---------------|---------------|-----|
| | | ⁰ | ¹ | ^{III} | | ^{II} | ^{II} | |
| Pluvia | 6. | 7. | 14. | 16. | 17. | 19. | 20. | 21. |
| | | | | | | | | 22. |
| ^{II} | | ¹ | | ¹ | | | ^{II} | |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 29. | 30. | 31. | Nix | 8. |
| | | | | | | | | 10. |
| | | | | | | | | 11. |

Dig. Det.

= 3. 072.

AB. 14. Vesperis & Nocte w N w 1. Peramplus Halo circa Lunam 15. Vesperis w S w 1^x. maxima Nebula Mane, Vento silente.

8 Alti-

8 Altitud. maxim. 3. 30. 5. N E 1. }
 ——— minim. 23. 28. 8. S S VV 3. } media 29. 5 $\frac{27}{30}$
 Dies frigid. 1. 69. N E b E 1. }
 — tepid. 18. 48. S E b E 2. } media 56 $\frac{2}{3}$

Variolæ Sporadicæ; Morbilli jam iterum sunt valdè frequentes, sæpe etiam malæ prorsus Naturæ; quippe qui, haud faciliè erumpentes, luridi sunt, aut lividi, quibus semper accedit Tussis sævissima, interdum Peripneumonia gravis, aliquando Tormina dira — Tusses, laboriosæ admodum, creberrimæ; Angina & *Asthma* frequens valdè. Plures Sanguinis Sputo corripuntur: Tabidi & Pulmonarii jam pessimè se habent.

Ubiquè nunc sæviunt Peripneumoniæ & *Pleuroperipneumoniæ*, æque sæpe valdè periculosæ: sunt qui nihil omninò expuunt aut difficillimè, sunt qui cruda & tenuia, parùm aut nil juvantia, sunt etiam qui saniosa prorsus ac valdè olida: Qui verò cocta, liberalia Sputa, pauxillo Sanguine tincta extussiunt faciliè, intra perpaucos Dies Morbo liberantur — atqui priora mali semper sunt Ominis, nec Pectus, nec Præcordiorum Oppressionem, nec Anxietatem levant, nedùm Febrem — Sed mox ab Initio ferè delirant tales, aut enormi debilitante Alvi Fluxu corripuntur; qui mox omninò Sputa suppressit, pessimo semper Eventu — at longè melioris Tessera Fati est Urina copiosa, turbida, plurimùm subflavi Sedimenti deponens; cruda verò & aquosa est admodum perniciofa, prærubra autem & parca Nihil Boni denunciat* — Quibus, ingruente Morbo, Sanguis extractus est, eique supersternitur Pel-

* *Essay on Fevers*, P. 217.

Nova Luna 9°. APRILI. Plena Luna 24°.

Pluvia $\frac{u}{5}$. $\frac{v}{7}$. 8. 11. 16. 17. $\frac{iii}{19}$. $\frac{i}{20}$. $\frac{i}{21}$.
 $\frac{i}{22}$. $\frac{i}{24}$. 26. = 1,960.
 Dig. Dec.

8 Altitud. maxim. 27. 30. 2. N b E 1. } media 29. $\frac{28}{29}$
 ——— minim. 20. 28. 9. S 4.
 Dies frigid. 4. 62. E b N 1. }
 — tepid. 29. 36. VV N VV 1. } media 48 $\frac{18}{29}$

Angi-

* *Essay on Fevers*, P. 186.

Angina frequens valdè, necnon Pleuritis, Peripneumoniæ veræ; & Pleuropneumoniæ permul-
tæ, æque tanæ haud rarò lethales, maximè cum
Angina subitò in *Pulmoniam* mutatur — est etiam
& jam passim insolita quædam Pleuritis (si sit ita
nominanda) ubi inter Scutula operta acerrimus
sævit Dolor, qui ad Sternum * usque protendi-
tur, maxima cum Gravitate Pectoris & Spirandi
Labore, interdum & per totam Dorsi Spinam &
Hypochondrium immaniter cruciat, adeò ut vix
respirare aut tussire valeant, imò omni Molimine
Tussim aliquando suppressere nituntur ob Dolo-
ris Vehementiam; volunt se subindè in Lecto esse
erectos, mox vero ejulantes, impatientes, atque
prorsus impotentes recumbunt; urget adeò Ja-
ctatio perpetua, Anxietas horrenda, Tormentum
intollerabile, Verbo *Hippocratico*, Δυσφορία gra-
vissima; continua vexantur Tussicula, at parùm
aut Nil expuunt, vel spumosa & cruda penitus;
accedit interdum Singultus, quem paulò pòst se-
quitur inæqualis, frigidus, oleosus Sudor, brevè
que Mors. Est profectò acutissima Febris; &
intra perpaucos Dies jugulat: robustum quen-
dam Juvenem quarto Die inter tussendum vio-
lenta Nervorum Distentione correptum atque
abreptum novi. — Estne Morbus, quem *Hippo-
crates* πλευρίτιν ἐν κώτῳ, seu κωτιαῖδα † vocat, Inflam-
mationem nempè vel *Diaphragmatis*, vel *Media-*
stinæ

* Vid. *Essay on Fevers*, p. 239. † Sic describitur, Lib. 2.
de Morb. Sect. 54. Edit. *Linden*. Πύρος ἢ πυρετός ἢ βῆξις ἢ
δυσπνοία λαμβάνει — πόνει μάλιστα τὸ μετὰ φρένον ἢ τοὺς
βουβῶνας — rursum Lib. 3. Sect. 21. τὸν κώτον ὀδυνᾷται ὡς
πληγῆς ἢ σέει ἢ ἀναπνέει ἄδρόον — ὀδύναι δὲ ὀξείαι διὰ τῆς
ράχιος ἐς τὸ στῆθος ἢ εἰς τὸν βουβῶνα τείνουσι.

lini — Vox *Paraphrenitis*, qua denotatur inter Recentiores Inflammatio *Diaphragmatis*, nusquam apud *Hippocratem* legitur.

Summum hic Præsidium est in opportuna Sanguinis Missione, Nitrum mox & Sperma Ceti cum Camphoræ paululo opitulantur; porro Oleum Lini recens, sive Amygdalinum cum Elixire Asthmatico & Diacodio, post Venæ Sectionem admodum juvare videtur, ad relaxanda nimirum Vascula nimis constricta, & ad Dolorem sedandum — Quibus autem Pleuriticis, aut Peripneumoniacis, Sputa copiosa, subflava, & modico Sanguine tincta ejiciuntur facilè, in Vado brevi sunt, idque sæpe intra perpaucos Dies — Horum sanè vix aliquis perit — Non ita tamen si cruda, tenuia, spumosa, aut merè sanguinea, aut saniosa, aut atra, extussiuntur: Hi namque Perpetua vexati Tussi parùm, aut Nil levantur, tandemque vix undecim elapsis Diebus Morbo succumbunt, vel purulenti fiunt & tabidi Pedum Tumores aquosi, Febricula sub Noctem, Tussicula sicca & Spiritus difficilis, hoc denunciant, quæ profectò jam post Febres pulmonarias, multò sunt frequentiora solito.

Alia igitur atque alia in Morbis, nunc Vulgaribus, tractandis, datur Erroris Ansa; plures enim ab ipso Febrium Initio profusis Sudoribus corripuntur, alii *Diarrhœa* serosa prælonga — crederes hæc forsitan Morbi Solutionem — minimè verò; quid quòd, exhausta liquidiorè Sanguinis Parte, restant Humores magis crassi, confusi, acres — Fateor me nuperrimè vidisse duas, tresve Febres *Mesentericas* (ut cum *Baglivio* loquar) per Alvi Fluxum judicatas, sed erat sub *Diaphragmate* Tensio, Dolor, Gravitas; perperam verò pro Peri-

Peripneumonicis epidemicis habitæ fuerunt; atque in harum una curanda mirabatur maximè Chirurgo Pharmacopæus me Potionem Catharticam imperasse, omiſſa Venæ Sectione; at id ego factis feliciter.

Summa porrò Opus est Cautela in Pulmonaria quadam notha medenda, quæ jam etiam subindè occurrit; ita lento incedit Pede, ita parùm Doloris urget, dum maxima interim adest Oppressio, ut vix de Ægritudine querantur priusquàm de Ægrotis actum est penitus, quos servassent ex facili matura Auxilia, scilicet *Epispastica* frequentia, lenis Alvi Ductio, & *Emetica* blanda, Diluentia insuper idonea, ac Detergentia modica; hæc inter Serum Lactis *Sinapium* primum fortasse obtinet Locum — Adjiciam verò & hoc obiter, quod perrarè Sanguis in hoc Morbo, nisi Cucurbitulis scarificatis, atque ipso Initio, detrahatur commodè.

Nova Luna 9°. MAIO. Plena Luna 23°.

Incipiente Mense perpulchra & valdè calida Tempeſtas, poſt autem frigidior, aliqua cadente Pluvia: ab undecimo ad decimum octavum ſudum rursùs & fervidum Cœlum, aspirante Subſolano, maximæ interim Rorationes — inde verò Pluvia frequens ad Finem uſque, Africo flante à xxvi. ad xxxi.

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------------|------|------|---------------|---------------|---------------|-----|---------|
| | | | | | ^{II} | ^{II} | ^{II} | | |
| Pluvia | 4. | 5. | 7. | 12. | 17. | 19. | 20. | 21. | 25. 27. |
| | ^I | ^I | | | | | | | |
| | | | Dig. | Dec. | | | | | |
| 29. | 30. | 31. | = | 1. | 760. | | | | |

Fulgur ſine Tonitru 16. 17. Nocte — Fulgur & To-

& Tonitru 19. p. m. Fulgura ac Tonitrua sæva
25. p. m.

⌘ Altitud. maxim. 5. 29. 9. N VV b N 1. } media 29. $4\frac{25}{29}$
 ——— minim. 31. 29. 0. S VV 2. }
 Dies frigid. 6. 43. S E b E 2. } media 30 $\frac{24}{29}$
 — fervid. 15. 19. N N E 1. }

Variolæ epidemicæ, Morbilli plurimi — Febres aliquæ biliosæ, valdè periculosæ; scèdatur interdum Facies etiam in Peripneumonicis — *Dysenteria* frequens, imò & aliquando cruenta, Pleuritides & Peripneumoniæ multæ adhuc, at jam bene instituta Sanguinis Missio, Sputaque subcruenta aut subflava brevè Morbum solvunt. Arthritides sævæ, & pertinaces admodum etiam hac Tempestate — Plures à *Phthisi* pulmonaria pereunt.

Nova Luna 8°. JUNIO. Plena Luna 22°.

Per Initia Mensis pluviosa valdè & frigida Tempestas, ab octavo autem ad decimum quintum Apricitas, Cauro spirante aut Aquilone; indè ad Finem usque horrida, squalida, frigida Tempestas, algido Libanoto ferè semper furente, qui *Atmosphæram* fecit crassam valdè & maximè humidam.

Pluvia $\frac{I}{1}$. 2. $\frac{II}{3}$. $\frac{II}{4}$. $\frac{III}{5}$. 6. 7. 16. $\frac{III}{18}$. 19.
 Dig. Dec.
 $\frac{II}{20}$. $\frac{II}{21}$. 24. 25. $\frac{I}{26}$. 27. 28. 30. = 3. 070.
 Procella 4. 5. S w 4^x. — 25. Nocte S S w 4^x

⌘ Altitud. maxim. 11. 29. 8. N 1. } media 29. 5.
 ——— minim. 4. 28. 8. S VV 4^x. }

Dies

Dies frigid. 7. 42. S VV b VV 2.

— calid. 15. 26. Malacia.

34 $\frac{8}{25}$

Morbilli usque valdè frequentes, sed jam multò magis eminentes ac pustulosi sunt quàm ineunte Vere, nihilominùs tamen sævissima Tussis, interdum Peripneumonia vehemens, hos etiam comitatur.

Variolæ quoquè plurimæ, eæ autem benignæ sunt ut plurimùm, utcunque exitiales sunt pustulosi *Morbilli* — *Pleuritides* & *Peripneumoniæ* passim; *Dysenteria* aliquæ. *Ophthalmiæ* & *Lippitudines* jam sunt frequentes admodùm.

Nova Luna 7°. *JULIO*. *Plena Luna* 21°.

Pluvius, algidus & tristis fuit hic Mensis, *Decembrem* potius quàm *Julium* adesse crederes; venit plerumque ab Occidente Ventus, vergens ad Austrum, & sæpe nimbosus; Aer interim nebulosus & maximè humidus — omnes Fructus crudi sunt prorsùs & planè fatui — Myriades Limacum perreptant undiquè, vix autem volitat Papilio — Omnium Arborum Frondes Foliaque, Mare spectantia, nigra sunt & veluti combusta.

Pluvia $\frac{iii}{1}$. 2. $\frac{iii}{5}$. 6. 9. $\frac{ii}{10}$. 14. — 16. $\frac{ii}{18}$. 19.
 $\frac{ii}{20}$. $\frac{i}{21}$. 22. 23. — $\frac{i}{24}$. 25. $\frac{i}{26}$. 28. 29. 30.
 Dig. Dec.

= 3. 604.

Fulgur & Tonitru 3. p. m. plurima Fulgura 18. Nocte, levis Procella 18. Nocte SS E 4^r. Dies æstuofo 15. 16. 17. 18.

8 Altitud. maxim. 8. 29. 9. VV 1. } media 29. 5 $\frac{12}{19}$
 ——— minim. 19. 29. 2. S VV 3. }
 Dies

Dies frigid. 24. 38. VV b S 3. } media 31 ¹⁸/₂₈
 — fervid. 17. 18. S 1.

Variolæ Modò valdè *epidemicæ*, magisque etiam funestæ; utpotè sæpe confluentes, sessiles & atræ, sæpe crudæ, aquosæ, diffuentes; dira interdum excitant in Faucibus Ulcera, & enormem Salivæ acris Fluxum.—Morbilli adhuc grassantur.

Ophthalmiæ perplurimæ cum *Epiphora* maxima atque acerrima, Dolor Dentium porrò plurimos torquet: in utrisque crebra *Catharsis* juvat magis quàm Missio Sanguinis—Gravis in Pulmones Distillatio plures infestat, unde haud pauci in *Phthisin* pulmonariam incidunt.—Multi *Rheumatismi* & *Pleuritides* incipiente Mense, necnon *Peripneumoniæ* aliquando cum *Petechiis*.

Non solùm *Variolæ*, sed & omnes penè Morbi, jam peioris sunt Indolis quàm regnante Vere—An ab algida udaeque Tempestate Cutis Meatus occludente, ac perspirantes Humores reprimente; unde serosa genita est Colluvies, eoque forsan acrior, quò magis Bilem Sanguinemque adusserat Fervor Solis immodicus durante Maio; qui porrò è Terra immensam Vaporum Copiam excitavit, quam & *Junio* & *Julio* Mense, sub Forma Pluviæ, ruentem vidimus?

Terribilis jam sævit *Scorbutus* inter Nautas, præcipuè quos secum reduxit *Martin*, Classis occidentalis Præfectus; excruciantur perplurimi Ulceribus scædis, lividis, sordidis ac valdè fungosis: mirum est profectò, & insolitum, quàm brevi Tempore spongiosa Caro, Fungi ad instar, his Ulceribus succrescit, etsi paulò ante Scapello derasa, eaque interdum ad Magnitudinem enormem.—Non solùm miseris his, at verè utilibus

libus Hominibus, per se infensa est maximè *Scorbutica* Lues, sed & illos etiam omni penè Morbo, qui ab Humorum Corruptione pendet, obnoxios admodum reddit; Febribus nempe putridis, malignis, *petechialibus*, pessimo *Variolarum* Generi, *Dysenteriae* cruentæ, *Hæmorrhagiis*, &c. — multò magis adeò bonis his fuit Exitio quàm bellicum Fulmen.

Nova Luna 5°. AUGUSTO. Plena Luna 19°.

Favente tandem ter optimo Numine effulget Apricitas, exoptata diu; læta hinc Messis, optimæ Segetes. Ventus per Initia Septentrionalis, post undecimum deflexit ad Occidentem, at à vicesimo tertio spiravit rursus ab Arcto ad Finem usque ferè: intervenit sæpe Malacia, Libs rarò, Aer verò frequenter nebulosus & humidus: maximæ sæpissimè Rorationes.

Pluvia 8. 14. 15. 16. 18. 24. 25. 26. 30.

Dig. Dec.

31. = 0. 846.

Fulgur & Tonitru. 24. primo Mane.

| | | | | | | | |
|------|-----------------|-----|-----|----|-----|----------------------------|-----------------------------|
| 8 | Altitud. maxim. | 28. | 30. | 0. | NNE | 1. | } media 29. 7 $\frac{1}{2}$ |
| — | minim. | 16. | 29. | 5. | SVV | 3x. | |
| Dies | frigid. | 27. | 36. | N | 1. | } media 30 $\frac{13}{30}$ | |
| — | calid. | 3. | 24. | N | 1. | | |

Variolæ adhuc *epidemicæ*, quædam parvæ, atræ, malignæ, jam sæpe cum enormi Alvi Fluxu subatro. *Ophthalmiæ* & Dentium Dolores acerbis usque frequentes. Perpauci aliter Morbi.

Lætè jam tandem canunt Cicadæ, reviviscunt demùm Papiliones. Noces avellanæ copiosissimæ.

Nova Luna 4°. *SEPTEMBRI*. *Plena Luna* 18°.

Atmosphæra fuit admodum humida; imò & interdum algida hoc Mense; Libs sæpe Initio, sæpe Corus, medio Mense Aquilo, qui paulò sicciorem & rigidiorẽ fecit Aerem, adeò ut xiv. & xxi. gelaret.

Pluvia $\frac{11}{2}$. $\frac{2}{4}$. $\frac{3}{5}$. 7. $\frac{2}{9}$. 10. $\frac{1}{12}$. 15. 16. 18.
Dig. Dec.
19. 22. — $\frac{11}{23}$. 24. $\frac{11}{26}$. $\frac{1}{27}$. $\frac{11}{29}$. 30. — 3. 178.

Procella 5. p. m. S w 4^r. — 29. p. m. S w b S 4.

8 Altitud. maxim. 14. 30. 1. N b E 1. } media 29. $6\frac{2}{3}$
—— minim. 29. 29. 0. S VV b S 4. }
Dies frigid. 21. 54. N b E 2. } media 39 $\frac{21}{3}$
—— tepid. 9. 33. VV 2. }

Variolæ usque grassantur: *Ophthalmiæ* frequentes, ut plurimum humidæ. — Tumores Fau-
cium, Capitis, Colli cum sævo Dentium Dolo-
re innumeros vexant; Destillationes ac Tussès
plurimæ — Febres miliares compositæ, (nempe
ubi cum Papulis subalbidis commisceantur Pu-
stulæ rubræ) crebræ sunt valdè apud *Totness*, &
in australi *Devonia*.

Nova Luna 3°. *OCTOBRI*. *Plena Luna* 18°.

Frigidus insequitur *October* oriens nimirum
Boreas Die quarto, ad vicesimum tertium usque
duravit, si decimum nonum excipias; siccus hinc
Aer, at frigidus ut plurimum, imò interdum Ge-
lu haud leve; sub Finem prævalebat Vultur-
Pluvia

Pluvia $\frac{1}{1}$. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{19}$. $\frac{1}{21}$. $\frac{1}{23}$. $\frac{1}{24}$. $\frac{1}{25}$. $\frac{1}{26}$. $\frac{1}{28}$.

$\frac{1}{1}$ Dig. Dec.

Nix & Grando $\frac{1}{22} = 2$. $\frac{1}{23}$ 8.

Procella 1. p. m. S w 4. — 23. ab Hora 11. a. m. ad 4. p. m. S w 4. etsi Mane acre Gelu Ventusque N E 1. — 26. a. m. S w 4. Circius vehemens 25. p. m. Fulgura 23. Nocte. AB. 7. N N E 1.

Altitud. maxim. 6. 30. 4. N E 1. } media 29. $8\frac{10}{28}$
 ——— minim. 24. 28. 8. S S V V 3. }

Dies frigid. 23. 64. N E 1. } media $51\frac{12}{28}$
 — tepid. 1. 42. S V V 4x. }

Variolæ adhuc *epidemicæ*, sed paulò mitiores; Plures etiamnum *Ophthalmia* vexantur; per multi acutissimo Dolore Dentium atque Aurium, cum Faucium ac Glandularum Colli Tumore: Tusses vehementissimæ passim, imò haud pauci jam Morbis peripneumonicis & rheumaticis laborant.

Nova Luna 2°. NOVEMBRI. *Plena Luna* 17°.

Ab ipso Mensis Initio ad xviii. aut Boreas flavit, aut Eurus, isque sæpe perfrigidus, Cælum fuit intereà frequenter caliginosum, decidente subindè Pluvia; post xix. interdum turbidus Austro, Septentrio interdum.

Pluvia $\frac{1}{1}$. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{8}$. $\frac{1}{10}$. $\frac{1}{11}$. $\frac{1}{12}$. $\frac{1}{13}$. $\frac{1}{14}$. $\frac{1}{18}$.

$\frac{1}{20}$. $\frac{1}{21}$. $\frac{1}{23}$. $\frac{1}{24}$. $\frac{1}{25}$. $\frac{1}{26}$. $\frac{1}{27}$. $\frac{1}{29}$. $\frac{1}{30}$. Nix & Dig. Dec.

Grando 19. $\frac{1}{22} = 3$. $\frac{1}{30}$ 6.

Procella 20. Nocte S 4. — 21. Mane S 4^r. — 22.
Vesperis N W 4.

———— 30. p. m. S S E 4. Nebula densissima
18. Malacia.

8. Altitud. maxim. 4. 30. 2. E N E 2x. } media 29. $5\frac{26}{28}$
———— minim. 21. 28. 6. S S VV 3x. }
Dies frigid. 7. 68. E N E 2x. } media $58\frac{4}{28}$
—— tepid. 21. 50. }

Variolæ nunc sunt Moris plerumque benigni ;
Tusses *convulsivæ* sævissimæ inter Pueros undi-
què, plurimæ admodum & vehementes etiam
inter Adultos cum Tumore Capitis, Colli, Fau-
cium, sæpe & cum acerbo Dentium Dolore :
Ophthalmiæ passim, necnon Anginæ mucosæ :
Multi *Rheumatismo* pertinace atque *Arthritide*
laborant.

Gignit plerumque gelidum humidumque Au-
tumni Cælum Colluviem serosam, quæ nunc ad
Caput Pectusque ruit, nuuc ad Artus, frequenter
ad Intestina defluit, unde *Catarrhi*, Tusses, *Rheu-
matismi*, *Arthritis*, *Diarrhæa*, *Dysenteria* tunc
Temporis ita sunt communes — Quòd si *Æstas*
fuerit calidior solito, subitoque excipitur Frigore,
gravissima sæpe Mala incautis accidunt.

Nova Luna 1^o. — DECEMBRI: *Nova Luna* 31^o.
Plena 16^o.

Pluit, quod solet, frequenter hoc Mense, Aer
verò fuit crassissimus ac humidus maximè : Libs
ferè perpetuus ad vicesimum secundum, postea
Vulturnus, aut Boreas frigidissimus ad Finem
usque. *Densitas Atmosphære Barometrum* susti-
nuit ad altam satis *Stationem*.

Pluvia

Pluvia $\frac{1}{1}$ $\frac{11}{2}$ $\frac{1}{3}$ — 5. 7. — 9. $\frac{1}{11}$ $\frac{16}{12}$ $\frac{1}{13}$ 14.

— 16. $\frac{1}{17}$ 19. 21. $\frac{1}{24}$ $\frac{111}{26}$ 27. = 2. 780. Dig. Dec.

Gravis Procella 12. Vesperi S w b w 4^r. AB.
28. H. 7. p. m. E N E 2.

8 Altitud. maxim. 22. 30. 3. N N VV 1. } media 29. $7\frac{25}{32}$
— minim. 12. 29. 0.

Dies frigidiss. 31. 76. N E b E 2. } media $56\frac{13}{32}$
— tepid. 5. 50. S VV 2.

Peripneumonix passim, Ophthalmix plurimæ; Tussēs undiquē, eæque sævissimæ, quibus tamen vexantur maximè Pueri, quos non rarò Distentio etiam Nervorum corripit. Arthritis pertinax ac Rheumatismus multos cruciant.

Variolæ adhuc sæviunt plurimùm, multoque magis jam funestæ sunt, confluentes quippe, erudæ, luridæ, aquosæ; quædam diffluunt valdè ac nigrescunt. — Per Salivæ Ductus & Alvi quærit plerumque Natura Morbi Exitum — Urina copiosa hypostatica nunquam non juvat — Lenia adeò Eccoprotica cum Diureticis semper ferè exhibeo declinante Febre: Morbo autem crescente, seu potiùs ad Statum procedente, quæ Concoctionem Humorū promovent; qualia sunt Lap. Contrayerv. Myrrh. Mosch. Mithridat. Theriac. Andromach. &c. — Nec verum tacere debeo eximias Ficum & Cicerum Dotes ad Variolas maturandas, quas tanti fecerunt Arabes; apud quos sanè prima Variolarum Historia — Imò & ipsa Potione Coffee hunc ad Finem utor sæpissimè feliciter.

Totius Pluviae Quantitas, Anno MDCCXLVI.

Dig. Dec.

$$\text{fruit} = 31.990.$$

Plena Luna 15°. JANUARIO. Nova Luna 29°.

Incipiente Anno asperissimum Gelu Ventusque borealis, post Diem quintum Vulturus Pluvia- que aliqua, mox Libs perpetuus, atque tristis ac- uda Tempestas: Aer maximè humidus, Sol ferè nullus, Pluviæ plùs satiss.

Pluvia ¹5. ¹6. ¹8. ¹9. ¹10. ¹11. ¹13. ¹14. ¹15. ¹16.
¹18. ¹19. ¹20. — ¹21. ¹22. ¹23. ¹25. ¹26. ¹27. ¹28. ¹30.
Dig. Dec.

31. Nix 5. Grando 20. = 4, 616.

Proc. 15. Nocte S. 4. Levis AB. 2. H. 10.
p. m. E. N. E. 2.

♂ Altitud. maxim. 1. 30. 2. E N E 3x. } media 29. 4.
 ——— minim. 16. 28. 8. S S V V 3x. }
 Dies frigidissim. 1. 78.
 ——— tepid. 30. 50. S b E 3. } media 57.

Multi *Variolis*, plures *Febre catarrhali* laborant; *Tusses* innumerae, sæpe vehementes; *Rheumatismi* valdè frequentes, necnon *Dentium* sævi *Dolores* cum *Tumore Capitis*, *Colli*, *Faucium*que. — *Tussis convulsiva* pessima inter *Pueros* grassatur pluresque strangulat; *Sanguinem* persæpè expuunt, & haud levis interdum accedit *Febris*: His *Sanguinem* mittere necesse est prorsùs, imò aliquando bis, terve, etiam bimulis trimulisve; accurata dein instituenda est *Dieta*, blanda porrò *Ventriculi* & *Intestinatorum* *Purgatio*; quibus peractis

actis Corticis Peruviani Decoctum cum Tussilagine & Balsamo Tolutano, uno alterove appposito Vesicatorio, Morbum fugat; sed commodum est omninò Respirationem expedire & Anacatharsin Solutione Gum. Ammoniac. in Expressione Mil-leped. ex Aq. Hyssopi. Atqui profectò haud pauci exindè in Rachitidem incidunt — Scabies per multos inter Popellum atque Nautas infestat.

Plena Luna 14°. FEBRUARIO. Nova Luna 28°.

Per Initia Mensis perflavit Notus, intercurrente subinde Coro; Pluvia autem quotidie ad decimum quintum usque, Aerque humidissimus: tunc Boreas ficans & gelidus valdè, sub Finem Vulturnus velox, ac pluviosus.

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-----------------|----------------|-----|---------------|-----|-----------------|---------------|-----|-----|----------------|
| Pluvia | $\frac{11}{1}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{11}{3}$ | 4 | $\frac{6}{5}$ | 6 | $\frac{1}{7}$ | $\frac{1}{8}$ | 9 | 10 | $\frac{1}{11}$ |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| | $\frac{1}{13}$ | $\frac{11}{14}$ | 15 | 25 | 26 | 27 | $\frac{11}{28}$ | Nix | 16 | 17 | |
| | 13. | 14. | 15. | 25. | 26. | 27. | 28. | Nix | 16. | 17. | |
| Dig. Dec. | | | | | | | | | | | |
| = 2. | 888. | | | | | | | | | | |

Procella 5. p. m. w. S w 4. — 8. a. m. S S w 4. — 13. Nocte S w 4^r.

| | | | | | |
|-----------------|-----|-----|---------------|---------------------------|----------------|
| Altitud. maxim. | 23. | 30. | 2. | E N E 1x. | } media 29. 6. |
| minim. | 14. | 29. | 0. | S VV 3. | |
| Dies frigid. | 18. | 73. | E N E 2. | } media 58 $\frac{5}{12}$ | |
| — tepid. | 4. | 50. | S VV b VV 2x. | | |

Variolæ adhuc frequentes: Febres aliquæ putridæ, nervosæ, lentæ: Gravissimi passim Asthmatis Paroxyismi, Tussis admodum sævit. Pleuritide plures aut Pleuroperipneumonia corripuntur, plurimi Rheumatismo cruciante: Scabies est per frequens undique.

Colica quædam biliosa jam plurimos torquet; acerbissimus Stomachi Dolor, ac perpetuæ Vomitiones urgent, nunc Alvus est citissima, nunc astricta maximè; ne vel *Catharticis* fortissimis cedens priusquàm Missione Sanguinis, Fotuque amolliente, solvitur nimia Intestinorum Strictura: — hæret sæpissimè in ima Parte dextri Hypochondrii acutissimus Dolor & pertinax admodum, cujus Causa plerumque est à Stercoribus induratis ad Finem *Ilei* atque *Coli* Principium compactis — vix utiquè lenitur nisi laxante Fomento, & *Clysmate* frequente, quæ Fæces emolliunt: cave verò ne Fomenta sint calida nimium.

Plena Luna 15°. MARTIO. Nova Luna 29°.

Venit ab Oriente Ventus ab ipso Martii Initio ad Diem vigesimum tertium ferè, ad Septentrionem autem vergens plerumque: siccam hoc fecit *Atmosphæram* & frigidam, imò & pulcherrimam sæpe, Libs pòst, ad Finem Aquilo.

Pluvia 1. $\frac{1}{2}$ 9. $\frac{1}{10}$ 10. $\frac{1}{10}$ 19. $\frac{1}{23}$ 24. $\frac{1}{25}$ 26. $\frac{1}{27}$
Dig. Dec.

Nix 8. 9. Grando 10. 20. = 1. 700.

Procella 26. Noctu S w 4^x. AB. 22. H. 9
p. m. N b E 1.

à 12°. ad 18. ad Solis occasum Nubes pulcherrimæ puniceæ quotidie.

Altitud. maxim. 14. 30. 4. E N E 1. } media 29. $7\frac{8}{28}$
minim. 10. 28. 9. N b E 1x. }
Dies frigid. 8. 66. N N E 1x. } media 58 $\frac{10}{28}$
— tepid. 30. 46. N 1. }

Variolæ passim ; fœda *Scabies* est undiquè :
Asthma grave multos vehementer premit, *Tussis*
 sævissima plures.

Haud pauci *Apoplexia* *, vel *Hemiplegia*, correpti occidunt—Hoc sæpe, notante *Cole de Apoplexia*, post diu durans *Frigus* accidit, cui suffragatur *Experientia* : An à densato nimium *Sanguine* ? an ab imminuta *Perspiratione*, retentis crassioribus ? an à magno *Atmosphæræ* *Pondere* totum *Corporis* *Habitus* validè premente, unde plus satis *Sanguinis* ad *Cerebrum* ruit, *Calvaria* sustinente *Aeris* *Pressuram* ? Tali *Tempestate* utiquè cavendum est *Hominibus*, *Capite* largo, *Corpore* quadrato, *Collo* breviorè: parcè vivendum est, leniter purgandum: venienti occurrite *Morbo*.

Pleuritides & *Peripneumoniæ* admodum vulgares; *Sanguis* jam ferè semper densus est valdè, ac tenace obductus *Glutine*; *Tussis* effera, *Sputa* tamen libera satis & plerumque modico *Sanguine* tincta: ubi verò parum aut nihil exantlatur, pessimum; nec melius multò si parva, rotunda, vel spumosa tantum. Quæ ex *Ficu*, *Melle*, *Oleo*, *Nitro*, *Spermate Ceti* experior perquam commoda, *Potionem* porrò emollientem, liberalem, qualem præbet *Decoctum pectorale* dictum, aut *Serum Lactis Herba Taraxaco* imbutum, cui inest dissolvendi *Lentorem Sanguinis* *Vis* maxima; præsertim si incoquitur simul *Radici*
Grami-

* *Ramazzini* *Apoplexias* recenset inter *Morbos* grassantes per valdè frigidam & siccam *Atmosphæram*. Vid. *Constitut. Epidem.* 169. Sect. 3,

Graminis * plurimum & *eryngii* — Si vis alia, præstat *Hedera terrestris*, *Tussilago*, *Adiantum*, *Helenium*, *Hyssopus*, *Pulegium*, *Flos Papaveris erratici*. — Utilia hæc sanè sunt & contemnenda neutiquàm, Atavis utiquè Proavisque nostris Medicina indigena. — Sed enim hodiè Homunciones fastidiosi Herbas ab Indis *Theam* scilicet, *Sarsam*, *Chinam*, *Ginseng*, & nescio quid ultrà expetunt — Ast abitote tandem vos Delicatuliqueioris Ævi pessima Progenies.

Plena Luna 14°. APRILI. Nova Luna 28°.

Hoc quoquè Mense Ventus fuit plerumque orientalis, nunc ad Austrum, nunc ad Arctum flexiens, Aer interim sæpe tenuis satis; à xii. autem ad xvii. aut Libs, aut Auster maximæque Nebulæ: Malacia xxii.

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------|-----------------|-----|-----|---------------|-----|-----------------|---------------|-----|
| | ⁱ | ⁱⁱⁱⁱ | | | ⁱⁱ | | ⁱⁱⁱⁱ | ⁱⁱ | |
| Pluvia | 5. | 8. | 13. | 14. | 16. | 17. | 18. | 23. | 24. |
| | ⁱⁱ | | | | | | | | |
| | 26. | 28. | = | 3. | 100. | | | | |

Dig. Dec.

| | | | | | |
|--------------------|-----|-----|-------------|--|--|
| 8. Altitud. maxim. | 1. | 30. | 2. | E 1. | } media 29. 7 ⁸ / ₃₀ |
| — minim. | 24. | 29. | 2. | E b N 1. | |
| Dies frigid. | 11. | 55. | N E b N 1x. | } media 43 ²¹ / ₃₀ | |
| — tepid. | 31. | 36. | S S E 1. | | |

Paucæ nunc *Variolæ*; Pleuritis & Peripneumonia adhuc frequens admodum, indèque quidam

* Vel ipsi Bubulci Vim Graminis detergentem noscunt, observando enim Stercus bubulum notant Obstructiones, & Crustas penè lapideas cum Stercore excretas, dum recentia Gramina carpunt Boves; qui in Stabulis detenti diu, languidi fuerunt admodum & icterici prorsus.

dam in Pulmonis Vomica incidunt, unde facti sunt tabidi: hoc his accidit præcipuè, qui parùm aut Nihil expuunt ante Diem quintum, aut septimum*, deinceps, subdulcia, vel foetida. Plurimæ Tussis vehementes, Asthmaticæ, plures Phthisici pereunt.

Febris putrida lenta multum grassatur diuque. Egrotis inhæret: Pectus atque Præcordia vel ab Initio valdè premuntur, adest Tussicula & Faucium Alperitas, Vomitus frequens atque Capitis Dolor.

Plena Luna 13°. MAIO. Nova Luna 28°.

Incipiente Mense Ventus borealis, ab octavo ad vicesimum Diem Corus sæpe, sæpius Africus, inde Vulturnus ad xxiv. postea Corus rursùm: Aer fuit Initio perficcus.

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----|----------|-----------|----------|------|-----------|-----|-----------|-----|
| | | <u>1</u> | | <u>1</u> | | <u>11</u> | | <u>11</u> | |
| Pluvia | 6. | 10. | 11. | 12. | 14. | 15. | 17. | 19. | 21. |
| <u>11</u> | | <u>1</u> | <u>11</u> | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 22. | 23. | 25. | 30. | 31. | = 2. | 108. | | | |

Dig. Dec.

| | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|----|----|-------|---|
| Altitud. maxim. | 7. | 30. | 1. | NN | E 1x. | } media 29. 5 ¹⁸ / ₃₀ . |
| — minim. | 22. | 29. | 2. | SS | E 2x. | |
| Dies frigid. | 1. | 42. | | EN | E 1x. | } media 35 ¹⁴ / ₃₀ . |
| — calida. | 24. | 28. | | SS | E 1. | |

Principio Mensis Erucæ innumeræ, omnia devorantes, jam Pluviis demersæ, perimuntur.

Febris lenta putrida adhuc dum haud paucos invadit. Ophthalmiæ, & Rheumatismi aliqui: Morbi pulmonares passim: multi Phthisici

Plena

* Vid. De Aere & Morbis Epidemicis, V. I. p. 52.

Plena Luna 11^o. JUNIO: Nova Luna 26^o.

Humilis fuit *Barometri* Statio toto *Junio*, Pluvia multa, Aer humidus, Ventus prorsus inconstans, austrinus tamen prævaluit; interfuit Boreas à xvii. ad xxii.

Pluvia $\frac{1}{1}$. 2. 3. 4. $\frac{1111}{5}$. $\frac{1}{6}$. 9. 11. 14. 16. $\frac{1111}{24}$.
 $\frac{1}{25}$. 26 $\frac{1}{27}$. $\frac{11}{28}$. 29. Grando 9. = 3. 372.
 Dig. Dec.
 Fulgur & Tonitru è longinquo 11. Noctu.

8 Altitud. maxim. 21. 29. 9. NN E 1x. } media 29. 4 $\frac{21}{30}$
 ——— minim. 25. 29. 1. SVV b VV 2. }
 Dies frigid. 1. 42. N 1. }
 — calid. 12. 24. S 1. } media 32 $\frac{28}{30}$

Febris pulmonaria jam non ita frequens est; Tussi autem & *Rheumatismo* plures vexantur; pluviosa hæc & infausta Tempestas nocet plurimum Tabidis.

Febris putrida lenta * huc usque multum sævit, atque haud paucis funesta est — Dolet Initio Sinciput, Occiput, Dorsum, mox Præcordia; adestque foedus & amarus in Ore Sapor, Nausea, Vomitus, Lingua valde squallida, tandemque nigra est prorsus, accedit porro sæpe Singultus; Statu Morbi, Die sexno, vel septimo putà, ferè semper delirant, paulòque post interdum venenosì succumbunt: rarò absunt Tremores & Tendinum Subsultus — Urina nunc crassa, parca, rubra,

* Rectius hanc Febrem dixerim biliosam, seu mesentericam, nam etsi diu admodum plerumque trahit Ægrotautes, Bilis acris & abundantis valde prodit Indicia.

bra, vel subnigra est, nunc cruda valdè & aquosa: sæpe flavescit Cutis, sæpius Oculi Album — tumet admodum aliquando & indurescit Abdomen, hoc in casu, five Arte, five Sponte fluit Alvus Ægrotantibus Levamento est; biliosa namque multa & interdum atra prorsus deji-
ciuntur — hoc verò his præcipuè accessit, quibus per Initia nullum exhibitum fuit *Emeticum*, quod certissimè hæc Febris desiderat — quid quòd post Vomitus plerumque erumpit Sudor largus, æqualis, ingens cum Pustulis Prurigo, recedente ut plurimum Morbo; idque maximè si liberè descendit Venter, paulòque post turbida, multa, fulva, subsidens Urina. Profectò hanc Febrem abigit interdum Sudor, interdum Alvi Fluxus: utrum poscit, his Notis utor; si Pruritus urget & in Cute quasi Morsus, potissimum si Papulæ apparent, moderatis *Diaphoreticis* pugno; si Ructus, si Flatus, si Abdominis Tumor, leni *Cathartico*. — *Pulv. Contrayerv. C. Julep. Camphorat. cum Aceto, Theriacæ Andromach.* pauxillum ad Sudores eliciendos conferunt; ad Alvum movendam *Rhabarbar. Mann. Sal. Mirab. Glauber. Crem. Tart.* — Omnia ex *Aloe* nocent — intereà verò five per Alvum, five per Cutim, moveo, multam diluentem demulcentem Potionem præcipio, cui admisceo insuper ad Urinam ciendam aliquid; *Sp. Nitri* dulc. scilicet, *Sal. succin. Nitrum*, &c. — vix sanè certius Signum Salutis occurrit quàm plurima, lutea, *hypostatica* Urina, Die nempe undecimo, aut decimo quarto.

Plena Luna 10°. JULIO. Nova Luna 26°.

Die Julii quinto cessere Pluviæ, multòque lætior successit Tempestas, & Sol fervidus valdè, flante Coro primùm, dein Euro, mox Borea intercurrente, etiam subindè Malacia: Sub Finem Ventus aquilonius dominabat.

Pluvia 1. 2. 3. 5. 16. 28. 29. = 1. 142. Dig. Dec.

Altitud. maxim. 21. 29. 9. E N E 2x. } media 29. 6 $\frac{22}{31}$
 ——— minim. 3. 29. 2. S VV 3. }
 Dies frigid. 4. 34. VV N VV 2x. } media 24.
 — fervidiss. 18. 13. E N E 1. }

Febres aliquæ putridæ lentæque adhuc: quædam Peripneumoniæ, præcipue nothæ; Rheumatismi passim, & Ophthalmiæ humidæ plurimæ — Ex quo autem pulchra calidaque Tempestas eluxit, paucissimi ut solet, apparent Morbi hoc Anni Tempore, modò nempe Cælum sit apertum *.

Plena Luna 9°. AUGUSTO. Nova Luna 24°.

Parùm elata fuit Barometri Statio hoc Mense, Atmosphæra autem perficca & fervida maximè; afflavit Eurus sæpissimè, Boreas frequenter, Corus sæpe, Libs rarissimè.

Pluvia 2. 3. 15. 16. 17. 25. 28. = 0. 564. Dig. Dec.

Maximæ Rorationes creberrimè: Fulgur & Tonitru è longinquo 25.

Inf-

* Hippocr. Aphorism. 15. Sect. 3.

1747)

Morbis Epidemicis:

175

Infinitæ Muscæ, Vespæ, & Papilioes omni
geni, Erucarum Vis immensa, Cicadæ undiquè
lætissimè garriunt, Omnes Rivuli & omnes fere
Putei arescunt ob Æstum enormem.

Altitud. maxim. 30. 29. 9. NNE 1. } media 29. 6.
— minim. 15. 29. 2. VV b S 2. }
Dies frigid. 16. 30. N VV 2. }
— fervidiss. 23. 12. N N E 1. } media 21 $\frac{15}{31}$

Pauci jam Morbi, plures attamen *Diarrhœa*
corripiuntur, imò & sæpe valdè profusa: per-
plurimos *Ophthalmia* aut Lippitudo vexat. Ex
Ore aliqui, quidam ex Naribus, plures ab *Hæ-*
morrhoidalibus Venis fundunt Sanguinem: Mū-
lieres largissimè Menstrua profundunt: totum
hoc à rarefacto admodum Sanguine.

Plena Luna 7^o. SEPTEMBRI. Nova Luna 23^o.

Per hunc Mensem Ventus fuit plerumque ab
Occidente, nunc ad Austrum, nunc ad Septen-
trionem tendens; Aquilo etiam aliquando inter-
venit: Aer sæpe siccus & tenuis, sæpe autem ne-
bulosus; Initio quidem calidus.

Pluvia $\frac{11}{5}$. $\frac{2}{6}$. 7. 10. 12. $\frac{2}{14}$. $\frac{111}{15}$. $\frac{8}{16}$. $\frac{6}{17}$. 20.
Dig. Dec.
 $\frac{11}{21}$. $\frac{11}{25}$. $\frac{11}{27}$. 28. 30. = 2. 516.

Immensæ sæpe Rorationes, imò interdum
Pruinæ.

Altitud. maxim. 24. 30. 1. N b E 1. } media 29. 5 $\frac{6}{28}$
— minim. 16. 29. 0. VV 1x. }
Dies frigid. 19. 46. N N VV 1x. }
— calid. 4. 24. Malacia } media 38 $\frac{2}{28}$

Febris

Febris putrida lenta passim ; cui jam accedit frequenter Icterus , & magnus Virium Languor , interdum Tumor Abdominis atque Pedum . Alvus torminosa per plurimos ubique infestat , Cholera sævissima multos , plures autem *Dysenteria* mucosa ac biliosa , imò & aliquando cruenta , Febre haud rarò comitante ; sub Finem crebrò erumpunt Pustulæ mordentes per universum ferè Corpus. — Adeò penè in omnibus dominari videtur acris & biliosa Colluvies , quæ plerumque per Alvum felicissimè dejicitur : perpauca nunc profectò Alvi Fluxus Exitio est , quam sæpe diu admodum durat , modò diluitur probè & temperatur Acrimonia , atque blandè dein expurgatur Saburra Intestinorum . Atqui alibi , præcipuè apud *Bristolienfes* & *Bathonienses* multò magis fuit funesta *Dysenteria*.

Post fervidam Æstatem constanter ferè sequuntur Cholerae , *Dysenteriae* , Alvi Fluxus ; perdurante enim longo ac intenso Solis Ardore torretur Sanguis , exaltatur Bilis* , magis acres fiunt indies Animalium Sales (ipsum Viperæ Virus longè longèque magis veneficum est per Calores æstivos , quàm dum omnia torpent Hyeme frigida .) Quandoquidem verò huic succedit frigidus humidusque Autumnus , constipata Cutè , ad interiora ruunt acres Humores , multos ideò gignit atque varios Morbos , quos inter suprà descriptos — cave igitur ne præposterè sistas eorum Exitum per Vias Cuti vicarias ; maximus nempe Consensus Cutim inter & Intestina datur certissime .

Mon-

* Ideò Hippocrati. τὸ Θέρος χοληποιόν vocat , Lib. de Humorib. Sect. 8. Edit. Liden.

Monstrat aliquatenus ideò, quod dixi supra ; Viam, qua in Morbis autumnalibus curandis incedendum est : vernæ quippe Febres plus Sanguinis Missionem poscunt, autumnales verò magis leni Catharsi levantur — Magnus profectò ac diuturnus Æstatis Calor non tantum Vim Fibrarum enervat, sed & Sanguinis Compagem laxat nimis, Sales autem reddit acriores atque Olea animalia rancida ; Verbo, Vasa facit debilia, Humores acres, Bilem abundantem & corruptam — adeòque magnus Medicinæ Parens dixit τοῦ δὲ Θέρεος — ἡ χολὴ ἀεὶ ῥεταί ἐν τῷ Σώματι, subjungit ἡ δὲ χολὴ τὴν Θερμὴν κατέχει τὸ Σῶμα καὶ τὸ Φθινόπωρον, & paulò infrà, ἡ δὲ μέλαινα χολὴ τοῦ φθινοπώρου πλείστη, τὴ καὶ ἰσχυροτάτη ἐστίν. Lib. de Natur. Homin. Sect. 14. Edit. Lindeni. Ubi verò acris & biliosa Coluvies exundat, aut per Vomitus, aut per Alvum, rectissimè expurganda est ; nam hujus præcipua Sedes est in primis Viis, Visceribus Abdominis, ac Vasis meseraicis. Fateor equidem quòd & tota Sanguinis Massa hac quoquè scatet sæpissimè, sed ne sic quidem indicatur Venæ Sectio, quæ nimiam Sanguinis Quantitatem utiquè minuere potest, Acrimoniam ejus corrigere non potest : Quod cum ita sit, detrahendo cum Sanguine Vi-res, non Acrimoniam, officit. Ideòque Hippocrates * Veteresque Medici, ubi Bilis abundat, Acrimonia scilicet biliosa, Sanguinis Missionem prohibent : nec video Ego utiquè cui Bono, hoc in Casu mittitur, nisi adsit Plethora aut Inflammatio vehemens : turpissimos sanè Errores atque immedicabiles hac in Re vidi ; imò & plus Vice simplice perdoctui.

* N

Plena

* Lib. de Humoribus, ad Finem.

Plena Luna 7°. OCTOBRI. Nova Luna 22°.

Altam tenuit Stationem Barometer toto fere Octobri, flante sæpissimè Borea, vel Coro; Libs tamen interdum, nonnunquam Euro-notus spiravit; Atmosphæra fuit multò humidior, at plerumque satès tepida.

Pluvia 1. — 3. ^u 4. 10. 14. 16. ^u 26. ^u 27. 28.
^u Dig. Dec.
 29. 31. = 1.596.

Levis Procella 4. S w 4^r. — 31. p. m. S. w. 4^r.
 Maximæ Pruinæ medio Mense.

⌘ Altitud. maxim. 6. 30. 3. E N E 1. } media 29. 9 ¹²/₃₀
 ——— minim. 29. 29. 5. S V V b V V 3. }
 Dies frigid. 20. 54. E N E 1. }
 — tepid. 1. 38. V V S V V 1. } media 46 ⁴/₃.

Rheumatismus passim; Febres putridæ frequentes, quibus haud rarò, sub Finem, accedit Icterus—Coryzæ atque Dentium Dolores multos vexant, Tussés sævæ plures—Alvi Fluxus creber adhuc, Dysenteria tamen rarior—Variolæ jam de repente factæ sunt epidemicæ, eæque quidem malè moratæ & sæpe lethales; quippè quæ parvæ & nigræ, aut crudo prorsùs diffuentes Ichore ad Finem usque; sæpe cum ipsis Variolis erumpunt Petechiæ, quod pessimum: Interdum Cutis sub Vesciculis aquosis Necrosi afficitur.

Plena Luna 6°. NOVEMBRI. Nova Luna 21°.

Densâ fuit admodùm ac humida Atmosphæra hoc Mense, quæ Mercurium baroscopicum in alto susti-

1747)

& Morbis Epidemicis:

179

sustinuit Loco, etsi multò rarior erat ab Oriente Ventus quam Octobri elapso: Corus quidem aderat sæpe, sed & Libs haud rarò — Ad ipsum Finem, gravis ab Austro Procella *Barometrum* deturbat maximè.

Pluvia $\frac{1}{1}$ 1. 9. = 11. $\frac{1}{1}$ 15. $\frac{11}{1}$ 16. 17. 18. $\frac{1}{1}$ 20. 22.

Dig. Dec.

23. 24. 27. $\frac{111}{1}$ 29. $\frac{1}{1}$ 30. Grando 16. = 2. 078.

Procella 16. Nocte = 20. p. m. S w 4. = 29. p. m. S S w 4^r.

Magna AB. 21. H. 9. p. m. N w 1^r.

Altitud. maxim. 4. 30. 3. N 1. } media 29. 9.
 ——— minim. 30. 28. 6. S VV 3. }
 Dies frigid. 25. 62. N b E 1. } media 50 $\frac{6}{28}$
 = tepid. 10. 42. S VV b VV 2^r. }

Variolæ adhuc *epidemicæ*; sed jam majore ex Parte paulò mitiores, sæpius tamen Fluxus Salivæ prælargus profluit, etiam in *Distinctis*.

Diarrhœa serosa plures adhuc exercet — *Catarrhi* & *Rheumatismi* plurimi, necnon Tussis acerbæ — Morbi Pulmonum acuti haud pauci.

Plena Luna 5^o. DECEMBRI. Nova Luna 20^o.

En tandem corruunt Vapores, per *Atmosphæram* congesti diu, delabente plurimùm *Baroscopio*: per Initia Mensis Vultur perflavit, deò Libs furens, intercurrente subindè Cauro. — Duravit pluviosa hæc & misera Tempestas ad xxi. usque; tunc venit ab Oriente Ventus, qui ad Septentrionem vergens rigidam valdè Brumam intulit, & *Barometrum* erexit maximè.

N

2

Pluvia

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|-----------|------------|------------|----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----|
| | <u>III</u> | <u>II</u> | <u>I</u> | <u>III</u> | | <u>III</u> | <u>II</u> | <u>III</u> | <u>II</u> | <u>II</u> | |
| Pluvia | 1. | 3. | 4. | 5. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| | | | | | | | | | | | |
| | <u>I</u> | <u>I</u> | <u>III</u> | <u>I</u> | <u>I</u> | | | | | | |
| 14. | 15. | 17. | 18. | 19. | 20. | 24. | Nix | 2. | =6. | 566. | |

Dig. Dec.

Maxima Diluvia medio Mense. *Atmosphæra* fuit densissima & longè humidissima ante xxiv. Crassissimæ & valdè foetidæ Nebulæ à xx. ad xxii.

Procella 2. E S E 4^x. — 9. Nocte S w 4. — 10. S w 4. — 11. Vesperi & Nocte S w 4^x. — 14. w S w 4. Amplissimus Halo circa Lunam 3. Maxima lucida, ignea, punicea AB. 6. H. 8. N. E 1^x.

⌘ Altitud. maxim. 31. 30. 5. N E 2^x. } media 29. 4²/₃₀.
 ——— minim. 11. 28. 4. S V V 4^x. }
 Dies frigid. 31. 73. N E 2^x. } media 56²⁹/₃₀.
 — tepid. 1. 46. Malacia. }

Variolæ jam sunt magis benignæ, licèt adhuc *epidemicæ*; atqui etiam in *Distinctis* profusus est admodùm *Salivæ Cursus*: porrò frequenter etiam *Maculæ* quædam rubræ sed *Coloris* vividi, erumpentibus *Variolis* intersunt, quæ brevi plerumque vanescunt.

Pleuritides & *Peripneumonix* haud raræ, sæpe nothæ; *Tusses* & *Catarrhi* plurimi: *Alvi Fluxus* usque creberrimus — Vides sanè, in omnibus ferè *Morbis*, *Colluviem* ferociam adhuc dominantem.

Dig. Dec.

Tota Pluvia Anno MDCCXLVII. = 32. 246.

Plena Luna 4^o. JANUARIO. Nova Luna 19^o.

Præalta fuit hoc Mense *Barometri* Statio, Ventus utplurimum ab Oriente, multùm per Initia flectens ad *Septentrionem*; à xix. autem plerumque

1748)

De Morbis Epidemicis:

181

que ad Austrum, Aer sæpe crassus erat, interdum nebulosus, semper frigidus. — Gelu valdè rigidum ineunte Anno.

| | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| Pluvia | 5. | 8. | 9. | 11. | 14. | 15. | 17. | 21. | 23. |
| | ¹ / ₂₆ | ¹ / ₂₇ | ¹ / ₂₈ | ¹ / ₃₀ | | | | | |
| | | | | | Nix | 7. | = | 1. | 718. |

Dig. Dec.

Levis AB. 22. H. 9. p. m. N N W 1. Procella 27. Nocte S E b S 4^x.

Nebula densissima, ac foetida admodum, diu durans 31.

| | | | |
|-----------------|------------|--------------------------|---|
| Altitud. maxim. | 1. 30. 5. | E N E 2. | } media 29. 9 ² / ₃ |
| minim. | 28. 29. 3. | S E b S 3 ^x . | |
| Dies frigid. | 2. 74. | E N E 2. | } media 62. |
| — tepid. | 30. 53. | S S E 2. | |

Ut solet ferè semper, sic quoque nunc, Tussis movet Boreas & Laterum Dolores; * idque sane jam vehementer, Pleuritides nempe, Peripneumoniæ atque Tussis gravissimæ, modò sunt valdè frequentes: multos porrò premit Asthma sævissimum & contumax; parcè nimis plerumque in his Morbis expuitur, quanquam Distillationes profusæ, Coryzæ †, Anginæ mucosæ, Raucedines atque Faucium Tumores per plurimos vexant; crasso nimirum ac perfrigido Aere Cutis Meatus occludente, unde serosa Colluvies accumulatur. Rheumatismi plurimi. — Variolæ undiquè jam epidemica, nec profectò ita clementes.

N 3

Plena

* Vid. Essay on Fevers, P. 171. † — Cels. Lib. 4. C. 4.

Plena Luna 30. FEBRUARIO. Nova Luna 17.

Perfrigida jam regnat Tempestas & sicca valdè, Borea sæpissimè perflante, hinc Gelu asperissimum, & tenuis admodum Aer, at Pluviae parum; Nix autem & Grando nonnunquam: *Baroscopium* plerumque sublime.

Pluvia 21. ¹⁶23. ¹28. Nix 16. 24. Grando
Dig. Dec.

21. 29. = 0. 598.

Acre Gelu 12. 15. 16. 19. 25. 26. Densissimæ foetidæ Nebulae 9. 10. 12.

| | | | |
|---|-------------------|---------------------|------------------------------|
| 8 | Altitud. maxim. | 9. 30. 3. N E 1. | } media 29. $8\frac{17}{28}$ |
| — | minim. | 23. 29. 2. S VV 2x. | |
| | Dies frigidissim. | 16. 27. N E b E 2x. | } media 64 $\frac{12}{28}$ |
| — | tepid. | 29. 58. VV N VV 2. | |

Variolæ longè latèque sunt *epidemicæ*, passim funestæ, parvæ, atræ; jam nunc *Salivatio* est parcius debito, ut ut nuperis Mensibus perfusa nimis. — *Febriculæ Catarrhales* valdè frequentes, necnon Tussis sævissimæ; gravissimi Asthmatis *Paroxysmi* & diu gravantes — Tempestas est exitialis admodum Pulmonariis, moriuntur plurimi. *Pleuritides* & *Peripneumoniæ* perplurimæ, crassa perquam ac glutinosa sunt Sputamina sæpe, interdum tenuia valdè, horum neutra facillè eji-ciuntur, licèt Tussis plus satùs urget; imò rupto nonnunquam Pulmone purus putus Sanguis expuitur. Utcunque viscida nunc sunt in *Peripneumoniacis* Sputa, Cruorem extractum multò minùs tenacem sæpe sæpiùs notavi. — Post *Pleuritides* aliquando maximè pertinaces *Laterum Dolo-*

Dolores cruciant, qui multò meliùs Emplastris Anodynis aut Epispasticis cedunt quàm Sanguinis Missioni, quantumcunque fuerat necessaria Morbi Initio. Odontalgia acerbissima & Rheumatismi per multos laceflunt.

Plena Luna 4°. MARTIO. Nova Luna 18°.

Algida Tempestas toto ferè Martio, Pluviæ abundantes, Procellæ interdum: Medio Mense autem Gelu, Nix, Grando, Ventus aquilonius, Aer ficcus valdè & frigidus; sub Finem verò erat multò tepidior, ac humidior longè.

Pluvia $\frac{111}{2}$. $\frac{11}{3}$. $\frac{11}{4}$. 6. $\frac{1}{7}$. $\frac{11}{8}$. $\frac{11}{10}$. 11. $\frac{11}{21}$. $\frac{111}{24}$.

$\frac{11}{25}$. $\frac{11}{26}$. 27. 28. 29. 31. Grando 8. 12. 15.
Dig. Dec.

Nix 12. 13. 14. 18. = 4. 280.

Procella 2. Nocte w S. w. 4. — 25. a. m. S
w 4. — 27. à primo Mane ad H. 10. a. m. S
w b w 4.

Altitud. maxim. 29. 30. 1. NE 1. } media 29. 7°
— minim. 27. 29. 0. SVV b VV 4. }
Dies frigid. 15. 73. E NE E 21. } media 58 $\frac{22}{29}$
— tepid. 29. 30. VV S VV 2. }

Variolæ adhuc, sed multò pauciores, & minùs periculosæ: Pleuritides & Peripneumonix frequentes; jam faciliùs expuitur, sæpe coctum, & aliquo Sanguine tinctum, sæpe tamen perliquidum & acre. Tusles innumeræ & plerumque vehementes; Labe ideò Pulmonum affectis Tempestas est infensa maximè, & haud rarò funesta: gravissimi Asthmatis Paroxysmi — Rhe-

matismi multi — Haud pauci Apoplexia & Paralyfi perculsi sunt ; quod quidem per frigidas valde Tempestates accidit frequenter * ; notavit etiam magnus Hippocrates Paraplegias fuisse epidemicas aspera durante Hyeme † , Lib. 1. epidem. Constit. 3. quod quoque memoravit Cole in Lib. de Apoplexia.

Plena Luna 20. APRILI. Nova Luna 16^o.

Ad decimum nonum Aprilis frigida fuit Atmosphæra , flante utplurimum Vento Orientem inter & Arcum ; Gelu interdum , aliquando Nix ; post vicesimum Libs prævalebat subsidente Baroscopio.

| | | | | | | | |
|--------|----------------|---------------|------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| | $\frac{ii}{i}$ | $\frac{i}{i}$ | $\frac{iii}{ii}$ | $\frac{ii}{i}$ | $\frac{i}{i}$ | $\frac{ii}{i}$ | |
| Pluvia | 1. | 7. | 10. | 12. | 17. | 19. | 20. 25. 26. |
| | | | | | | | Dig. Dec. |

27. 28. 29. 30. Nix 1. 11. 15. = 3. 080.

Haud leve Gelu 18. maximæ sæpe hoc Mense Pruinae ; Nix super Montes permanfit ad xxiv. usque.

Levis Procella 11. Nocte E b S 4^r. — quàm maximus Halo subluteus , at vividus , circa Lunam 22. H. 10. S w 2.

| | | | | |
|---|-----------------|------------|-------------|-------------------------------|
| 8 | Altitud. maxim. | 9. 30. 2. | N 1. | } media 29. 5 $\frac{27}{36}$ |
| | minim. | 28. 29. 0. | S VV 3. | |
| | Dies frigid. | 3. 64. | E b N 1. | } media 50 $\frac{18}{30}$ |
| | — tepid. | 26. 40. | S VV b S 2. | |

Per-

* Vid. quæ supra dixi Mense Martio, 1747. † Sic describitur χειμών βορείος, αὐχμοί, ψυχρά πνεύματα, μεγάλαι χιονες, περί δέ ἰσημερινήν χειμῶνες μέγιστοι. — παραπληγίαι πολλοῖσιν ἐγίνοντο, καὶ τινες αὐτέων ἐθνησκον διατάχων.

Perpaucæ jam *Variolæ*, at Morbi adhuc Pectoris acuti frequentes, Sputa tamen largissima nunc ex facili prodeunt maximo cum Levamine. Tusses humidæ, innumeræ, ac sæpe vehementes: Tabidi plurimi occidunt, Sævitia Tussis, Alvi Fluxu, aut Sudoribus, penitus confecti.—Febres aliquæ putridæ, necnon intermittentes, sed Rure potissimum. Multi *Rheumatismo* cruciante diutissime torquentur; vix utique sine magno Sanguinis Dispendio levantur, qui profectò haud parùm est viscidus.—Haud rarò etiam ipsa Venæ Sectio ter, quaterve, repetita incassum tentatur, nec cedunt Dolores acerbi nisi *Deobstruentibus*, *Diaphoreticis*, *Purgantibus*, & *Anodynis*, tandemque aliquando fugantur solum Balneo frigido.

Cæterùm hic annotabo obiter, quòd, dum ab acri & serosa Colluvie pendeat *Rheumatismus*, multò magis obest, quàm prodest, larga Sanguinis Detractio; id ipsum notante Sydenhamo: * in hoc etenim Casu certè, quæ blandè Sudores movent, quæ acres edulcorant Humores, eosque expurgant commodè, interposito subindè papaveræ Doloris Lenimine, longè feliciores edunt Effectus.—Ufus sum profectò sequentibus, multos per Annos satès feliciter.

Tertia, vel quarta, quaque Nocte *Calomelan. Grana* aliquot cum *Pilul. Mathæi*, seu *Saponaceis* exhibeo, Mane autem proximo *Cathartica* leniora, omnia dein sub Noctem compesco *Anodynis*—est & etiam ubi per Initia Morbi Vomitus excito.
Die-

Diebus attamen intermediis suadeo sequentia, aut his similia \mathcal{R} Pulp. Prunor. dulc. Æthiop. miner. ana \mathfrak{zvi} . Gum. Gujac. \mathfrak{ziii} . Cremor. Tartari. Nuc. Myristic. Pulv. à \mathfrak{ziii} . Syrup. Croci. q. s. m. f. Elect. cujus cap. Q. N. Moschat. seu Juglandis, bis saltem de Die cum Haustu largiore Aq. Calcis, in qua rasum Lignum Guaiacum & Sassafras sint infusæ; cui adjicio insuper Aq. Absinth. C. aliquid cum Elix. pægoric. & Essent. Antimon. ana \mathfrak{zss} . vel \mathfrak{zj} . — (Aquam Calcis verò præparatam esse vellem Testis Ostrear. aut Cochlear. probè calcinat.) nam & magis dulcem hanc & magis efficacem judico — Victu interim ex media Materia utendum est, pro Potu autem Sero Lactis tenuissimo Sinapi imbuto, infuso Lign. Sassafr. ex Aq. bulliente, Aquis demùm Pyrmontanis, Spadanis, aut Scarburiens. — Locis atqui pertinaciter dolentibus idonea admoveo Fomenta, mox dein Vesicatoria.

Sed quid ego hæc tanto Molimine cum quilibet Medicaſter triobolaris verbosis Populo Strophis
* Antirheumatica vendiret fallere nescia?

Plena Luna 2^o.

Nova Luna 16^o.

MAIO.

Plena Luna 31^o.

Inenunte & exeunte hoc Mense Pluvia haud parca, Venus australis, Aerque crassus, medio autem tenuis valde; per totum equidem blanda fuit satis Tempeſtas: maximæ interdum Rorationes.

Pluvia

* Quorum Stultitia Quæſtus Impudentiæ est. Phadr.
L. 1. Fab. 14.

Pluvia $\frac{1}{2}$. $\frac{111}{4}$. $\frac{1}{5}$. 6. 7. $\frac{11}{10}$. 11. 22. 25. $\frac{1}{26}$.
 " Dig. Dec.
 8. 29. 31. = 2. 250.

Altitud. maxim. 14. 30. 2. N 1. } media 29. $6\frac{2}{3}$.
 ——— minim. 2. 29. 1. S S VV 2. }
 dies frigid. 8. 44. VV N VV 2. } media 35 $\frac{26}{3}$.
 — calida 20. 28. N 1x. }

Variolæ passim ; *Pleuritis* & *Peripneumonia* reuens , *Rheumatismi* levi cum Febre, at sævo admodum Dolore plures discruciant: non solum ipso Initio Venæ Sectionem poscunt largiorem, sed & multa porrò post *Diluentia*, *Cathartica antiphlogistica*, necnon *Anodyna* liberalia, inter quæ commodissimum est *Elixir paregoricum* ; quod & salubres movet Sudores, lenisque Dolorem, exhero Lactis tenuissimo datum : inservit hoc Serum insuper utilissimè pro Potu communi ; diuque haustum, ac copiosè, ipsum tandem solvit Morbum, præcipuè si *Nitri* aliquid sit adjectum — Opportuna sanè, & repetita, Sanguinis Missio equè *Rheumatismo* calido, in junioribus & robustis, medetur, ac ipsi *Pleuritidi*.

Febres putridæ passim, vix jam video Intermittentem. Tusses plurimæ, & *Coryzæ* acres admodum cum Tumore Faucium, Labiorum, Oculorum, &c. adeò falsus destillat Humor, qui non tantum vellicat, sed etiam, sit Venia Verbo, *vesicat* Nares, atque in Pulmonem irruens sævissimam excitat Tussim, ipsamque *Tracheæ* Membranam erodit : multi hinc *Phthisici* certè ad Plures abeunt.

Nova Luna 14°. *JUNIO*. *Plena Luna* 29°.

Incipiente *Junio* Aer valdè crassus, frigidus, & humidus; post Diem decimum septimum verò fervida admodum & iuda Tempestas.

Pluvia 1. $\frac{1}{2}$. 4. — 6. $\frac{1}{8}$. 10. 12. $\frac{1}{4}$. $\frac{11}{15}$. 29.
Dig. Dec.

= 1. 102.

Dies fervidissim. 20. 21. 22. 24. 26. 27.

8 Altitud. maxim. 17. 29. 9. N N V V 1. } media 29. $6\frac{26}{29}$
— minim. 29. 29. 3. S b E 2. }
Dies frigid. 4. 40. V V N V V 2. } media $28\frac{26}{29}$
— fervidiss. 27. 15. S b E 2x. }

Variolæ sparsæ; aliquæ putridæ & lentæ *Febres*. *Tabes pulmonaria* ubiquè frequens est, haud pauci pereunt — *Vox rauca*, *Tussis clangosa*, *Sputa viridia*, *cœnosa*, *purulenta*, *graveolentia*, *Dorsi Dolor*, ac *Debilitas*, *Sudores profusi*, atque *Alvi Fluxus*, subindè se excipientes, accedente *Crurum Pedumque Tumore*, cum ingrato quodam in *Pectore Sibili*, & *Spiritu difficili*, haud dubia fuere imminentis *Lethi Præsagia*; rupta interdum in *Pulmone Vomica*.

Salubris Aura Ruris, *Equitatio quotidiana*, bene curata è *Lacte Diæta*, & *Potio lenis demulcens*, *Emulsio* scilicet *Amygdalina* ex *Decocto Rad. Eryng. condit.* & id Genus alia, multò magis *tabidis* his proficere videntur, quam operosa *Medicamentorum Farrago*, quæ semper imbecillo *Stomacho* nocet; *Opiatis* autem idoneis *compescenda* est subindè *Tussis Vehementia*; sistenda porro est *Alvus*, si cita nimis, reprimendi etiam sunt

sunt profusi Sudores: cave autem semper, ex divini Senis Consilio, ne noceas si non possis optulari*.

Nova Luna 14. *JULIO*. *Plena Luna* 28^o.

Julii Initio sicca fuit & calida Tempestas, varia post, & multò frigidior, Pluviæ frequentes, Ventus inconstans, ab Austro sæpiùs; factus hinc Aer est humidus atque crassus: sub Finem Apri-citas, Æstusque haud levis, Corus mollis.

Pluvia 1. 4. 8. 9. ¹10. 11. ¹12. 13. — 15. 19.
¹¹¹ 23. ¹¹¹ 24. ¹ 25. ¹¹¹ 31. = 4. 134.
 Dig. Dec.

Fulgur, cum Tonitru, gravissimum, ac im-mensis Pluviis 23. 24. 31. Procella 24. p. m.
 S. w. 4.

Altitud. maxim. 28. 29. 9. N V V 1. } media 29. 4 ²⁸/₃₁
 ——— minim. 24. 29. 0.
 Dies frigid. 25. 38. V V S V V 3x. } media 29 ¹⁶/₃₁
 — fervid. 30. 16. N V V 1.

Variola passim, ut plurimum blandæ satis; quædam tamen Furunculis, Carbunculis, & di-ris Ulceribus stipata. Febres aliquæ putridæ; Colica biliosa frequens.

Nova Luna 13^o. *AUGUSTO*. *Plena Luna* 27^o.

Haud parùm torruit Messes hoc Mense Cani-cula, maximæ tamen subindè Rorationes, medio autem *Augusto* Pluviæ satis; Aer indè crassus
 tum

* *Hippocr. ar. Epidem. Lib. 1. Constitut. 2. sub Finem.*

tum valdè & humidus: à quarto ad decimum
 Quartum Ventus subsolanus, ad Finem deïn uf-
 que varius.

Pluvia 2. 4. ¹⁰14. ¹¹15. ¹¹16. ¹¹17. 18. — 20. ¹31.
 Dig. Dec.

= 1. 256.

Fulgura perplurima 12. gravis Procella 15. E
 S E 4. sævum Fulgur cum Tonitru 31. ad Oc-
 cidentem. Maxima *AB*. 28. H. 8. p. m. E N
 E 2. Trabes rutilæ, vividæ, plurimæ, ab ipso
 Horizonte, ad Angulos penè rectos, per luci-
 diffimam quasi Iridem jaculatæ sunt, More ve-
 lut ex Arcu Sagittæ.

| | |
|---|------------------------------|
| Altitud. maxim. 7. 30. 0. E 2.
— minim. 15. 29. 2. | } media 29. $6\frac{20}{27}$ |
| | |
| Dies frigid. 19. 36. VV N VV 1x.
— fervid. 5. 20. E b S 2. | } media 28 $\frac{2}{27}$ |

Variolæ sparſæ, ſed parùm funeſtæ; his tamen
 exareſcentibus Furunculi plurimi, valdè dolentes,
 tandemque ſuppurantes, ſæpe ſæpiùs erumpunt:
Cholera, ac *Dysenteria*, haud raræ, *Ophthalmiæ*
 aliquæ, & Faucium Tumores.

Pleuroperipneumoniæ paſſim inter Agricolas ſæ-
 viunt, à frigida frequenter Potione, ac Aura,
 dum Sudoribus inter Opera diffluunt: grata ſa-
 nè utraque, ſed periculofa valdè: Ratione adeò
 ſemper obſecundandum eſt Naturæ Incitamentis.

Nova Luna 11°. SEPTEMBRI. *Plena Luna* 25°.

Perſiccus atque tepidus fuit hic Mensis, *Atmos-*
phæra tamen plerumque valdè craſſa, *Ventus* in-
 con-

constans, at lenis; Boreas per Initia, ac Sol fervidus, sub Finem Libs: plurimus sæpissimè Ros.

Pluvia $\frac{10}{7}$ $\frac{1}{11}$ 12. 13. 16. 19. 20. 21. 24.
Dig. Dec.

27. — 29. = 0. 914.

8 Altitud. maxim. 3. 30. 1. E N E 1. } media 29. $7\frac{12}{29}$
— minim. 8. 29. 2. E S E 2x. }
Dies frigid. 31. 44. S V V 3.
— calid. 1. 28. V V N V V 1. } media 34.

Variola adhuc, ut plurimum benignæ, Pustulis tamen ulcerosis, & Furunculis, usque stipatæ; sub Morbi Finem nempe; accedunt sæpe sævæ *Ophthalmiæ*, ac cruciantes Artuum Dolores, nisi maturè & probè purgantur. — *Diarrhææ*, & *Dysenteriæ*, per plurimos exercent; rarè tamen cruentus est Alvi Fluxus, nihilominus autem aliquando lethalis, obrepente Singultu, & perpetua desidendi Cupiditate; quod nihil levat æquè ac Clyster noster *anodynus**, qui, & *Diarrhæam* quoque profusam, irritis aliis omnibus, sæpe felicissimè sistit.

Nova Luna 11^o. OCTOBRI. *Plena Luna* 25^o.

Sicca duravit Tempestas, cum alta Barometri Statione, ad Diem usque decimum *Octobris*, adeò ut, per Initia Mensis, Putei atque Rivuli plures defecerint prorsus; post autem imbrica valdè & multò gelidior: Aquilo prævaluit ad decimum octavum, indè verò Libs.

Plu-

* Vid. supra Mens. April, 1743.

Pluvia $\frac{1}{10}$. $\frac{11}{11}$. $\frac{12}{12}$. 13. — 16. $\frac{17}{17}$. $\frac{19}{19}$. 20.
 $\frac{21}{21}$. $\frac{22}{22}$. $\frac{24}{24}$. $\frac{25}{25}$. — 26. $\frac{27}{27}$. $\frac{28}{28}$. $\frac{29}{29}$. $\frac{30}{30}$. Gran.
 Dig. Dec.

do 10. Nix 11. = 3. 696.

Gelu 3. 12. 13. Fulgur & Tonitru 29. No-
 cte: Procella 30. Nocte, ac Mane 31. S w b w
 4. — Maximæ Pruinæ Mensis Initio.

8 Altitud. maxim. 2. 30. 3. N E 1. } media 29. $6\frac{2}{30}$
 ——— minim. 22. 28. 7. S E b S 3. }
 Dies frigid. 12. 61. N 18. }
 — tepid. 5. 34. N b VV 1. } media 48. $\frac{6}{30}$

Multæ hîc *Variolæ*, aliquibus in Locis sunt e-
pidemicæ: Morbus colicus creberrimus, plures
 jam à *Pomaceo* novello. *Pleuriperipneumoniæ* pas-
 sim, medio presertim Mense; Sanguis extra-
 ctus autem haud valdè densus est. — Dentium Do-
 lores, Destillationes, Tusiles sævissimæ, perplu-
 rime; inter Pueros ferina Tussis grassatur — *Ca-
 tarrhalis* quædam *Febricula* porrò frequens est
 admodùm, cum magna Pectoris Oppressione,
 Tussi humida permolesta, Ventriculi Dolore, ac
 Cruciatribus *rheumaticis*; brevè tamen evanescit,
 accedente Alvo cita, atque torminosa paululum.

Non tantum ab impedita *Perspiratione* oriri
 videntur Febres *Catarrhales*, sed etiam ab ipso
 gelido *Atmosphæræ* Vapore per varios Corporis
 Meatus irruente; humidis igitur, frigidisque
 Temporibus, invadunt maximè; huic inesse por-
 rò Salem quendam aereum*, & acrem judico,
 qui

* Vid. Prolegomen. Vol. I. de Aere & Morbis epidemicis.

qui fundit quodammodò Sanguinem ; vellicat Nervorum Propagines , totamque Humorū Massam conturbat . Neque enim aliter est facile dictu , undè tam subita sæpe subit Commotio Hominibus , algido udoque Aeri expōitis , tam immensa Distillatio Humoris per Nares , Oculos , Fauces ; adeò acris sæpe ut vel ipsam Cutim erodat , ac Tusses vehementes moveat & Sternutamenta perpetua : Neque hæc in paucis duntaxat , sed & per innumeros undiquè simul , & semel , dispergitur Morbus . Mihi igitur probabile videtur , quod , quò major sit aerei hujus Salis Copia per *Atmosphæram* diffusa , eò acrior sæviat *Catarrhus* ; in quibusdam enim Febriculis *Catarrhalibus* longè magis blanda est Distillatio quàm in aliis ; plerumque verò pluviis , nivosis , & frigidis , Tempestatibus acerrima .

Sin autem his generatur acris , & serosa , in Sanguine Colluvies , multò meliùs discutitur Sudoribus , & blandis *Catharticis* , quàm prodiga Sanguinis Missione , quàm vix sanè approbo unquam , nisi forsan ipso Initio , & ubi Febris haud leviter ardet .

Nova Luna 9^o. NOVEMBRI . Plena Luna 23^o.

Pluviæ perpaululùm hoc Mense , *Baroscopii* Statio præalta , medio præsertim ; Ventus sæpissimè ab Oriente , ad Septentrionem deflectens plerumque ; Aer fuit majore ex Parte valdè crassus ; interdum verò tenuis admodùm , ac frigidus , maximæ Pruinæ frequenter , Gelu haud rarò .

Pluvia ^I1. ^{II}15. 17. ^I18. 19. ^{II}20. 22. 24. 25.
 Dig. Dec.
 29. 30. Nix 21. — 0. 906.

8 Altitud. maxim. 14. 30. 6. N E b E 1. } media 30. 0 ²/₃₀
 ——— minim. 2. 29. 3. S V V 2. }
 Dies frigid. 21. 68. N E 1x. rigidum Geln. } media 54.
 — tepid. 2. 42. }

Variolæ undiquè ferè, satis tamen clementes;
 scilicet distinctæ ut plurimum: *Peripneumoniæ*
 & *Pleuritides* passim. *Tussis*? *Kopúçai* & levès.
Anginæ frequentes; *Febres* aliquæ lentæ, & pu-
 tridæ; *Morbi Colici*, & *Rheumatismi*, plurimi.

Nova Luna 9°. *DECEMBRI*. *Plena Luna* 23°.

Tristissima jam ingruit *Tempestas*, *Pluvia*
 constans, Libs perpetuus ferè, isque subindè pro-
 cellosus admodum; hinc facta est *Atmosphera*
 longè humidissima: sub *Finem Mensis* *Diluvia*
 maxima ubiquè: ne vel minimum *Gelu* toto
Decembri, *Sol* rarissimè. *

Pluvia ^{III}1. 2. — 4. 6. ^I8. ^I9. 10. — 14. ^{II}15. ^{III}16.
^{II}17. ^I18. ^I19. 20. — 21. ^I23. ^{III}24. ^{II}25. ^{III}26. 27. ^{III}28.
^{III}30. ^{II}31. — 6. 746.
 Dig. Dec.

Procella 1. Nocte w S w 4^x. — 14. Nocte
 w S w 4. — gravissima 15. tota Nocte S w 4^x.
 quæ porrò duravit ad Horam quartam pomeri-
 dianam Diei 16. atque *Mercurium* barometri-
 cum quàm maximè depresso, ad 28. i. nempè;
 16. H. 10. a. m. S w b S 4^x. — 23. Nocte S S w
 4. — 24.

1748)

& Morbis Epidemicis.

195

4.—24. Mane S w 4^x.—25. S w 4. Ventus nim-
bosus omni Nocte ab 8. ad 13. haud magnus
tamen inde Barometri Lapsus.—Iris Lunarise per-
illustris 15. H. 10. p. m. w S w 3^x. Fulgur &
Tonitru 16. Mane. Magna AB4. H. 8. p. m.
N w 2^x.

8 Altitud. maxim. 7. 30. 2. VV N VV 1. } media 29. 4.
— — minim. 16. 28. 1.
Dies frigid. 17. 60. VV N VV 2. } media 52 $\frac{4}{30}$
— tepid. 3. 44. S VV 3. }

Variolæ adhuc passim, mites autem plerum-
que; in distinctis tamen, si paulò sint confer-
tiores, & largissima profluunt Sputamina, & co-
piosæ admodum & crassæ Urinæ; quod fau-
stum semper. Morbi colici perplurimi, ex *Po-
macei* novelli Potu permulti: haud pauci & Co-
lica vehemente, & acerbissimo Artuum Dolore,
anguntur, undè sæpe Brachiorum *Paresis*, &
generalis Membrorum Debilitas; Miseros* diu
admodum trahit.

Tota Pluviæ Quantitas Anno MDCCXLVIII.
Dig. Dec.

= 30. 680.

O 2

INDEX

* De his, eorumque Medicina, Vid. Opuscul. nostr.
de Morbo Colico, ad Calcem Vol. I. de Aere & Morbis
Epidemicis.

I N D E X.

A

| | |
|---|--------------|
| A Bdomen tumidum per Febres, fluente Alvo, exitiosum ————— | Pag. 147 |
| Acetum cum Piscibus recte estur ——— | 57 |
| Abcessus in Meatu auriculari in Febribus, bonum ——— | 56 |
| Aer densus admodum Baroscopium erigit ——— | I |
| Acetum & Pomaceum Nautis utilia ——— | 57 |
| Acidorum in Febre pestilentiali Utilitas ——— | 50 |
| Aceti Vapor ad Auram malignam ——— | 84 |
| Aer Carcerum & Nosocomiorum, &c. sæpe purgari & corrigi debet ————— | <i>ibid.</i> |
| Æstas fervida Bilem auget & Sanguinis Acrimoniam | 71 |
| Æstatis calidæ Nocumenta, & quid tunc faciendum | <i>ibid.</i> |
| Æstatis frigidæ & humidæ Incommoda ——— | 160 |
| Æstus Maris minimi flante Borea ——— | 66 |
| Alvi Purgatio lenis in Febre maligna laudatur ——— | 53 |
| Quæ potcunt Alvi Purgationem, quæ prohibent ——— | 53 |
| Alvi Fluxus in Febribus liquidi, saniosi, aut nigri, cū magno Foetore involuntarie dejecti, infausi sunt Ominis | 147 |
| Angina gravis ——— | 16 |
| De Angina Observationes quædam ——— | 16. 21 |
| De Angina mucosa ejusque Medela ——— | 20 |
| Anginæ Metastasis in Pulmonem lethalis ——— | 155 |
| Anginæ Curatio ——— | 19 |
| Qui sunt Apoplexiæ obnoxii ——— | 10 |
| Ad Apoplexiam præcavendam Cautio ——— | <i>ibid.</i> |
| Apoplexia post diuturna Frigora frequens ——— | 169. 184 |
| Multi apoplexia perculsi ——— | 104 |
| Quæ ad Prophylaxin idonea ——— | 169 |
| Aphthæ & Ulcera Faucium in Phthisi mala ——— | 27 |
| Aphthosa Angina Febribus, præcipuæ pustulosis, accedens | 29 |
| Aphthæ nigræ, malæ ——— | 46 |
| Aprilis persiccus & frigidus ——— | 67 |
| Aqua fontana, imo & frigida, in Dysenteria ——— | 107 |
| Arcus in Cælo lucidus, igneus, insolitus ——— | 69 |

| | |
|---|-------------------|
| Æreus lucidus, subflavus, ad Modum Iridis, extensus à | |
| N E ad S VV per ipsam Lunam | Pag. 80 |
| Asthmaticis Ventus ab Oriente noxius | 79 |
| Ascites sæpe sequitur Morbum regium, & quare | 87 |
| Atmosphæra interdum apparet valde crassa & fumosa | |
| etsi revera est maxime sicca, & unde | 43 |
| Augustus Mensis fervidissimus & siccissimus | 174 |
| calidus & siccus | 108 |
| Aquæ Calcis Usus in Rheumatismo | 186 |
| hujus præparandæ Modus optimus | ibid. |
| Algidus humidusq; Autumnus ferocem gignit Colluviæ | 164 |
| Aucupii mirum Genus | 34 |
| Aurora borealis notabilis | 23. 179 |
| Ab Atmosphæra crassâ & perfrigida Destillationes, &c. | 181 |
| C. Aurelianus | 19 |
| Atmosphære gelidæ & humidæ Mala | vii |
| siccæ & frigidæ Commoda, & Incommoda | iii. iv |
| tepidæ & humidæ Mala | vi |
| Remedia | ibid. |
| In Ædibus condendis magna Præcorum Diligentia | x |
| quædam male admodum locatæ | ibid. |
| B | |
| Alneum frigidum ad Rheumaticos | 185 |
| Tussim Convulsivam | 105 |
| vitandum est in Febricula aut | |
| Hæmoptoe | 105 |
| Maxima Barometri Depressio per gravem Procellam | 32. 194 |
| Barometri præalta Statio perflante Austro & quare | 64 |
| Quam maxima Barometri Altitudo | 14 |
| Barometri magnus & subitus Decensus | 141 |
| magna Altitudo Africo flante, cum multa Pluvia | 35. 94 |
| dum Atmosphæra est valde nebu- | |
| losa | i |
| & magna Depressio Feb. 1746 | 151 |
| Immensa Pluvia nil tamen subsidente Barometro | 26 |
| Baroscopii præalta Statio | 95. 112. 113. 193 |
| Bilem auget maxime Æstas calida | 177 |
| per Alvum purganda est | ibid. |
| ubi abundat, Hippocrates & veteres Medici Venæ | |
| Sectionem prohibent | ibid. |
| Boreas acutos Morbos Pectoris facit | 181 |
| Boreas cur Pulmonariis noxius | 65 |
| Duo borealia Lumina valde notabilia | 23 |
| De Broncotomia | 16 |

| | | |
|--|---|----------|
| Brachiorum Pareſis à Colica | — | Pag. 198 |
| Bulla nigra ad Linguae Apicem in Peripneumonicis | — | 144. |

C

| | | |
|---|-------|---------|
| C alomel in Dyſenteria epidemica | — | 100 |
| Camphora in Febribus | — | 148. |
| Carunculæ lividæ per Alvum ejectæ, peſſimæ | 105. | 107 |
| Cathartica fortiora faciunt Febres recidivas | — | 56. |
| Catarrhales Morbi undiquè frequentes | — | 77. |
| Cathartici lenis in Febre peſtilente Utilitas | — 49. | 53. |
| — quando prohibetur | — | 53. |
| Chirurgus Guttur Scalpello pertundens | — | 17. |
| Cholera valde frequens & valde bilioſa | — | 71. |
| Colicus Morbus frequentiffimus | — | 61. |
| — facile ſolvitur accedente Diarrhœa | — | ibid. |
| Cicer & Ficus ad Variolas | — | 165. |
| Coffee Potus laudatur | — | 102. |
| Calor enormis plures Morbos generat | — | 71. |
| Caries Maxillæ & Offis Vomeris poſt Morbillos | 137. | 139. |
| Colica bilioſa plurimos torquens | — | 168. |
| Colluvies acris & bilioſa dominatur maximè | 164. | 176. |
| — ſeroſa pro variis Hominum Temperamentis va- | — | 110. |
| rios producit Morbos | — | 110. |
| — bilioſa poſt fervidam Æſtatem | — | 176. |
| — per vomitum & Alvum purganda | — | 177. |
| Cortex Peruvianus noxius ubi Sanguis eſt viſcidus & | — | 114. |
| inflammatus | — | 114. |
| Comitia funeſta Oxoniënſia | — | 83. |
| — Tauntoni | — | ibid. |
| — Launceſtoni | — | 82. |
| Contagium diu adhæret Veſtibus Ægrotantium | — | 68. |
| Ideoque ex Febre contagioſa recuperatos Domi recipe- | — | 67. |
| re parum tutum eſt. | — | 67. |
| Conſenſus Cutim inter & Inteſtina bene notus Alex. Trall. | 62. | |
| Clyſter anodynus | — | 100. |
| — & reſtringens | — | 191. |
| Coryzæ acerrimæ | — | 187. |
| Hiſtoria Cynanches lethalis | — | 17. 18. |
| Cuticulæ Deſquamatio larga poſt Morbillos, bonum | — | 24. |
| Cynanchæ | — | 17. 25. |
| Cucurbitulæ ſcarificatæ in Febribus | — | 148. |

D

| | | |
|--|---|------|
| D ecembris 1739 Tempeſtas mirabilis | — | 34. |
| — frigidus & pluvius admodum | — | 62. |
| — maxime pluvioſus | — | 179. |
| — & procelloſus | — | 194. |

Diarrhœa

| | |
|--|----------|
| Diarrhœa sæpe salutifera in Peripneumonia maligna | Pag. 152 |
| Anni 1746. | |
| Quæ Diarrhœa in Febre pestilentiali bona, quæ mala | 55 |
| Observata in Cadavere Pueri Diarrhœa perempti | 4 |
| Diarrhœa & Dysenteria frequens post fervidas Æstates | 176 |
| Destillationes, Tusses, & Dentium Dolores acerbissimi innumeros torquent | 162 |
| Diluvia maxima | 180 |
| Dysenteria epidemica | 98 |
| ———— ejus Curatio | 100 |
| ———— Venæ Sectio in hac necessaria | 105. 106 |
| Lumbrici in Dysenteria epidemica multi dejiciuntur | 105 |
| Calomel in Dysenteria | 100 |
| Aqua fontana imo frigida in Dysenteria | 107 |
| Drastica purgantia nocentissima in Dysenteria | 49. 106 |
| Lenia Cathartica utilia in Dysenteria | 106 |
| In Dysenteriis curandis lenia purgantia antecedere debent Usus astringentium | 99 |
| ———— Urina limpida malum | 107 |

E

| | |
|--|----------|
| Ecceprotica in Febribus putridis | 148 |
| Eclegmata oleosa & dulcia in Phthisi pulmonaria sæpe nocent | 4 |
| Elixir Paregoricum | 186 |
| Emetici Utilitas in Febre maligna | 48 |
| Empyema frequens post Pleuropneumoniam | 27. 156 |
| ———— ejus Signa | 155 |
| Emetica in Febribus catarrhalibus | 102 |
| Emplastra Anodyna & Epispastica in pertinaces Laterum Dolores post Pleuritides | 183 |
| Epispasticum ad Collum antierius in gravi Angina | 19 |
| ———— quando utile in Febre maligna | 52. 148 |
| Epiphoræ acerbæ | 160 |
| Erucae innumerae | 171. 175 |
| Exanthemata varia in Febre putrida maligna | 137 |
| Expuitio largissima solvit Febres catarrhales | 133. 134 |
| Endemici Morbi unde | viii |

F

| | |
|---|------------|
| FEBRIS putrida petechialis | 42 |
| ———— anginosa inter Equos & Boves | ibid. |
| ———— nauticæ pestilentialis Descriptio | 44. 47. 55 |
| ———— Curatio | 48. 55 |
| ———— ex facili recidiva | 47 |
| ———— in hac diluentia subacida necessaria | 50 |

| | |
|--|------------------|
| Febris nauticæ historia cui acida profunt | Pag. 50 |
| — cui Salia alcalina nocent | <i>ibid.</i> |
| Febris pestilentialis valde funesta | 55 |
| — mesenterica biliosa | 72 |
| — intermittens anomala post Catharsin fit regularis | 74 |
| Febris maligna contagiosa apud Launceston, &c. | 82 |
| — in qua Sanguis erat val- | |
| de solutus & V. S. perniciofa | 83 |
| — sæpe in Carceribus generatur | <i>ibid.</i> |
| Putrefactio Cadaverum sæpe gignit Febres malignas | <i>ibid.</i> |
| Febris catarrhalis maligna | 130 |
| Febriculæ catarrhales frequentes ob subitum Autumnii | |
| Frigus | 90 |
| Febris dysentericæ Signa & Curatio | 98. 99. 105. 108 |
| Febres intermittentes plurimæ | 97 |
| — Dysentericæ creberrimæ undique | 103 |
| — epidemicæ | 108. 121 |
| Febris catarrhalis maxime epidemicæ Historia | 99 |
| — <i>Influenza</i> dicta | 104 |
| — Curatio | 102 |
| — aliquando in Peripneumoniam, aliquan- | |
| do in Intermittentem transit | 101 |
| — minime fert magnam Sanguinis Dispensum | <i>ibid.</i> |
| — Sputa copiosa & Sudores modici juvant | 102 |
| — Urina multa hypostatica prodest | 103 |
| — Diarrhœa sæpe | 103 |
| — accedente calida Tempestate Sudoribus solvitur | 108 |
| Febris catarrhalis quibus Temporibus frequens & unde | 192 |
| — ab acri Sale Aereo | <i>ibid.</i> |
| — quibus profligatur | 193 |
| Febres scarlatinæ valde frequentes | 133 |
| Febris putridæ malignæ Historia | 135 |
| — Carcerum Historia | 82 |
| — catarrhalis Sputo levata—ejus Descriptio | 141 |
| — putrida lenta frequens | 145 |
| — in hac V. S. perniciofa | 147 |
| — Medicina idonea | 148 |
| Febres biliosæ | 158 |
| — miliaris compositæ | 162 |
| Febris putridæ lentæ Descriptio ac Curatio | 172. 173 |
| — quædam anginosa quæ frequenter ad Pulmones ruic | 111 |
| — peripneumonica maligna, admodum funesta | 151 |
| — cujusdam catarrhalis Descriptio ac Curatio | 133 |
| Februm | |

| | | | |
|---|---|-----------|-------|
| Febrium Catarrhalium Causa | — | Pag. 192. | 193 |
| — Curatio | — | — | 193 |
| Frigora stupenda | — | — | 34 |
| — Mare ad Littora, Vina, &c. congelantur | — | — | 36 |
| Februarius perficcus & perfrigidus | — | — | 182 |
| Fomenta emolientia ad Colicam | — | — | 168 |
| — non debent esse nimis calida | — | — | 168 |
| Furunculi & Carbunculi plurimi post Variolas | — | — | 189 |
| Febris epidemicæ diversa Facies in Locis diversis | — | — | ix |
| — diversus curandi Modus | — | — | ibid. |
| — a manifesta Aeris Intemperie | — | — | xi |
| Febribus putridis favet nebulosa ac nubila Atmosphæra | — | — | ibid. |

G

| | | | |
|--|---|------|-------|
| GRAMEN est Remedium detergens | — | — | 170 |
| Gangræna Faucium post Morbillos | — | 137. | 139 |
| Gargarisationes fortiores in Angina inflammatoria malæ | — | — | 20 |
| — in aliis autem sunt utiles | — | — | ibid. |
| Gelu 13 Junii 1743 | — | — | 109 |
| — acre 18 Aprilis | — | — | 184 |
| Glacies ubique 27 Aprilis 1745 | — | — | 132 |

H

| | | | |
|---|------|------|-----------|
| HALO maximus luteus circa Lunam | 112. | 149. | 180. |
| — | — | — | 184 |
| Hæmorrhagia Nasium in Febre pestilentiali nunc bona | — | — | 2 |
| nunc mala admodum | — | — | 47 |
| — frequens per Tempestates valde æstuosas | — | — | 175 |
| Hepatitis | — | — | 48 |
| Hauftus salinus, quid, ejusque Usus | — | — | 51 |
| Frid. Hoffmanni Hortatio | — | — | ii |
| Hippocrates suadet diligentem Tempestatum Observationem | — | — | i |
| Hippocratis Observationes de Morborum & Tempestatum | — | — | — |
| Constitutionibus | — | — | xiii. xvi |
| — parum differunt a nostris | — | — | xvii |
| Hortamen ad legendum Hippocratem | — | — | xvi |
| Hydropis a Limphaticorum Ruptura Descriptio | 87. | 88 | — |

I

| | | | |
|------------------------------------|---|---|--------|
| JANUARIUS valde procellosus | — | — | 77 |
| — perfrigidus & siccus | — | — | 114 |
| Intestinatorum Sphaceli Signa | — | — | 107 |
| Icterus & Hydrops frequens | — | — | 87 |
| Iris Lunaris illustris | — | — | 195 |
| — vivida | — | — | 140 |
| Ischias solito frequentior | — | — | 132 |
| Julius Mensis siccus & subfrigidus | — | — | 54 |
| — aridissimus ac torridus | — | — | 10. 70 |

| | | |
|--|-------|----------|
| <i>Julius</i> pluviosus & frigidus | — — — | Pag. 159 |
| <i>Junius</i> frigidus & pluviosus | — — — | 134 |
| — — — siccus | — — — | 42. 109 |
| Jovis cum Marte intima maxime Conjunctio | — — — | 104 |

L

| | |
|---|-----------|
| L Apilli per Tussim rejecti, unde Sputum Sanguinis | 4 |
| Lentor inflammans prout huc vel illuc transfertur hunc vel illum Morbum facit | — — — 13 |
| Immensa Quantitas Limacum | — — — 159 |
| Lingua in Peripneumonia maligna | — — — 144 |
| Libs perfrigidus | — — — 129 |
| Lumen boreale insolitum | — — — 190 |

M

| | |
|---|----------------------|
| M ARIS Ætus longe maximus | — — — 124 |
| Mira Tempestas Mense Maio 1739 | — — — 26 |
| Maris Ætus minimi flante Borea | — — — 66 |
| Martius Mensis siccissimus | — — — 65. 80 |
| Messis infelix & corruptum Frumentum | — — — 58 |
| Menstrua admodum profusa | — — — 175 |
| Medicus in Morbis curandis tam propria quam communia debet intueri | — — — 48 |
| Maii 50. 1740 Nix plurima ac Frigus insolitum | — — — 41 |
| Matura & optima Messis | — — — 70 |
| Materia Medica ad Peripneumonias | — — — 169. 170 |
| Mesentericæ Febres per Catharsin discutiendæ | — — — 156 |
| Morbi verni Sanguinis Missionem, autumnales Catharsin poscunt | — — — 177 |
| Morbilli epidemici | — — — 12. 24. 78. 79 |
| — pustulosi mali Moris | — — — 28. 159 |
| — valde epidemici | — — — 78. 85. 86 |
| — Historia & Curatio | — — — 90 |
| Longus Artuum Dolor ac Lassitudo ante Morbillos & Variolas, malum | — — — 23 |
| Si Cuticula multum atque bene desquamatur post Morbillos, bonum | — — — 24. 86. 93 |
| Industria in Morbilis Sudore madida sum opere sunt cavenda | 91 |
| Quid faciendum est si Morbilli præmature recedant, aut luridi fiant | — — — 24 |
| Morbilli maligni epidemici | — — — 137. 139. 154 |
| — — — sub Finem Tussis & Peripneumonia quibus medetur Venæ Sectio | — — — 78. 133 |
| — — — post hos Gangræna Faucium | — — — 137. 139 |
| Moschi Vires per Cutim expellendi Humores miræ | — — — 123 |
| Muscarum omnigenarum Vis immensa | — — — 175 |
| Morbi quidam Tempestatibus Anni respondent | — — — xiii |
| | Iidem |

dem Morbi in Græcia qui in Britannia — Pag. xvii
 orbos intercurrentes descriptos æque ac Epidemicos, &
 quare xviii

N

| | | |
|---|--|--------------|
| N | IX plurima 5 ^o . Maii 1740. ——— | 41. |
| | Nautæ & Milites magis plectuntur Febribus epidemi- | |
| | cis quam Oppidani aut Ruricolæ ——— | 150 |
| | aturæ obsequendum est in Medicina faciunda ——— | 7 |
| | ebulæ densissimæ & valdè foetidæ ——— | 141. 170 181 |
| | ervorum Distentio in Tussi ferina Puerorum ——— | 165 |
| | itrum ——— | 156 |
| | ovember valdè siccus ——— | 193 |
| | uces avellanæ copiosissimæ ——— | 161 |

O

| | | |
|---|--|---------|
| O | ctober perfrigidus ——— | 60 |
| | —— procellosus valdè & pluviosus 92. 125. 139 | |
| | leum Lini ad Peripneumon. &c. ——— | 156 |
| | ues inter Oves in qua Vesicula Fellis fuit Magnitudi- | |
| | nis enormis ——— | 42 |
| | phthalmia per frigidas & humidæ Aeris Cõstitutiones 41 | |
| | —— cum aliis Morbis inflammatoriis frequens 15. 22. | |
| | —— ——— | 24. 25. |
| | —— humida Catharticis curatur ——— | 160 |
| | peris Ratio ——— | i |

P

| | | |
|---|---|----------|
| P | Aralysis Brachiorum à Colica ——— | 195 |
| | Parasynanche, quid, ejusque Curatio ——— | 195 |
| | arotides in Febre pestilentiali bonæ dum suppurantur 55 | |
| | —— aliquando diu indurata permanent ——— | ibid. |
| | a Peripneumonia maligna Lingua qualis ——— | 144 |
| | —— qualis Urina ——— | ibid. |
| | —— scorbutica ——— | 40 |
| | Paraphrenitis frequens ——— | 117. 156 |
| | istoria Chirurgi ingeniosi Paraphrenitide perempti 117. 118 | |
| | eripneumonia notha ejusque Curatio ——— | 134. 157 |
| | ebres Peripneumonicae malignæ valde frequentes ——— | 142 |
| | —— perparcam admittunt San- | |
| | guinis Missionem ——— | ibid. |
| | alia Peripneumonia maligna ejusque Descriptio 151. 153 | |
| | —— Papulæ & Pustulæ urentes plurimæ in | |
| | hac boni Ominis ——— | 152 |
| | Distinctio inter Peripneumoniam a viscido & inflammante | |
| | Sanguine & Peripneum. maligna ——— | 144 |
| | erniones (etiam inter adultos) frequentissimi ——— | 38 |
| | etechiæ lividæ, violaceæ, nigrae, fusca ——— | 45 |

| | |
|---|--------------|
| Phthisis pulmonar. sæpe Febré catarrhalem sequitur | Pag. 3 |
| Species diversæ diversam postulant medendi Methodum | 4 |
| Pulmonum frequens sine Ulcere | <i>ibid.</i> |
| Quid Pulmonariis Phthisicis faciendū est ineunte Æstate | 8 |
| Nigras aut lividas Petechias prælargas Hæmorrhagiæ plurimque comitantur | 135 |
| Phlyctænæ seu Pustulæ ichorosæ in Peripneumonicis, indicant Usus Epispasticorum | 7 |
| Piscium Esus immodicus putridos humores facit ac Scorbutum | 57 |
| Piscatus seu nimius Piscium Esus insalubris | 47 |
| Pleuritis spuria, quid | 32 |
| ac Peripneumonia valdè frequens | 117 |
| Pleuroperipneumonia in qua erumpunt Pustulæ magnæ, urentes circa pectus & Scapulas 7. ^{mo} circiter Die semper fausti est Ominis Ægrotis | 7 |
| multæ cum idonea Medicina | 169 |
| Pleuritis dorsalis, ubi Doloris Sedes est inter Scutula operta, Venæ Sectione opportuna & lenibus Opiatis maxima ex Parte curatur | 155. 156 |
| Pluvia immensa nil subsidente Baroscopio | 26 |
| Pomaceum & Acetum Nautis utilia | 57 |
| in Febre putrida maligna | 148 |
| Colicem, Tormina & Alvi Fluxus producit | 116. 127 |
| Poma citò putrescentia Alvi Fluxum inducunt | 127 |
| Procellosa Tempestas frequenter salubris | 126 |
| Pulmonis Morbi perplurimi ac vehementes | 66 |
| Purgatio Alvi declinantibus Variolis utilis, quidni declinante putrida Febre? | 53 |
| Pustulæ aquosæ urentes, Phlyctænæ Hippocrat. | 46 |
| boni Ominis in Febre pestilente | <i>ibid.</i> |
| circa Labia in Febribus bonum & quare | 36 |
| <i>Plympton</i> oppidum | 98 |
| Perspirabile retentum Morbos creat | viii |
| Procellæ aliquando salubres | xi |

R

| | |
|---|--------------|
| R Aucedo pertinax in Pulmonariis malum | 27 |
| Rheumatismi contumaces | 185. 186 |
| in his sæpe V. S. non juvat | 185 |
| Methodus curandi | <i>ibid.</i> |
| Aqua Calcis confert | 186 |
| Fomenta | <i>ibid.</i> |
| Rheumatismo calido æquæ medetur V. S. ac Pleuritidi | 185 |
| Serum Lactis in Rheumatismo | 186 |

| | |
|---|----------|
| ficatoria | Pag. 186 |
| ababarbarum optimum ad Dysenteriam | 106 |
| — ejus Tinctura non æquè confert | ibid. |
| vuli omnes penè arescunt ob Calores enormes | 175. 191 |
| abeoli seu Rossalia <i>Frid. Hoffmanni</i> | 68 |
| — aliquando Stigmata relinquunt sicut Variolæ | 75 |
| | 142 |
| amazzeni Consilium | ii |

S

| | |
|---|--------------|
| SALES volatiles alcalinos in Febre putrida non proba | 148 |
| salivatio parciore debito in Variolis | 182 |
| — e Sanguine mittendo in Febribus malignis | 48 |
| sanguis sæpè florida ac falsa specie decipit | ibid. |
| — maximè viscidus Vere 1744 | 117. 118 |
| — crassissimo Glutine obductus in Pleuroperipneu- | |
| monicis & Rheumaticis | 130 |
| — subflavo & tenaci Glutine obductus indicat Ve- | |
| næ Sectionem | 145 |
| — admodum densus & glutinosus in omnibus fere | |
| Morbis acutis <i>Januario & Februario 1742</i> | 78 |
| — admodum densus & Corio obductus post | 100 |
| Uncias detractas | 129 |
| — in Asthmate & Serum subflavum aut vi- | |
| ride at perliquidum | 130 |
| sanguinis missio necessaria in Dysentericis | 105 |
| — Facies in Febribus putridis malignis | 137 |
| — Peripneumonia maligna | 143 |
| — longe diversa in Pleuropneumonia | ibid. |
| sanguinis puri Sputum in Peripneumonicis | 183 |
| — nest sæpè Sanguini Diathesis ad pustulosas Febres | 76 |
| salivatio præmatura profusa in Variolis, malum | 33 |
| salia volatilia alcalina in Febribus petechialibus ac | |
| malignis nocent plerumque | 50 |
| salinus Haustus, quid, ejusque Usus | 51 |
| Scabies frequens, & unde | 64. 112. 167 |
| — foeditissima inter Equos | 96 |
| — — — undique post acerrimum Frigus | 38 |
| Scotomia in Febre pestilentiali frequens | 47 |
| Scombri copiosissimi | ibid. |
| Sal Aereus | 192 |
| Scorbutus perfrequens | 40 |
| — — — terribilis inter Nautas | 160 |
| Serum Sinapium | 157 |
| — — — Lactis ad Rheumatismum | 186 |

Salfus aut acidus in Ore Sapor per Febres putridas, bonum

Pag. 56

Sanguinis largior Emissio non confert in Febribus cathar-
rhalibus

101

September maximè siccus atque adeo saluberrimus

111

Siccitas maxima

ibid.

Singultus in Febribus pessimum

137

September siccus & pulcherrimus

190

Sputa copiosa in Febribus putridis bona

47

— falsa & acida

56

Spontanei Sudores optimi

50

— qui mali

51

Sudor foetidus ab Esu Piscium

47

Sudores in Febribus haud Morbum solvunt, etiam erum-
pentibus Pustulis, si Urinæ prorsus tenues, crudæ, &
aquosæ perstant

2

Situs humilioris Mala

viii

— aridi & montani

ix

Sanguinis Acrimonia magna Autumno

xiii

T

TABES Pulmonum non omnis ab Ulcere pender sed
à Muci & tenuioris Laticis Profluvio per Glandu-
las asperæ Arteriæ

4

— in qua aliquando duros ex-
tussunt Lapillos

ibid.

— cum Aphthis citam Mortem

promittit

27

Tabes pulmonaria frequens admodum

187

— lethalis Signa

188

— quæ in hac faciendâ

ibid.

Tempestas Tabidis maximè noxia

65

Tonitru gravissimum *Decembr. 1740*

62

Subita Thermometri Mutatio

77

Tincturæ Corticis Alexipharmacæ Vires

56

Tuberculorum in Pulmonibus Noxæ

13

Tussis anginosa inter Equos perfrequens

ibid.

Tussis convulsiva vehemens creberrima

30. 166

— non nisi per Sanguinis Missionem compe-
cenda

16

— in qua V. S. maximè
necessaria Anno 1744

114

— Vomitu levatur

115

— post Morbillos Curatio

105. 109

Tusses vehementes epidemicæ

116

Balneum frigidum ad Tussim convulsivam

105

Tussis

| | |
|---|---|
| Tussis convulsiva pessima | Pag. 166 |
| ad hanc Medicina idonea | <i>ibid.</i> |
| Tusses variæ variam postulant Methodum medendi | 4. 5 |
| Perfrigidas & siccas Tempestates Sanguis densus & viscidus | v. vi |
| _____ tutius tunc mittitur Sanguis | <i>ibid.</i> |
| _____ quid faciendum | v |
| In sicca sudaque Tempestate citò & feliciter restituntur ægri | vii |
| V | |
| Variolæ ab omni Febricula pustulata distinguuntur ; quod nempe Vesiculæ in Variolis non nisi post diem Octavum decedunt, abeunt vero Rubeoli, &c. tertio vel quarto | 75 |
| Pro Variolis Febriculas pustulatas (Anglicè <i>the Chicken and Swine Pox</i>) agnoscunt Mulierculæ | 142 |
| Variolarum mali Moris per Alexipharmaca Curatio | 122. 123 |
| Variolæ epidemicæ | 30. 41. 42. 60. 66. 67. 68. 140. 158. 180 |
| _____ mali Moris | 33. 72. 122 |
| Variolosi parum expuunt frigida durante & sicca Tempestate — quid tunc faciendum | 36 |
| Prima Notitia Variolarum apud Arabes | 165 |
| Variolæ derepentè factæ epidemicæ | 178 |
| _____ epidemicæ benignæ nisi Nautas inter & milites; cur his malæ | 151 |
| _____ malæ Scorbuto infectis | 66 |
| In distinctis Variolis profusa Salivatio | 179 |
| Variolæ confluentes epidemicæ, cum valde profusa Salivatione ac Faucium Ulceribus | 160. 165 |
| _____ medendi Methodus in his commoda | 165 |
| Venæ Sectio in Dysentericis utilis | 105 |
| _____ Febre putrida Carcerum nimia, Ægrum jugulabat | 82 |
| _____ Catarrhali non esse larga debet | 101 |
| Vermibus per plurimi infestantur | 98. 105 |
| Venæ Sectio in Tussi & Peripneumonia optimum | 91 |
| _____ ferina | 105 |
| Vesicatoria diutissimè manent ulcerata | 56 |
| Vinum rubrum optimum Alexipharmacum | 52 |
| _____ ad cohibendos Sudores | 71. 136 |
| Ulcera Faucium in Febris mala | 26 |
| _____ in Phthisi breviter lethalia | <i>ibid.</i> |
| Vinum Alexipharmacum jucundum | 147 |

| | |
|---|---------|
| Ventus orientalis Asthmaticis noxius | Pag. 79 |
| Vesicatoria in Rheumatismo | 186 |
| Vibices in Febribus lethales | 45 |
| Urina lutea hypostatica copiosa, in Febre catarrhali critica | 103 |
| — cruda & tenuis in Peripneumonicis, pessimum | 152 |
| — multa crassa subsidens in Peripneumonicis, bonum | 153 |
| Vomitionis Effectus in Febribus | 54 |
| Ungues lividi | 45 |
| Medicus debet Ungues inspicere | ibid. |
| Vinum pomaceum in Febribus putridis | 148 |
| Ulcera scorbutica fungosa | 160 |
| Vomica Pulmonis unde | 171 |
| Urina tenuis aquosa in Febribus pustulosis malum | 2 |
| — limpida in Dysentericis malum | 107 |
| Urina in Febre Pestilentiali cruda Finem ad usque | 55 |
| Uxoris meæ dilectissimæ Historia | 87 |
| Venti magnam Vim habent ad Salubritatem, vel Insalubritatem Locorum | ix |
| — contra perniciosos bene muniendum est | ibid. |
| Varro | x |
| Vitruvius | ibid. |

F I N I S.



